



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

การประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการกรากขาวในยางพารา
ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

Economic Loss Assessments from White Root Disease in Rubber
in Southern Thailand



รศ. ดร. อุยุทธ์ นิสสนา

ผศ. เสนอใจ ชื่นจิตต์

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ. 2554

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน

ประจำปี 2553

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

การประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรค根白病ในยางพารา ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

Economic Loss Assessments from White Root Disease in Rubber
in Southern Thailand

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณรัตน์ นิสสนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสมอใจ ชื่นจิตต์

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร และ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตหาดใหญ่

สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กรกฎาคม 2554

การประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรคภัยไข้ในพื้นที่ภาคใต้

ของประเทศไทย

อุษทร์ นิสสภา¹ และ เสมอใจ ชื่นจิตต์²

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโรคภัยไข้ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยใน 8 จังหวัดของภาคใต้ ที่มีการปลูกยางอย่างแพร่หลายและมีการรายงานการพบการระบาดของเชื้อร้ายที่เป็นสาเหตุของโรคภัยไข้ในพื้นที่ ทำการเก็บข้อมูลจากการเลือกตัวอย่างเกณฑ์แบบเจาะจงและลูกโซ่จำนวน 263 ราย โดยใช้แบบสอบถาม และทำการเลือกตัวแทนเกณฑ์ของแต่ละจังหวัดเพื่อการเก็บข้อมูลในเชิงลึกตามรูปแบบการผลิตยางพารา การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา การทดสอบสมมุติฐาน การสร้างฟังก์ชันการเข้าทำลายของโรค การวิเคราะห์กระแสต้นทุนและผลตอบแทน และการคำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิตามสถานการณ์การเข้าทำลายที่เป็นไปได้ในเบื้องต้น ของเกณฑ์

เกณฑ์รถรุ่นใหม่ให้ผู้สังเกตเห็นการระบาดของโรคภัยไข้ในพื้นที่ แต่ไม่ทราบวิธีการแก้ไขปัญหาและไม่ได้ระบุหลักที่สำคัญที่สุด ในการแก้ไขปัญหานี้ จึงต้องมีการศึกษาและพัฒนาแนวทางที่เหมาะสม ที่จะสามารถลดผลกระทบจากเชื้อร้าย ให้เหลืออยู่ในระดับที่ต่ำลง ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและเทคโนโลยีที่จำเป็น ในการดำเนินการต่อไป

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับชาวเรือนักเกณฑ์นี้ ขึ้นอยู่กับอายุของยางที่เชื้อร้ายเข้าทำลาย และความรุนแรงที่แตกต่างกันตามปัจจัยต่างๆ โดยเป็นการสูญเสียต้นยางที่อ่อนแอและตายไปทำให้โอกาสที่จะได้ผลตอบแทนจากต้นยางเหล่านี้ลดลง หากเกิดโรคภัยไข้ในพื้นที่เป็นอย่างมาก คาดว่าจะสูญเสียต้นยางที่มีอายุ 1-2 ปี ประมาณ 478,930 บาทต่อไร่ และน้อยที่สุดในจังหวัดระนอง ประมาณ 24,602 บาทต่อไร่ โดยความสูญเสียจะลดลง เมื่อการเข้าทำลายในยางอายุมากขึ้น

คำสำคัญ : ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ยางพารา โรคภัยไข้ใน พื้นที่ภาคใต้

¹ภาควิชาพัฒนาการเกษตร และ ²ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Economic Loss Assessments from White Root Disease in Rubber in Southern Thailand

Ayut Nissapa¹ and Samerchai Chuenchit²

Abstract

This research aims at assessing economic loss accruing from the infestation of white root rot disease in rubber in eight rubber growing provinces of southern Thailand where there has been an evidence of the disease. Sample farmers were purposively selected and snow balled to other farmers. Data were collected from these 263 farmers using structured questionnaires and representative farmers from each province were selected for in depth interviews. Descriptive analysis, hypothesis testing, regression analysis and cost-benefit analysis were employed to analyze the collected data. Damage function and formulated year-by-year scenarios were joined together to derive at the differences of net present values with and without white root rot disease damages.

Most of the farmers have observed the evidences of white root rot disease infestation but they have not known the extent of such damages and ways to manage it, as the damage did not appear instantaneously and it often occurred in the second crops. The disease was mostly found in loam and clay soil types, and in RRIM600 and BPM rubber varieties. Some farmers made an attempt to encounter this disease by mechanical and chemical methods but there has been no firm support of their effectiveness. Others tried to grow rubber with other non-host crops, or mixed crop-rubber growing system.

Economic loss to rubber-grower households due to this disease depended mainly on the ages of rubber when the disease firstly infected and the intensity of such infection. The farmers gradually lost their rubber trees as well as their expected benefits from them. If the disease infected the rubber trees as early as one year old, the present value of loss until the rubber reached 25 years old was the greatest in Nakhon Si Thammarat at approximately 478,930 baht per rai, while the least was in Ranong province with 24,600 baht per rai. The loss was less when the disease attacked the older rubber trees.

Key Words: Economic loss, rubber, white root rot disease, Net Present Value

¹ Department of Agricultural Development and ²Department of Pest Management, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University, Hat Yai campus

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยเรื่อง การประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรครากวัวในยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการวิจัยภายใต้ชื่อการคัดเลือกและการขยายพันธุ์ต้นตอยางพาราที่ด้านท่าน โรครากวัวและควบคุมโรคโดยเชิงวิเคราะห์ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ปี พ.ศ. 2552 – 2553) และ สำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บัดนี้งานวิจัยได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอขอบคุณ เกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง สงขลา และสตูล เจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางในจังหวัดดังกล่าวทุกท่าน ขอขอบคุณ พศ.ดร. เพ็ญพร เจนการกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ นักวิชาการ และบุคลากรสาขาวิชานับสนุน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกท่าน

ขอขอบคุณ คุณสุชิรา แก้วรักษ์ คุณพิมญาดา แซ่เดียว คุณจงกลวรรณ ประพฤติ คุณอริชา อินทอง และคุณวิภาพร พุทธกุล ที่ให้การช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และพิมพ์ต้นฉบับครั้งนี้ ตลอดจนขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณารายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อเสนอแนะเพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

รศ. ดร. อุยกุล นิสสากา

ผศ. เสมอใจ ชื่นจิตต์

กรกฎาคม 2554

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	i
Abstract	ii
กิตติกรรมประกาศ	iii
สารบัญ	iv
สารบัญตาราง	vi
สารบัญภาพประกอบ	xi
คำนำ	xii
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญ และที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย	2
1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง	5
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับยางพาราและความสำคัญทางเศรษฐกิจ	5
2.3 โรคและการระบาดของโรครากรขาวในยางพารา	15
2.3 ความเสียหายของยางพาราที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโรครากรขาว	20
2.4 การประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโรค และแมลง	22
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย	23
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย	24
3.1 ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล	24
3.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล	27
บทที่ 4 ผลการวิจัย	38
4.1 ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ศึกษา (ภาคใต้ 8 จังหวัด)	38
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับยางพารา และการผลิต	50

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.3 เศรษฐกิจการผลิตยางพาราของเกษตรกรในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา (ภาคใต้ 8 จังหวัด)	76
4.4 การระบาดของโรครากรขาว	98
4.5 การจัดการโรครากรขาว	137
4.6 ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่มีผลต่อการเกิดโรค และความรุนแรงของการเกิดโรค	140
4.7 การประเมินความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาว ในยางพาราในพื้นที่ศึกษา	142
บทที่ 5 สรุป ข้อเสนอแนะ	162
5.1 สรุปผลการวิจัย	162
5.2 ข้อเสนอแนะ	181
เอกสารอ้างอิง	185
ภาคผนวก ก	188
ภาคผนวก ข	197

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 3.1 แสดงจำนวนตัวอย่างเกย์ตระกรที่ประสบปัญหาโภคภาระในยางพาราในพื้นที่ศึกษา	26
ตารางที่ 4.1 ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของเกย์ตระกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ศึกษา	38
ตารางที่ 4.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของเกย์ตระกรผู้ปลูกยางพาราพื้นที่ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)	42
ตารางที่ 4.3 ลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจของเกย์ตระกรผู้ปลูกยางพาราพื้นที่ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)	46
ตารางที่ 4.4 ขนาดเนื้อที่ปลูกยางพาราในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา	50
ตารางที่ 4.5 ลักษณะการผลิตยางพาราของเกย์ตระกรผู้ปลูกยางพาราในภาพรวม ของพื้นที่ศึกษา	51
ตารางที่ 4.6 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการผลิตยางพารา และการเปลี่ยนแปลง	55
ตารางที่ 4.7 ขนาดเนื้อที่ปลูกยางพาราของเกย์ตระกรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)	57
ตารางที่ 4.8 ลักษณะการผลิตยางพาราของเกย์ตระกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)	60
ตารางที่ 4.9 ระบบการผลิตยางพารา และการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของเกย์ตระกร ผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)	66
ตารางที่ 4.10 ขนาดเนื้อที่ปลูกยางพาราของเกย์ตระกรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)	68
ตารางที่ 4.11 ลักษณะการผลิตยางพาราของเกย์ตระกรภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)	71
ตารางที่ 4.12 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบยางพารา และการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของ เกย์ตระกรภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)	75
ตารางที่ 4.13 การผลิตยางพาราของเกย์ตระกรในพื้นที่ศึกษา	77
ตารางที่ 4.14 การผลิตยางพาราของเกย์ตระกรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)	81

สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 4.15 การผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ฟังตะวันตก (อันดามัน)	88
ตารางที่ 4.16 ผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา	93
ตารางที่ 4.17 ผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ฟังตะวันออก (อ่าวไทย)	95
ตารางที่ 4.18 ผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ฟังตะวันตก (อันดามัน)	97
ตารางที่ 4.19 ลักษณะคุณภาพในสวนยางพาราของเกษตรกรในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา	100
ตารางที่ 4.20 พันธุ์ยางพาราที่พบจากกระบวนการดูดของโรครากรขาวในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา	100
ตารางที่ 4.21 รอบการผลิตยางพาราของเกษตรกรในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา	101
ตารางที่ 4.22 ช่วงปีที่พบการเริ่มระบาดของโรครากรขาวในยางพารา	102
ตารางที่ 4.23 จำนวนต้นยางพาราที่ถูกทำลายด้วยโรครากรขาว	103
ตารางที่ 4.24 จำนวนต้นยางพาราเฉลี่ยต่อแปลงที่ถูกทำลายตามระยะของการถูกทำลาย	104
ตารางที่ 4.25 ระยะเวลาในการเข้าทำลายตั้งแต่แรกเริ่มทำลายไปจนถึงระยะที่ต้นยางพาราโคลนล้ม และช่วงฤดูกาลที่มีการระบาดของโรคครุณแรง	105
ตารางที่ 4.26 ลักษณะคุณภาพในสวนยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ฟังตะวันออก (อ่าวไทย)	111
ตารางที่ 4.27 พันธุ์ยางพาราที่พบจากการระบาดของโรครากรขาวในพื้นที่ภาคใต้ฟังตะวันออก (อ่าวไทย)	112
ตารางที่ 4.28 รอบการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ฟังตะวันออก (อ่าวไทย)	112
ตารางที่ 4.29 ช่วงปีที่พบการเริ่มระบาดของโรครากรขาวในยางพารา	113
ตารางที่ 4.30 จำนวนต้นยางพาราที่ถูกทำลายด้วยโรครากรขาวในพื้นที่ภาคใต้ฟังตะวันออก (อ่าวไทย)	114
ตารางที่ 4.31 จำนวนต้นยางพาราเฉลี่ยที่ถูกทำลายตามระยะของการถูกทำลายในพื้นที่ภาคใต้ฟังตะวันออก (อ่าวไทย)	116
ตารางที่ 4.32 ระยะเวลาในการเข้าทำลายตั้งแต่แรกเริ่มทำลายไปจนถึงระยะที่ต้นยางพาราโคลนล้ม และช่วงฤดูกาลที่มีการระบาดของโรคครุณแรงในพื้นที่ภาคใต้ฟังตะวันออก (อ่าวไทย)	118

สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 4.33 ลักษณะคืนในสวนยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)	126
ตารางที่ 4.34 พันธุ์ยางพาราที่พบจากการระบาดของโรครากรขาวในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)	127
ตารางที่ 4.35 รอบการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)	127
ตารางที่ 4.36 ช่วงปีที่พบการเริ่มระบาดของโรครากรขาวในยางพารา	128
ตารางที่ 4.37 จำนวนต้นยางพาราที่ถูกทำลายด้วยโรครากรขาวในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)	129
ตารางที่ 4.38 จำนวนต้นยางพาราเฉลี่ยที่ถูกทำลายตามระยะเวลาของการถูกทำลายในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)	131
ตารางที่ 4.39 ระยะเวลาในการเข้าทำลายตั้งแต่แรกเริ่มทำลายไปจนถึงระยะที่ต้นยางพาราโค่นล้ม และช่วงฤดูกาลที่มีการระบาดของโรครุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)	133
ตารางที่ 4.40 การจัดการโรครากรขาวของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา	137
ตารางที่ 4.41 การจัดการโรครากรขาวของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)	138
ตารางที่ 4.42 การจัดการโรครากรขาวของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)	139
ตารางที่ 4.43 ความสัมพันธ์ของลักษณะคืนในส่วนยางพาราที่มีผลต่อการเกิดโรคและความรุนแรงของการเกิดโรครากรขาว	141
ตารางที่ 4.44 ความสัมพันธ์ของอายุยางของเกษตรกรในพื้นที่ศึกษาที่มีผลต่อการเกิดโรคและความรุนแรงของการเกิดโรค	141
ตารางที่ 4.45 ความสัมพันธ์ของรอบการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ศึกษาที่มีผลต่อการเกิดโรคและความรุนแรงของการเกิดโรค	142
ตารางที่ 4.46 ฟังก์ชันการเข้าทำลายของเชื้อรากโรครากรขาวในยางพาราในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย โดยล็อกของจำนวนต้นที่ถูกทำลายจริงเป็นตัวแปรตาม	144

สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 4.47 ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิต่อไร่เมื่อไม่ถูกทำลายและเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ละปีของครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดชุมพร (กรณีการผลิตในรูปแบบน้ำยาง)	146
ตารางที่ 4.48 ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิต่อไร่เมื่อไม่ถูกทำลายและเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ละปีของครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กรณีการผลิตยางแผ่นดิบ)	148
ตารางที่ 4.49 ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิต่อไร่เมื่อไม่ถูกทำลายและเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ละปีของครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช (กรณีการผลิตยางแผ่นดิบ)	149
ตารางที่ 4.50 ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิต่อไร่เมื่อไม่ถูกทำลายและเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ละปีของครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช (กรณีการผลิตน้ำยางสด)	151
ตารางที่ 4.51 ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิต่อไร่เมื่อไม่ถูกทำลายและเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ละปีของครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดสงขลา (กรณีการผลิตน้ำยางสด)	152
ตารางที่ 4.52 ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิต่อไร่เมื่อไม่ถูกทำลายและเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ละปีของครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดระนอง (กรณีการผลิตยางแผ่นดิบ)	154
ตารางที่ 4.53 ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิต่อไร่เมื่อไม่ถูกทำลายและเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ละปีของครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดกระบี่ (กรณีการผลิตยางแผ่นดิบ)	155
ตารางที่ 4.54 ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิต่อไร่เมื่อไม่ถูกทำลายและเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ละปีของครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดกระบี่ (กรณีการผลิตเศษยาง)	157

สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 4.55 ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิต่อไร่เมื่อไม่ถูกทำลายและเมื่อถูกทำลาย ในอายุยางแต่ละปีของครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดตรัง (กรณีการผลิต ยางแผ่นดิบ)	158
ตารางที่ 4.56 ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิต่อไร่เมื่อไม่ถูกทำลายและเมื่อถูกทำลาย ในอายุยางแต่ละปีของครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดตรัง (กรณีการผลิต น้ำยางสด)	160
ตารางที่ 4.57 ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิต่อไร่เมื่อไม่ถูกทำลายและเมื่อถูกทำลาย ในอายุยางแต่ละปีของครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดสตูล (กรณีการผลิต น้ำยางสด)	161

สารบัญภาพประกอบ

	หน้า
ภาพประกอบที่ 2.1 แสดงลักษณะและการอาศัยอยู่ของเชื้อร้ายครากขาว	16
ภาพประกอบที่ 2.2 ลักษณะเส้นใยรากสีขาวที่แตกสาขาเป็นร่างแท (พนในแปลง ยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช และระนอง)	16
ภาพประกอบที่ 2.3 แสดงอาการของโรคตามระยะเวลาในการเข้าทำลาย	17
ภาพประกอบที่ 2.4 การทดลองปลูกพืชหลากหลายชนิดไว้ในพื้นที่ที่มีการระบาด	20
ภาพประกอบที่ 2.5 ตัวอย่างสารเคมีที่เกย์ตรกรในพื้นที่ศึกษาใช้ในการป้องกันกำจัดโรค รากขาว	20
ภาพประกอบที่ 2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย	23
ภาพประกอบที่ 4.1 แสดงการระบาดของโรคครากขาวในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา	98
ภาพประกอบที่ 4.2 แสดงปีที่เริ่มระบาดของโรคครากขาวในยางพาราในภาพรวมของพื้นที่ ศึกษา	102
ภาพประกอบที่ 4.3 แสดงการระบาดของโรคครากขาวในพื้นที่จังหวัดชุมพร	107
ภาพประกอบที่ 4.4 แสดงการระบาดของโรคครากขาวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	108
ภาพประกอบที่ 4.5 แสดงการระบาดของโรคครากขาวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	109
ภาพประกอบที่ 4.6 แสดงการระบาดของโรคครากขาวในพื้นที่จังหวัดสงขลา	110
ภาพประกอบที่ 4.7 แสดงการระบาดของโรคครากขาวในพื้นที่จังหวัดระนอง	122
ภาพประกอบที่ 4.8 แสดงการระบาดของโรคครากขาวในพื้นที่จังหวัดยะลา	123
ภาพประกอบที่ 4.9 แสดงการระบาดของโรคครากขาวในพื้นที่จังหวัดตรัง	124
ภาพประกอบที่ 4.10 แสดงการระบาดของโรคครากขาวในพื้นที่จังหวัดสตูล	125

คำนำ

โครงการวิจัยเรื่องการประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรคภัยไข้ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการภัยได้ซื้อ การคัดเลือกและการขยายพันธุ์ต้นตอขางพาราที่ต้านโรคภัยไข้และควบคุมโรคโดยชีววิธี ซึ่งดำเนินงานวิจัยโดยทีมวิจัยจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการประเมินมูลค่าความเสียหายที่สามารถวัดได้เป็นตัวเงิน ทั้งนี้เพื่อให้เกยตրกร หน่วยงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เกิดความตระหนักรถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหากไม่สามารถจัดการกับโรคภัยไข้ด้ออย่างทันท่วงที ซึ่งความเสียหายนี้จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้างได้

การวิเคราะห์ในลักษณะนี้มีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดกรอบการวิจัย ประชากรและตัวอย่าง ตลอดทั้งวิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือได้ รวมทั้งได้มีการปรึกษาหารือกับนักวิจัยในชุดโครงการเพื่อนำประเด็นปัญหาปัจจุบันในพื้นที่มานำเสนอให้ทราบและหาแนวทางการแก้ไขไปพร้อมๆกัน และประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจสอบของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้อ่านรายงานความก้าวหน้า ทำให้ทีมวิจัยสามารถนำข้อมูลเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อเกยตกรและประเทศไทยต่อไป

รศ.ดร. อุษุทธ์ นิสสาก
ผศ. เสนอใจ ชื่นจิตต์

ผู้วิจัย

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญ และที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

การดูแลเพื่อให้มีผลผลิตยางพาราที่ได้มาตรฐาน นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เกยตระกรยางสวนยางทุกคนคาดหวังให้เป็นเช่นนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ประเทศไทยถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกยาง เป็นอันดับหนึ่งของโลก ยิ่งต้องรักษาระดับมาตรฐานให้ดีอยู่เสมอ ดังนั้น เกษตรกรต้องเอาใจใส่ ดูแลสวนยางอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคต่าง ๆ ที่มักแอบแฝงมาในช่วงฤดูฝน ก็เป็น อุปสรรคสำคัญที่สร้างความเสียหายให้สวนยางเป็นจำนวนไม่น้อย หากเกษตรกรมีความรู้ในการ จัดการโรค ไม่เพียงพอ

โรคในยางพาราพบได้ทุกส่วนของยาง สำหรับโรคในรากของยางพารานั้น ที่พบเสมอใน ประเทศไทย มี 3 ชนิด คือ โรครากรขาว โรครากรแดง และ โรครากร้ำตาล ที่มีเชื้อรากเป็นศัตรูสำคัญ อาจทำลายระบบ rak และส่งผลให้ต้นยางตายก่อนกำหนด เกษตรกรต้องหมั่นสังเกตอยู่เสมอ โดยเฉพาะบริเวณเส้นใยที่จับอยู่บนผิวของเปลือกราก ลักษณะเนื้อไม้ของรากยางที่ถูกทำลาย หรือ ลักษณะของดอกเหตุที่เกิดบริเวณโคนต้นหรือรากที่โผล่พ้นดิน ฯลฯ อาการจะไม่ค่อยแสดงให้เห็น เพราะรากอยู่ใต้ดิน แต่ถ้ามีอาการใบเหลืองและใบร่วง ก็พ่อสันนิษฐานได้ ยิ่งถ้าต้นยางเล็กเป็นโรค พุ่มใบหึ้งหมวดจะมีสีเหลืองผิดปกติ ถ้าเป็นยางต้นใหญ่ พุ่มใบบางส่วนดูเหมือนว่าแก่จัดและมีสี เหลือง

โรครากรขาว หรือ White root disease เกิดจากเชื้อรากที่มีชื่อว่า *Rigidoporus microporus* (Sw) Overeem (Syn. *Rigidoporus lignosus*) มักรบกวนหัวก้านช่วงฤดูฝน ในพื้นที่ที่มีฝนตกชุก และความชื้น สูง ต้นยางที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไปต้องคงอยู่ เนื่องจากเชื้อรากด้ำดันความสามารถทำลายต้นยาง ได้ทุกระบบการ เจริญเติบโต สังเกตเมื่อรากถูกทำลายจะมีเส้นใยสีขาวจำนวนมากปกคลุมและเกาะติดแน่นที่ผิวราก ถ้า เชื้อรากมีอายุมากเปลี่ยนกล้ายเป็นเส้นกลมมนุนสีเหลืองซีด และสามารถสังเกตได้อีกที่คือเนื้อไม้ของราก จะเป็นกระด้างและมีสีน้ำตาลซีด ถ้าถึงขั้นรุนแรงจะกล้ายเป็นสีครีม ถ้าต้นยางอยู่ในที่ชื้นมากเกินไป รากจะอ่อนนิ่ม และมีดอกเหตุที่มีลักษณะเป็นแผ่นคริ่งวงกลมแผ่นเดียวหรือหลายแผ่นทับช้อนกันอยู่ เป็นชั้น ๆ ผิวด้านบนเป็นสีเหลืองส้ม โดยมีสีเข้มอ่อนเรียงสลับกันเป็นวง ๆ ผิวด้านล่างเป็นสีส้มแดง หรือน้ำตาล ขอบดอกเหตุเป็นสีขาว (สถาบันวิจัยยาง, 2549)

จากลักษณะของโรคที่เกิดขึ้นกับยางพารา ได้สร้างความเสียหายต่อต้นยางอย่างมาก จากการ ประเมินของ Nandris *et al.* (1987) ที่ได้ระบุว่า ความเสียหายลดลงอยุกของยาง (ประมาณ 25 ปี) คิดเป็น 暮らค่าได้หลาดเส้นดอคลาร์สหัรรูมิริกาต่อเขตต่อร์ โดยโรครากรขาว ซึ่งเป็นโรคที่เกิดกับระบบรากใน

ดินและเกิดได้ทุกระยะกาเรวิญเติบโตของต้นยาง และพบโรคดังกล่าวได้ทั่วไปของพื้นที่ปลูกยางในภาคใต้ เช่นกรณีเกษตรชาวสวนยาง อ.พระหมู่ จ.นครศรีธรรมราช เคยมีความคาดหวังสูงต่อการทำสวนยางพารา แต่กลับมาประสบปัญหากับโรครากรขาว เมื่อเริ่มปลูกเพียงปีก่อนเท่านั้น สร้างความเสียหายจนขาดรายได้ไปตลอดอายุของต้นยาง (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, 2550) ซึ่งความเสียหายในลักษณะดังกล่าว หากมองในภาพของเศรษฐกิจการผลิตยางพารา เป็นการสร้างความเสียหายต่อตัวเกษตรกรและเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งมีความเสียหายในระดับมากน้อยเพียงใดนั้น มีรายงานเชิงตัวเลขให้เห็นถึงความเสียหายดังกล่าวเชิงวิชาการค่อนข้างน้อย

ดังนั้น การประเมินการแพร่ระบาดและความสูญเสียทางเศรษฐกิจของยางพาราที่ประสบปัญหาจากการเกิดโรครากรขาว ตลอดจนลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมและวิธีการจัดการของเกษตรกร จึงเป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากความตระหนักรถึงผลกระทบต่อครัวเรือนเกษตรกรและความสูญเสียทางเศรษฐกิจในวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยยังไม่เป็นรูปธรรม ทำให้ปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร นอกจากนี้ข้อมูลและการวิจัย ตลอดจนประเด็นการจัดการของเกษตรกรเบื้องต้นและที่เสนอแนะ โดยหน่วยงานภาครัฐ คาดว่าจะเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโรครากรขาวในยางพาราในภาคใต้และภาคอื่นๆ ของประเทศไทย

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

ในการวิจัยเรื่อง การประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรครากรขาวในยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีการคัดเลือกเกษตรกรจาก 8 จังหวัดทั้งจากจังหวัดฝั่งอ่าวไทย และอันดามันมีวัตถุประสงค์เฉพาะของการวิจัย ดังนี้

- 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบปัญหาการระบาดของโรครากรขาว
- 2) เพื่อประเมินการแพร่ระบาดของโรครากรขาวในยางพาราและการจัดการเบื้องต้นของเกษตรกร และ
- 3) เพื่อประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพารา

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย

สำหรับขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้ ได้มีการกำหนดภายใต้เนื้อหา ประชากร สถานที่ และระยะเวลาในการวิจัย ดังนี้

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา

เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ครอบคลุม จึงได้กำหนดขอบเขตทางด้านเนื้อหา ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1) ทำการศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมและการจัดการในสวนยางของเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบปัญหาระบาดของโรครากรขาว

2) การประเมินการแพร่ระบาดและความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจ จากโรครากรขาวของยางพารา โดยอาศัยการเก็บข้อมูลตามวิธีการทางสถิติและเก็บพิกัดเพื่อกำหนดร่วงแผนที่พื้นที่ที่มีการระบาดของโรครากรขาว

3) การประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในระดับฟาร์ม ภายใต้สถานการณ์ และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆ และข้อสมมุติเบื้องต้นที่เอื้ออำนวยต่อการวิเคราะห์ ดังนี้

3.1) ในการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างจำนวนต้นที่ถูกทำลายและอายุของยาง ตลอดจนลักษณะทางกายภาพ สภาพการปลูก และพื้นที่ปลูกยางนั้นใช้วิธีการ回帰 (regression analysis) ซึ่งจะต้องกำหนดข้อสมมุติต่างๆ และการทดสอบทางสถิติที่มาพร้อมกับวิธีการนี้ รายละเอียด ได้นำเสนอในบทที่ 3

3.2) ในการประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวนั้น ใช้กรอบการวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนตามเวลา (cost-benefit analysis) เป็นการวิเคราะห์ทางการเงินของสวนยางเอกชน โดยใช้อัตราคิดลดและระยะเวลาของสวนยาง ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่และจากการทบทวนวรรณกรรม ภายใต้ข้อสมมุติต่างๆ ของการวิเคราะห์ด้วยวิธีนี้ และมีการวิเคราะห์สถานการณ์สมมุติของการระบาดของโรครากรขาว (scenario analysis) รายละเอียด ได้นำเสนอในบทที่ 3

1.3.2 ขอบเขตด้านประชากรและสถานที่

สำหรับขอบเขตด้านประชากรและสถานที่นั้น จะทำการเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกยางที่ประสบปัญหาระบาดในพื้นที่ภาคใต้จำนวน 8 จังหวัด โดยเป็นจังหวัดฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา จังหวัดในภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ จังหวัดระนอง ยะลา ตรัง และสตูล

1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา

การวิจัยครั้งนี้ ดำเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2552 กันยายน พ.ศ. 2553

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การศึกษารังนีคาดหวังว่าผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร หน่วยงานของรัฐ หรือ ผู้สนใจทั่วไปจะได้รับประโยชน์ดังนี้

1) เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ได้รับความรู้เรื่องการระบบของโรค ตลอดจนได้ทราบนักถึง ความเสี่ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับแปลงยางพารา และ ได้เป็นข้อมูลเพื่อการเตรียมพร้อมในการ ป้องกัน ควบคุม และแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระดับฟาร์ม

2) หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยยาง มหาวิทยาลัยหรือ สถานศึกษาต่างๆ ได้นำข้อมูลจากการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นประเด็นสภาพการแพร่ระบาดของโรค รา能在ยางพารา และความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโรค นำไปเป็นแนวทางการวางแผน ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในระดับฟาร์ม และระดับประเทศต่อไป

3) เป็นแนวทางให้หน่วยงาน หรือผู้สนใจทั่วไป ได้นำข้อมูลจากการวิจัยไปเป็นประเด็น วิจัย และพัฒนาเพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรครา能在ยางพารา ให้มี ประสิทธิภาพต่อไป

บทที่ 2

การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้เป็นการนำเสนอการทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยางพารา และโรคจากยางพารา ตลอดจนงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคในยางพารา โดยจะเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ในการผลิตยางพารา ตลอดลักษณะทางภูมิอากาศ ภาวะฝนตกและฤดูกาล และพื้นที่ปลูกยางในจังหวัดต่างๆ ที่คาดว่าจะมีความเกี่ยวพันกับการเกิดโรคและความรุนแรงของการระบาดของโรคจากยางพาราในยางพาราที่ส่งผลต่อความเสียหายทางเศรษฐกิจของผลิตยางพารา ตลอดจนภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี้

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับยางพาราและความสำคัญทางเศรษฐกิจ

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ และประเทศไทยได้ให้ชาวสวนยาง และรายได้ในภาพรวมของประเทศเป็นอย่างมาก (สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง, 2554) ผลกระทบและความเสียหายหากเกิดการระบาดของโรคจากยางพารา ย่อมส่งผลต่อเกษตรกร และสภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม โดยมีประเด็นต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้

2.1.1 การปลูกยางพาราในภาคใต้ของไทย

ยางพาราที่ปลูกในสมัยแรกส่วนใหญ่เป็นยางพาราพื้นเมืองที่ให้ผลผลิตต่ำ ส่งผลให้ชาวสวนยางพารามีรายได้น้อยโดยเฉลี่ย ในช่วงที่ยางพารามีราคาตกต่ำ วิธีการแก้ไขคือการปลูกแทนยางพาราพื้นเมืองเหล่านี้ด้วยยางพาราพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูง เริ่มด้วยการจัดตั้งศูนย์วิจัยการยางขึ้นที่ตำบลคลองหงส์ในปี พ.ศ. 2508 และมีการวิจัยและพัฒนายางพาราตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และมีผู้เชี่ยวชาญยางพาราสาขาต่างๆ มาช่วยงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับนักวิจัยของไทยในระยะเริ่มแรก มีการวิจัยยางด้านต่างๆ เช่น ด้านพันธุ์ยางพารา โรคและศัตรุของยางพารา ด้านดินและน้ำ การดูแลรักษาสวนยางพารา การกำจัดวัชพืช การปลูกพืชคลุม การปลูกพืชแซมเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ชาวสวนยางพารา ด้านอุตสาหกรรมยางพาราและเศรษฐกิจยางพารา และมีการพัฒนายางพาราโดยเน้นการพัฒนาสวนยางพาราขนาดเล็ก เช่น การครีดยางหน้าสูง การใช้ยาเร่งน้ำยาง การส่งเสริมการทำแปลงเพาะและขยายพันธุ์ยางพาราของภาคเอกชน การรวมกลุ่มขายยางและการปรับปรุงคุณภาพ และการใช้ประโยชน์จากไม้ยางพารา มีการอุดหนุนการสารยางพาราเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่ชาวสวนยางพารา และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดหลักสูตรการฝึกอบรมและการจัดสัมมนาของยางพาราเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้

แฟร์หลายอีจีน นอกจากราชการร่วมมือกับองค์กรยางระหว่างประเทศในการวิจัยและพัฒนายางอย่างกว้างขวาง ในระยะต่อมาศูนย์วิจัยการยางได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยยางสงขลาในปี พ.ศ. 2527 และมีการก่อตั้งศูนย์วิจัยขึ้นอีกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดราชบุรี เพื่อขยายงานวิจัย และพัฒนายางพาราให้ครอบคลุมพื้นที่ปลูกยางพาราของประเทศไทย การวิจัยและพัฒนายางเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญทำให้การปลูกแทนในพื้นที่ยางประสบความสำเร็จมากขึ้น (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, 2554)

2.1.2 การผลิตยางพาราของไทย

จากฐานข้อมูลการผลิตขององค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ในปี พ.ศ. 2551 ในจำนวนประเทศที่ปลูกยางพารา 28 ประเทศ นั้น มีเพียง 7 ประเทศสำคัญ ที่มีเนื้อที่ยางพารากว้างกว่า 1 ล้านไร่ โดยประเทศไทยมีเนื้อที่ยางพารากว้างได้มากเป็นอันดับ 2 ของโลก คือ 11.15 ล้านไร่ ผลผลิตรวมมากเป็นอันดับ 1 ของโลก คือ 3.19 ล้านตัน และมีผลผลิตเฉลี่ย 286 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี (สถาบันวิจัยยาง, 2553)

จากข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 - 2552 พบว่าประเทศไทยมีเนื้อที่ยางพารายืนต้นอัตราเพิ่มร้อยละ 2.25 ต่อปี กล่าวคือในปี พ.ศ. 2535 มีเนื้อที่ปลูกยางพารา 11,124,523 ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 17,254,317 ไร่ ในปี พ.ศ. 2552 ส่วนเนื้อที่ยางพาราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.36 ต่อปี คือในปี พ.ศ. 2535 มีเนื้อที่เพิ่มร้อยละ 4.46 ต่อปี ส่วนผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ มีอัตราเพิ่มร้อยละ 3.15 ต่อปี กล่าวคือในปี พ.ศ. 2535 มีผลผลิตเฉลี่ย 174 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี เพิ่มเป็น 266 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ในปี พ.ศ. 2552

พื้นที่ปลูกยางพาราส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดหนองคาย เลย อุดรธานี เป็นต้น ส่วนภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด เป็นต้น การกระจายผลผลิตยางพาราในรอบปี พ.ศ. 2552 ของประเทศไทย พบว่าผลผลิตยางพาราจะออกมาก 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงฤดูหนาว คือเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ และค่ำอยู่ๆ ลดลงต่ำสุดในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้งที่ยางพาราผลัดใบ หลังจากนั้นผลผลิตค่อยๆ เพิ่มขึ้น สูงสุดในเดือนกันยายน และลดลงอีกราวๆ ในเดือนพฤษจิกายน ซึ่งเป็นช่วงที่ฝนตกมากทางภาคใต้ผ่านตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทย (สถาบันวิจัยยาง, 2553)

2.1.3 สถานการณ์การผลิต

เนื้อที่กรีดได้ปี พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นมากในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผลจากการสนับสนุนของภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นปีที่ราคายางพาราอยู่ในเกณฑ์ดี เกษตรกรจึงปลูกยางพาราซึ่งเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า และปลูกแซมพืชอื่น เช่น มันสำปะหลัง และข้าว

ส่วนภาคใต้มีเนื้อที่กรีดได้ลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากเกยตกรอบบางส่วนเข้าร่วมโครงการ โคลนยาง แก่ เพื่อปลูกทดแทนด้วยยางพันธุ์ดี ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล รวมทั้งในบางปีแหล่งผลิตบางแห่ง ประสบอุทกภัยและวาตภัย ทำให้ต้นยางพาราล้มตาย เนื้อที่กรีดและผลผลิตจึงตกต่ำตามไปด้วย (สถาบันวิจัยยาง, 2553)

ส่วนผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในภาคกลางและภาคใต้ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ ปกติ ปริมาณน้ำฝนเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโต และราคาจุ่งใจให้เกยตกรกรีดยางเพิ่มขึ้น แม้ว่า บางแหล่งผลิตทางภาคใต้มีต้นยางเป็นโรคใบร่วง และมีฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายวันจนเกิด อุทกภัยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 ทำให้ได้น้ำยางน้อยกว่าตาม สำหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นในภาพรวม พบร่องผลผลิตต่อไร่ต่ำ เนื่องจากต้นยางพาราส่วนใหญ่เริ่มเปิด กรีดได้เป็นปีแรก (สถาบันวิจัยยาง, 2553)

2.1.4 พื้นที่เหมาะสมในการปลูกยาง

สถาบันวิจัยยาง (2553) ระบุพื้นที่ของประเทศไทยที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการปลูกยาง โดยเฉพาะทางภาคใต้และบางจังหวัดของภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางเดิม ต่อมาก็มีการขยายพื้นที่ไปยังแหล่งปลูกยางใหม่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งมีข้อจำกัดในการปลูกมากกว่าพื้นที่ปลูกยางเดิม เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปริมาณน้ำฝนและการกระจายของฝน และบางพื้นที่เป็นที่สูง แต่เนื่องจากยางพาราสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี จึงสามารถปลูกยางในเกือบทุกภาคของประเทศไทย อย่างไรก็ตามต้นยางในภาคใต้เปิดกรีดได้มีอายุ 6.5 ปี และให้ผลผลิตเฉลี่ย 285 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ในขณะที่ต้นยางในภาคเหนือให้ผลผลิตเฉลี่ย 260 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ทั้งนี้ผลผลิตยางในแปลงเกษตรเป็นเพียงร้อยละ 67 ของผลผลิตทางวิชาการ โดยพบว่า การให้ผลผลิตของต้นยาง ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตน้ำยางหรือเนื้อไม้ขีนอยู่กับปัจจัย 3 ประการ คือ ความเหมาะสมของพื้นที่ พันธุ์ยาง และการจัดการสวนยาง ดังนั้นในการปลูกสร้างสวนยางนอกจากจะต้องพิจารณาเลือกพันธุ์แล้วการจัดการสวนยางที่ถูกต้องแล้ว ยังต้องพิจารณา ความเหมาะสมของพื้นที่สำหรับปลูกยางด้วย โดยสรุปลักษณะและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการปลูกยาง ได้ดังนี้

1) ลักษณะพื้นที่ที่เหมาะสม

1.1) เป็นพื้นที่ราบ มีความลาดชันไม่เกิน 35 องศา หากปลูกในพื้นที่ที่มี ความลาดชันเกินกว่า 15 องศา ต้องทำขั้นบันได เช่น พื้นที่เป็นภูเขา มีระดับน้ำจะทำให้ต้นยางโน้มเอียง เนื่องจากการแตกกิ่ง และทรงพุ่มในระดับสูง ทำให้ต้นยางโคลนล้มได้ง่าย ดังนั้นยางบางพันธุ์ จึงไม่เหมาะสมต่อการปลูกในพื้นที่ลาดชัน

พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 200 เมตร หากปลูกยางในพื้นที่ที่มีความสูงเกินกว่านี้จะทำให้การเจริญเติบโตช้า

1.3) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 4.5 - 5.5 ไม่ควรเป็นดินด่าง ดินเค็มหรือดินเกลือ

1.4) ชนิดและสมบัติของคิน คินแต่ละชนิดจะมีสมบัติทางเคมี และกายภาพที่แตกต่างกัน ทำให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกยางแตกต่างกัน พันธุ์ยางบางพันธุ์ให้ผลผลิตได้ดีในคินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง แต่เมื่อนำไปปลูกในคินที่มีความอุดมสมบูรณ์ของคินต่ำ ผลผลิตลดลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของพันธุ์ ในขณะที่บางพันธุ์การให้ผลผลิตไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมมากนัก ดังนั้นจึงจำต้องรู้ว่าคินที่ปลูกมีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดและปรับปรุงได้หรือไม่ ในกรณีที่แก้ไขไม่ได้ควรเลือกพันธุ์ยางที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูก เช่น การปลูกยางในสภาพพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นคินเหนียว มีการระบายน้ำลำบาก การเลือกปลูกพันธุ์ยางที่มีทรงพุ่มเล็กหรือปานกลาง

1.5) ความลึกของหน้าดิน โดยปกติต้นยางต้องการดินที่มีหน้าดินลึกมากกว่า 1 เมตร เพื่อให้รากสามารถยึดเกาะ ได้อ่ายมั่นคง การปลูกยางในพื้นที่ที่มีหน้าดินตื้น จะทำให้ต้นยางโค่นล้มง่าย ดังนั้นการปลูกยางในพื้นที่ดังกล่าว ควรจะเลือกพันธุ์ยางที่มีทรงพุ่มเล็กหรือปานกลาง แตกกิ่งสมดุล

1.6) ระดับน้ำใต้ดิน ในสภาพพื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกยาง ระดับน้ำ
ใต้ดินควรลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร

2) สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

2.1) ปริมาณน้ำฝนไม่ต่ำกว่า 1,250 มิลลิเมตรต่อปี การกระจายตัวฝนดี มีจำนวนวันฝนตก 120 – 150 วัน ช่วงแล้งไม่เกิน 4 เดือน

2.2) อุณหภูมิที่เหมาะสม อยู่ระหว่าง 26 – 30 องศาเซลเซียส

2.1.5 พัณฑ์ย่าง

พันธุ์ย่าง เป็นปัจจัยประการสำคัญที่อาจกล่าวได้ว่า เกษตรกรผู้ปลูกยางต้องระหบ้นกในการเลือกพันธุ์มาเพาะปลูก เพราะนอกจากจะส่งผลต่อผลผลิตที่จะได้รับแล้วนั้น ยังต้องเลือกให้เหมาะสมกับสภาพดิน และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ปลูกอีกด้วย นอกจากนี้ พันธุ์ย่างยังมีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นปัจจัยเอื้อต่อการระบาดของโรคในยางพาราได้หากหลâyชนิด เช่น โรครากราก ที่เป็นชนิดหนึ่งของโรคที่เกิดขึ้นกับยางพาราในแต่ละพันธุ์รุ่นแรงมากน้อยแตกต่างกันไป สำหรับพันธุ์ย่างที่สำคัญและได้รับการส่งเสริมจากการวิชาการเกษตรนั้น จะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ด้านท่านต่อโรค

และตรงตามความต้องการของเกย์ตระกูลมากที่สุด โดยมีหลักในการเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสภาพแวดล้อมต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) หลักในการเลือกพันธุ์ยาง

เนื่องจากการผลิตน้ำยางหรือเนื้อไม้ที่ได้จากการปัลอกยาง จะมากน้อยเพียงใดนั้น จะขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ คือ พันธุ์ยาง สภาพแวดล้อม และการปรับตัวของพันธุ์เข้ากับสภาพแวดล้อมนั้น ดังนั้นการจะตัดสินใจว่าจะเลือกปัลอกยางพันธุ์ใดนั้น ควรยึดหลักการว่า จะต้อง เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงสุดและมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ของเกย์ตระกูลผู้ปัลอก ซึ่ง ควรมีการพิจารณาตามขั้นตอน ดังนี้

1.1) พิจารณาว่าพื้นที่ปัลอก มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เป็นข้อจำกัดที่ รุนแรงมากน้อยเพียงใด สามารถแก้ไขได้หรือไม่ และส่งผลกระทบต่อการให้ผลผลิตมากน้อย เพียงใด เช่น เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรครุนแรง พื้นที่ที่มีลมแรง พื้นที่มีความลาดชันสูง หน้า ดินดีน

1.2) พิจารณาลักษณะประจำพันธุ์แต่ละพันธุ์ จากเอกสารคำแนะนำพันธุ์ ยางของสถาบันวิจัยยาง โดยเฉพาะลักษณะที่อ่อนแอกล้ามตัวสูง สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจำกัด แล้วก็เดือด พันธุ์ที่สามารถปัลอกในพื้นที่นั้นๆ ได้

1.3) ลำดับที่ของพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตสูง จากเอกสารคำแนะนำพันธุ์ยาง แล้วเลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงสุด ถือว่าเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับปัลอกในพื้นที่ดังกล่าว

นอกจากนี้แล้ว ใน การปัลอกยางในพื้นที่ปัลอกขนาดใหญ่ ควรปัลอกยางหลายพันธุ์ ร่วมกัน แต่ละพันธุ์ไม่น้อยกว่า 14 ไร่หรือ 1 แปลงครึ่ง เนื่องจากว่า หากมีการระบาดของโรคยาง แล้ว การปัลอกยางเพียงพันธุ์เดียวจะทำให้การระบาดของโรคมีความรุนแรงมากขึ้น

2) ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่นำมาใช้เป็นข้อพิจารณาในการเลือกพันธุ์ยาง

สภาพแวดล้อมของการปัลอกยาง จะรวมทั้งการเขตกรรม และสภาพแวดล้อมใน พื้นที่ปัลอก ซึ่งการเขตกรรม ต้องแต่การปัลอกถึงการกรีดเก็บเกี่ยวผลผลิตยางนั้น เป็นปัจจัยที่สามารถ แก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นเกษตรกรจึงควรปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อสร้างผลสำเร็จในการ ปัลอกยาง ส่วนสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปัลอก จัดเป็นปัจจัยบังคับหรือปัจจัยที่ไม่มีโอกาสเลือก แก้ไข และเปลี่ยนแปลงได้ยาก แต่มีอิทธิพลต่อการให้ผลผลิต ดังนั้นการคัดเลือกพันธุ์จึงต้องนำปัจจัยนี้มา ใช้ในการพิจารณาเลือกพันธุ์ยาง ดังนี้

2.1) ดินและสภาพพื้นที่

2.1.1) ชนิดและสมบัติของดิน ดินแต่ละชนิดมีสมบัติทางเคมีและ กายภาพที่แตกต่างกัน ทำให้มีความเหมาะสมต่อการปัลอกยางแตกต่างกัน พันธุ์ยางบางพันธุ์ให้ผล

ผลิตได้ดีในคืนที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง แต่เมื่อนำไปปลูกในคืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ผลผลิตลดลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของพันธุ์ ในขณะที่บางพันธุ์ให้ผลผลิตเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม ไม่นานก็ ดังนั้นจึงต้องรู้ว่าคืนที่ปลูกมีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดและปรับปรุงได้หรือไม่ ในกรณีที่แก้ไขไม่ได้ควรเลือกพันธุ์ยางที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูก เช่น การปลูกยางในสภาพพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นคืนเหนียว มีการระบายน้ำเลว ควรเลือกยางที่มีทรงพุ่มเล็กหรือปานกลาง

2.1.2) ความลึกของหน้าดิน โดยปกติต้นยางต้องการคืนที่ลึกมากกว่า 1 เมตร เพื่อให้รากสามารถยึดเกาะ ได้อย่างมั่นคง การปลูกในพื้นที่ที่มีหน้าดินตื้น จะทำให้ต้นยางโค่นล้มง่าย ดังนั้นควรเลือกพันธุ์ยางที่มีทรงพุ่มเล็กหรือปานกลาง แตกกิ่งสมดุล

2.1.3) ระดับน้ำใต้ดินในสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกยาง ระดับน้ำใต้ดินควรลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร แต่มีบางบางพันธุ์ที่เกยตกรากสามารถเลือกปลูกได้

2.1.4) ความลาดชันของพื้นที่ พันธุ์ยางโดยทั่วไปไม่เหมาะสมที่จะนำไปปลูกในพื้นที่ลาดชันมากสูงกว่า 16 องศา เช่น พื้นที่เป็นเขา เพราะจะทำให้ต้นยางโน้มเอียงเนื่องจากแตกกิ่งและทรงพุ่มในระดับสูง ทำให้ต้นยางโค่นล้มได้ง่าย ดังนั้นยางบางพันธุ์จึงไม่เหมาะสมสำหรับปลูกในพื้นที่ลาดชัน

2.2) โรค

ในแต่ละพื้นที่ ชนิดและความรุนแรงในการระบาดของโรคจะแตกต่างกันออกไปตามสภาพที่เหมาะสมต่อการแพร่กระจาย ดังนั้นก่อนที่จะปลูกยางควรจะศึกษาและพิจารณาดูก่อนว่า มีโรค ไวรัสบาดบ้าง ระบาดอยู่ในระดับรุนแรงมากน้อยเพียงใด เพื่อที่จะได้ตัดสินใจเลือกพันธุ์ยางที่ด้านท่านโรคนั้นๆ ได้ถูกต้อง

2.3) ความรุนแรงของลม

ลมเป็นสาเหตุสำคัญของการนีกขาด การหักโคนและถอนรากของต้นยาง ในพื้นที่ปลูกยางที่มีความแรงลมมากกว่า 62 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่โดยทั่วไปในพื้นที่ปลูกยางของประเทศไทยความแรงลมที่เกิดขึ้นตามปกติ จะทำให้ต้นยางเสียหายเล็กน้อย ยกเว้นพื้นที่ในบางจังหวัดของภาคใต้ เช่น ตรัง ภูเก็ต และบางจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดสุรินทร์ ศักดิ์นคร นครพนม มุกดาหาร อุตรธานี และอุบลราชธานี ที่มีความแรงลมระดับปานกลาง อาจจะทำให้ต้นยางเสียหายได้ ดังนั้นการเลือกพันธุ์ยางปลูกในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ต้องพิจารณาพันธุ์ที่ด้านท่านลมได้ดี

3) สักษณะประจำพันธุ์

ลักษณะประจำพันธุ์ที่จะต้องนำมาพิจารณาควบคู่กับสภาพแวดล้อม เพื่อหาความเหมาะสมในการกำหนดพันธุ์ยางที่จะปลูกมีหลายประการ เช่น ผลผลิต การเจริญเติบโตของต้นยาง ขนาดทรงพุ่ม ความหนาเปลือก รอยแพลกรีด ความด้านทานโรค อาการเปลือกแห้ง ความด้านลม การปลูกในพื้นที่จำกัด และการตอบสนองต่อจำนวนต้นปลูกในแปลง เป็นต้น

4) รายละเอียดพันธุ์ยางที่ปลูกมากในพื้นที่ภาคใต้ตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง

พันธุ์ยางพาราที่ปลูกมากในพื้นที่ภาคใต้ตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง ซึ่งมีความเหมาะสมกับพื้นที่ และสภาพแวดล้อม ตลอดจนเป็นที่ต้องการของเกษตรกร ได้แก่ พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 (RRIT 251), BPM 24, RRIM 600, PB 235 และ PB 311 เป็นต้น

2.1.6 พื้นที่ปลูกยางเดิม และพื้นที่ยางใหม่

ประเด็นของพื้นที่ปลูกยาง เป็นประเด็นที่เกี่ยวนেื่องกับการระบาดของโรครากราขาว โดยรายงานของกรมสัตว์ ใจกลาง และคณะ (2548) กล่าวถึงการระบาดของโรครากราขาว ซึ่งมักจะพบการระบาดในยางพารารอบการผลิตที่สอง นั่นหมายถึงการผลิตในพื้นที่ยางเดิม ที่เกิดผลกระทบโดยรุนแรง แรก พื้นที่เหล่านี้ ได้แก่ พื้นที่ปลูกยางในภาคใต้ 14 จังหวัด และบางจังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ยะลา และตรัง และกรมวิชาการเกษตร (2553) ได้แนะนำการใช้พันธุ์ยางต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกยางดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคต่างๆ ที่จะเกิดจากการใช้พื้นที่เดิมในการปลูกยางด้วย ออาท พื้นที่ปลูกยางในภาคใต้ฝั่งตะวันตก ได้แก่ จังหวัดระนอง ภูเก็ต พังงา ส่วนใหญ่ของจังหวัดกระนี่ ตอนเหนือของจังหวัดตรัง และตอนใต้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ในเขตนี้มีปริมาณน้ำฝนระหว่าง 2,000 – 5,000 มิลลิเมตรต่อปี จำนวนวันฝนตก 161 – 227 วันต่อปี ดังนั้นควรเลือกพันธุ์ยางที่ด้านทานต่อโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อไฟทองโโพรา โรคเส้นคำและโรคใบขาดนุน พันธุ์ยางที่แนะนำได้แก่ กลุ่ม 1 พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251, สถาบันวิจัยยาง 226, BPM 24; กลุ่ม 2 พันธุ์ PB 235 PB 260, RRTC 110; และ กลุ่ม 3 พันธุ์ฉะเชิงเทรา 50, BPM 1 เป็นต้น (หมายเหตุ กลุ่ม 1 พันธุ์ยางที่เหมาะสมต่อการผลิตน้ำยาง กลุ่ม 2 พันธุ์ยางที่เหมาะสมต่อการผลิตหั้งน้ำยางและไม้ยาง และ กลุ่ม 3 พันธุ์ยางที่เหมาะสมต่อการผลิตไม้ยาง)

ในพื้นที่ปลูกยางใหม่ เช่น การขยายพื้นที่ปลูกยางใหม่ในเขตส่งเสริมภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน ลำปาง แพร่ พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี และจังหวัดเพชรบูรณ์ และเขตส่งเสริมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม บุรีรัมย์ ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรธานี อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ เมื่อพิจารณาตามปริมาณฝนในแต่ละพื้นที่

อาจมีปัญหาระบบทองโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อไฟฟ้าปอปอโรรา โรคเส้นดำ และโรคใบจุดนูน แต่การระบบมีความรุนแรงน้อยกว่าในพื้นที่ภาคใต้ การพิจารณาเลือกพันธุ์ข้างที่เหมาะสมสมัยคงใช้เกณฑ์หลักๆ เดียวกัน

2.1.7 การปลูกยาง

การปลูกยางพารา จะเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบต่างๆ ตึ้งแต่วัสดุปลูก น้ำค้อ กล้ายาง ซึ่งในปัจจุบันมี 3 ชนิด ได้แก่ ต้นตอยาง ต้นยางชามุง และต้นติตตาในแปลง วัสดุปลูกแต่ละชนิดมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศที่แตกต่างกัน และมีมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด ดังนั้นการเลือกวัสดุปลูกที่เหมาะสมและมีคุณภาพจึงส่งผลต่อความสำเร็จในการปลูกสร้างสวนยาง ซึ่งประเด็นของคุณภาพวัสดุปลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัสดุปลูกประเภท ต้นยางชามุง ได้มีการตั้งข้อสังเกตจากเกษตรกรในหลายพื้นที่ที่ทำการศึกษาว่า วัสดุปลูกประเภทดังกล่าวอาจเป็นแหล่งของกระบวนการเชื้อรา โรครากรขาว ได้ เช่น กัน ทั้งนี้เนื่องจากคินที่ใช้ใส่ในถุงชำ ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามาจากแหล่งใด อาจเป็นแหล่งที่มีเชื้อดังกล่าวระบาดอยู่ก็เป็นได้

นอกจากวัสดุปลูกแล้ว การเตรียมพื้นที่ปลูก ถือเป็นประเด็นสำคัญที่สำนักงานกองทุนส่งเสริมการทำการทำสวนยาง ได้มีการแนะนำให้เกษตรกรที่ประสบกับปัญหารากรขาว ปฏิบัติตามแนวทางของสำนักงานอย่างเคร่งครัด (สำนักงานกองทุนส่งเสริมการทำการทำสวนยางจังหวัดชุมพร, 2553) โดยการเตรียมพื้นที่เป็นการปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมสำหรับปลูกสร้างสวนยาง ด้วยการโค่นต้นยางเก่าหรือไม้ยืนต้นบางชนิด จะต้องทำการเผาปูนเก็บเศษไม้และวัชพืชที่เหลือในพื้นที่ออกให้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการกำจัดแหล่งแพร่เชื้อโรค โดยเฉพาะรากรยาง ควรเริ่มโค่นในช่วงฤดูแล้ง เพื่อสะดวกในการเก็บเศษไม้และตอไม้ออกจากพื้นที่

2.1.8 การปลูกพืชแซมยางและพืชร่วมยาง

การปลูกพืชแซมยางและพืชร่วมยาง นอกจากเป็นรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางแล้วนั้น พืชบางชนิดอาจเป็นพืชอาศัยของโรคต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งนำมาสู่ความเสียหายต่อต้นยางพารา ได้ เช่น กัน โรครากรขาว เป็นโรคหนึ่งที่ได้มีการศึกษาค้นพบว่ามีพืชอาศัยของเชื้อดังกล่าว ในพืชแซมยาง และพืชร่วมยางต่างๆ อาทิ มะเขือ พริก สะตอ มันเทศ ลองกอง เป็นพืชอาศัยของเชื้อรากรากรขาว (พงษ์เทพ, 2535)

2.1.9 การใช้ปุ๋ยในสวนยาง

การใช้ปุ๋ยเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตยางพารา ทั้งนี้เนื่องจากคินที่ใช้ในการปลูกยางส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ของคินต่ำและชาตุอาหารบางส่วนถูกนำออกจากการในรูปของน้ำยา โดยน้ำยา 1 ตัน สูญเสียชาตุในโตรเจน 20 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 5 กิโลกรัม โพแทสเซียม 20 กิโลกรัม แมgnีเซียม 5 กิโลกรัม รวมทั้งชาตุ

อาหารอื่น เช่น แคลเซียม เหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี หากไม่มีการใส่ปูยเพื่อชดเชยชาตุอาหารที่เสียไปจากคิน จะทำให้คินขาดความสมดุลของชาตุอาหาร ประกอบด้วย การเกิดการระค้างพังทลายของคิน และการสลายตัวของอินทรีย์วัตถุตามธรรมชาติ ทำให้อินทรีย์วัตถุในคินลดลง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใส่ปูยเพื่อบำรุงคินและเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่คิน ทั้งในรูปของปูยเคมีและปูยอินทรีย์ในการใส่ปูยเคมีให้ได้ผลดีและเกิดประสิทธิภาพสูงนั้น เกย์ตระกรต้องรู้จักสมบัติของคิน ความต้องการชาตุอาหารของยางพารา รู้จักปูย และวิธีการใส่ปูย โดยใส่ปูยให้ถูกสูตรและอัตราที่เหมาะสม หรือใส่ปูยตามค่าวิเคราะห์คิน ใส่ถูกเวลาและถูกวิธี และควรใส่ร่วมกับปูยอินทรีย์

1) ความต้องการชาตุอาหารของยางพารา

ยางพาราต้องการปริมาณชาตุอาหารผันแปรตามอายุของต้นยาง ชนิดของเนื้อดิน และแหล่งปลูก ชาตุอาหารที่ยางพาราต้องการมาก ได้แก่ ชาตุอาหารหลัก ในโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมซึ่งส่วนใหญ่ได้จากปูยเคมี ชาตุอาหารที่ยางพาราต้องการรองลงมา ได้แก่ แคลเซียม เหล็ก แมงกานีส สังกะสี ทองแดง โบรอน โนบิลีนัม และคลอริน ซึ่งส่วนใหญ่ได้จากปูยอินทรีย์

สูตรปูยและอัตราปูยที่แนะนำตามความต้องการของยางพาราเป็นสูตรปูยทั่วไป เหมาะสมสำหรับคินที่เป็นตัวแทนส่วนใหญ่ของประเทศไทย ให้เกย์ตระกรสามารถปฏิบัติได้ง่าย โดยแบ่งใส่ปีละ 2 – 3 ครั้ง เมื่อคินมีความชื้น ใส่แบบ 2 ข้าง หรือขุดหลุม 2 – 4 ชุดต่อต้น บริเวณทรงพุ่ม ของใบยาง และเกลี่ยคินกลบ

ปัจจุบันพื้นที่ปลูกยาง ได้กระจายไปทั่วประเทศ แต่ละพื้นที่มีสมบัติของคินแตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมกับพื้นที่ปลูกมากขึ้น สถาบันวิจัยยางจึงได้แนะนำการใช้ปูยตามค่าวิเคราะห์คิน โดยใช้ผลวิเคราะห์คินของชาตุอาหารหลักแต่ละชาตุ เปรียบเทียบกับค่าวิกฤติของชาตุอาหารนั้น และพิจารณา_r ร่วมกับผลการทดลองใช้ปูย ซึ่งสามารถแนะนำการใช้ปูยให้เหมาะสมกับคินที่ปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของยางพารา

2) การใช้ปูยอินทรีย์ร่วมกับปูยเคมี

คินที่ปลูกยางพาราส่วนใหญ่มีปริมาณอินทรีย์วัตถุในคินอยู่ในระดับต่ำทำให้มีผลต่อสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของคิน ปริมาณอินทรีย์วัตถุในคินมีแนวโน้มลดลงในอนาคตและเนื่องจากการจัดการสวนยางที่ไม่ถูกต้องประกอบกับสภาพภาวะอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ทำให้อัตราการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในคินเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเพิ่มอินทรีย์วัตถุในคินให้เพียงพอเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ ส่งเสริมกิจกรรมของจุลินทรีย์ รักษาสมบัติทางกายภาพ เเคมี ชีวภาพของคิน และยังเป็นการเพิ่มชาตุอาหารรองและจุลชาตุในคิน ปูยอินทรีย์ที่ใช้เป็นปูยที่เกิดจากการย่อยสลายของเศษชาตพืชและชาตสัตว์ ได้แก่ ปูยหมัก ปูยมูลสัตว์ ปูยคอก โดยใช้อัตรา 2 – 3 กิโลกรัม

ต่อต้นต่อปีร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราที่แนะนำ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ร้อยละ 25 ขึ้นอยู่กับปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้และปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกพืชที่จะสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงผลตอบแทนและความคุ้มทุน

2.1.10 ลักษณะทางเศรษฐศาสตร์และชีววิทยาของต้นยางพาราและสวนยางพารา

ในทางเศรษฐศาสตร์นั้น ต้นยางพาราถือว่าเป็นทรัพยากรที่สามารถเสริมสร้างขึ้นใหม่ได้ (renewable resource) เนื่องจากสามารถปลูกสร้างทดแทนเพื่อใช้ประโยชน์หลังจากที่ต้นเก่าถึงอายุที่ให้ผลผลิตต่ำและเนื้อไม้สามารถตัดขายได้ โดยมีลักษณะเช่นเดียวกับกรณีการปลูกสร้างสวนปาฐุรักษาชนร่วมกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เป็นเนื้อยางพร้อมกันไปด้วยซึ่งเป็นผลประโยชน์ทางตรง (direct benefit) ที่เกษตรกรได้รับ

ลักษณะทางชีววิทยาของต้นยางจึงเกี่ยวพันกับการเจริญเติบโตของต้นยางพารา การให้ผลผลิตน้ำยาง และปริมาตรของเนื้อไม้ ซึ่งแปรเปลี่ยนตามเวลา และถ้าสมมุติให้ต้นยางทุกต้นในสวนเป็นพันธุ์เดียวกัน อายุเท่ากัน ขึ้นอยู่ในสภาพดินและภูมิอากาศเดียวกัน มีการจัดการเหมือนกันแล้ว ความสัมพันธ์ของการเจริญเติบโตของสวนยาง การให้ผลผลิตน้ำยาง และปริมาตรของเนื้อไม้กับเวลาจะมีลักษณะเป็นรูปตัวเอส (S-curve) ซึ่งเป็นไปตามกฎแห่งการลดน้อยลง (law of diminishing returns)

ในทางเศรษฐศาสตร์นั้น การตัดฟันที่เหมาะสมสำหรับสวนปาฐุรักษาที่ผลประโยชน์ทางตรง เป็นเนื้อไม้เพียงอย่างเดียว จะอาทัยหลักการของมูลค่าปัจจุบันของรายได้สุทธิที่เกิดจากการใช้ที่ดินแปลงนั้นในการสร้างสวนปาฐุรักษาจนถึงระยะนั้น (สมพร อิศวิลานนท์, 2540) แต่การหาช่วงอายุที่เหมาะสมนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่นมาเกี่ยวข้องด้วยเรื่อง ต้นทุนในการปลูกและดูแลรักษา มูลค่าไม้อัตราดอกเบี้ย และ ลักษณะการเจริญเติบโตของต้นไม้ (Howe, 1979 อ้างใน สมพร, 2540) นอกจากนี้แล้วการตัดสินใจตัดฟันต้นไม้ ยังมีค่าใช้จ่ายทางอ้อมอื่นๆ เกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายทางอ้อมเหล่านี้ ได้แก่ (1) ค่าเสียโอกาสที่ควรจะได้รับจากการตัดโคนต้นไม้แต่เนื่องจากต้นไม้ต้องตัดไปใช้ประโยชน์ทางอื่น ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด และ (2) ค่าเสียโอกาสในการใช้ที่ดิน เนื่องจากว่าการตัดฟันซ้ำ จะทำให้โอกาสในการใช้ที่ดินแปลงนั้นเพื่อปลูกรอบใหม่และได้ผลตอบแทนจากการใช้ที่ดินนั้นลดลง (สมพร, 2540)

โดยทั่วไปของการจัดการสวนยางนั้น อายุยางสูงสุดที่เหมาะสมต่อการตัดฟันตามคำแนะนำ เชิงวิชาการของพบว่าอยู่ในช่วง 23 – 25 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ต้นยางให้ผลผลิตน้ำยางสูงสุดก่อนที่จะลดน้อยลง

2.2 โรคและการระบาดของโรครากขาวในยางพารา

โรคและศัตรูของต้นยางพับได้ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งถึงโภคิน มีสาเหตุทั้งจากสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต และเกิดขึ้นได้กับทุกส่วนของต้นยาง ทำให้ต้นยางชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และอาจรุนแรงถึงทำให้ต้นยางยืนต้นตาย แม้ว่ายางพาราจะมีโรคระบาดอยู่หลายชนิด ปัจจุบันพันธุ์ยางที่ปลูกในประเทศไทยมีความอ่อนแอก่อต่อโรคที่สำคัญ ที่มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากเชื้อรา โดยการเข้าทำลายน้ำ สามารถจำแนกตามส่วนต่างๆ ของต้นที่ถูกเชื้อเข้าทำลาย ได้แก่ โรคใบ โรคกิ่งก้านและลำต้น และโรคราก นอกจากโรคเหล่านี้ แล้วยังมีแมลงศัตรูของยางบางชนิดที่ทำความเสียหายให้กับต้นยางได้ เช่น กัน

สำหรับในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นถึงความเสียหายจากโรคที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อรากขาว จึงได้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโรคดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

2.2.1 โรค และอาการของโรครากขาว

โรครากขาว เกิดจากเชื้อรา มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า *Rigidoporus microporus* เป็นประเภทเห็ดรา เมื่อพืชเป็นโรค จะพบคอกเห็ดคลีสัมที่โคนต้น ลักษณะคอกเห็ดเป็นแผ่นครึ่งวงกลม ไม่มีก้านขึ้นซ้อนๆ กัน คอกเห็ดที่แข็งอ่อนอยู่จะมีสีส้ม ขับดูดสีก deinoid มือ คอกแกะแยกกระต่ายมีสีน้ำตาลแดง หรือน้ำตาลเหลืองสลับกัน ขอบคอกขาว ได้คอกมีสีส้มแดงหรือน้ำตาลเป็นส่วนที่สร้างสปอร์จำนวนมหาศาล ซึ่งเมื่อปลูกไว้ตกในที่เหมาะสม ก็เจริญเป็นเต็นท์ใหญ่และสร้างคอกเห็ดใหม่ได้ (สมอใจ, 2554) (ดังแสดงในภาพประกอบที่ 2.1)

เชื้อรากเข้าทำลายทางราก และแทงเส้นใยเข้าไปในเนื้อเยื่อ ทำให้การทำงานของเซลล์รากเสียหาย การดูดน้ำดูดอาหารจึงเป็นไปไม่เต็มที่ การสัมเคราะห์แสงจึงค่อยๆ ลดลง พืชแสดงอาการไม่สมบูรณ์ตามปกติ โดยใบใหม่หลังจากการผลัดใบในแต่ละรุ่น มีขนาดเรียวเล็กลง ทรงพุ่มเล็กลง ต้นตาย ในขณะก่อนหรือระยะเดียวกับที่พืชแสดงอาการใบเหลือง หากขุดดูรากจะปรากฏเส้นใยราศีขาวแตกสาขาเป็นร่างแท้ (อาจเรียกว่า โซมอฟ หรือ rhizomorph) เจริญแบบกับรากยาง (ดังภาพประกอบที่ 2.2) โรคนี้จึงมีชื่อเรียกโรครากขาว ตามลักษณะอาการที่ปรากฏที่ราก



ภาพประกอบที่ 2.1 แสดงลักษณะและการอาศัยอยู่ของเชื้อรา โรครากราขาว



ภาพประกอบที่ 2.2 ลักษณะเด็นไบรารสีขาวที่แตกสาขาเป็นร่างแท่ง (พนในแปลงยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช และระนอง)

2.2.2 กระบวนการและการเข้าทำลายของเชื้อราโรคราขาว

เชื้อราจะแพร่กระจายได้โดยการสัมผัสระหว่างรากที่เป็นโรคกับรากต้นปกติ หรือสปอร์เชื้อราปลิวไปตามลม โดยจะเกิดกระบวนการในยางพาราได้ตลอดทั้งปี แต่กระบวนการอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูฝนและกระบวนการได้ทั้งในยางขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทำให้ยางพาราได้รับความเสียหายและตายได้ (สุภา, 2550) ในแปลงที่ปลูกครั้งแรกมักพนในยางที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ส่วนในยางที่ปลูกเป็นรอบที่ 2 หรือ 3 และไม่ได้กำจัดตอเก่า มักพนในยางอายุ 1 ถึง 5 ปี แล้วแต่การสะสมของ

เชื้อรำในดินในแปลงย่างน้ำนั้น การระบาดที่เห็นได้ชัดเจน มักพบในย่างพาราในรุ่นที่ 2 หรือ 3 เกย์ตกรในหลายพื้นที่ไม่มีการจัดการพื้นที่ก่อนมีการเพาะปลูกในรอบการผลิตใหม่เท่าที่ควร เช่น ไม่มีการขุดตอเก่าเพาทำลาย ไม่มีการไถพื้นที่เพื่อปลิกและตากหน้าดิน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การจัดการดังกล่าวไม่สามารถทำได้ในหลายพื้นที่ เช่น ที่เข้า ควบ ซึ่งเครื่องจกรไม่สามารถเข้าไปได้ และยากต่อการจัดการ

การทำลายเริ่มตั้งแต่ย่างพารามีอาการยอดใบหยิก เหี่ยว แล้วเริ่มเหลือง ไปจนถึงใบร่วง ยืนต้นตาย และโค่นล้มในที่สุด (ดังภาพประกอบที่ 2.3)



ใบเหลืองเริ่มร่วง



ใบร่วงยืนต้นตาย



โค่นล้ม

ภาพประกอบที่ 2.3 แสดงอาการของโรคตามระยะเวลาในการเข้าทำลาย

2.2.3 การป้องกันกำจัดโรคราขาว

การป้องกันกำจัดเชื้อรำ โรคราขาว ได้มีการค้นคว้า และวิจัยจากนักวิชาการต่างๆ และได้มีการเสนอแนะในการป้องกันและกำจัดเชื้อรำ ด้วยวิธีการโดยใช้สารเคมี และการเบตกรรม ดังเช่น การศึกษาของอุไร จันทรประทิน และคณะ (2554) ได้ศึกษาวิธีการใช้สารเคมีในการรักษาโรคราขาวของย่างพารา ซึ่งใช้สารเคมี 2 ชนิด คือ tridermorph และ eyproconazole โดยวิธีผสมคืน และผสมน้ำเทราด้วยโคน ซึ่งผลจากการทดลองครั้งนี้ พบว่า การผสมสารเคมีกับดิน ได้ผลดีกว่า การผสมน้ำ แต่วิธีการใช้ค่อนข้างยุ่งยากและสิ้นเปลือง นอกจากนั้นยังได้ศึกษา การคัดพันธุ์ย่างต้านทาน โรคราขาว เป็นวิธีการหนึ่งในการป้องกันกำจัดโรค โดยการศึกษาพันธุ์ที่มีระบบภูมิคุ้มกันต้านทาน แข็งแรง และต้านทานต่อ โรคราขาว เพื่อใช้เป็นต้นตอในการปลูกย่างในพื้นที่ที่เป็นโรคราขาว ผลการทดลองพบว่า พันธุ์ KRS 156 และ RRIM 600 อ่อนแอดต่อ โรคมากที่สุด

สำหรับคำแนะนำของสถาบันวิจัยฯ ได้กล่าวถึงการป้องกันกำจัดโรค โดยก่อนปลูก ย่างพารา ควรปลูกพืชคุณคุณก่อนแล้วทำการไถพรวนเพื่อปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะสมกับการเจริญ

ของพืชและจุลินทรีดินที่ส่วนใหญ่จะเป็นประizable กับพืช และอาจเป็นจุลินทรีที่เป็นศัตรูหรือเป็นจุลินทรีที่ต่อต้านกับเชื้อโรคภัยชรา

1) ในแปลงที่เคยพบโรคภัยชรา การเติมกำมะถันในแต่ละหลุ่มปลูกอัตรา 250 กรัมต่อหลุ่มปลูก อาจช่วยลดการเกิดโรคได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากเชื้อไม่ชอบดินที่เป็นกรดจัด ในขณะที่ยังยังสามารถเจริญได้

2) ในกรณีที่ปลูกยางใหม่ในพื้นที่ที่เคยปลูกไม้ยืนต้น แต่ไม่ใช่ยางก็ควรบุคคลเฉพาะทำลาย เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นที่พักอาศัยของเชื้อ

3) หากเชื้อจุลคามมากเกินไปแล้ว จำเป็นต้องใช้สารเคมี พบร่วมกับคุณโรคได้ แต่สำหรับการแนะนำให้ใช้ในแปลง นักวิชาการส่วนใหญ่ได้กล่าวเน้นว่า ต้องให้รากพืชที่มีเชื้อภาวะอยู่สัมผัส กับยาให้มากที่สุด ต้องหมั่นตรวจสอบต้นที่เป็นโรคและต้นข้างเคียงโดยรอบ การราก ยาอาจได้ผลหรือไม่ได้ผล โดยมีสาเหตุอื่นๆ เช่นมาเกี่ยวข้องด้วย เช่น พืชเป็นโรครุนแรงหรือไม่ เชื้อแพร่ไปตามรากมากเพียงใด ชนิดของดินเป็นอย่างไร (น้ำยาซึมผ่านดินได้เร็วหรือช้า) และอื่นๆ สำหรับต้นที่เป็นโรคเพียงเล็กน้อย อาจใช้สารเคมีดังตาราง และควรใช้กับต้นข้างเคียงด้วย เพื่อป้องกันโรคที่อาจลุกคามมาถึง

จากการสำรวจข้อมูลการระบาดของโรคภัยชราในพื้นที่ศึกษาในเมืองต้น ได้รวบรวมวิธีการการยับยั้ง ป้องกันและรักษาโรคภัยชราเบื้องต้นของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ได้ดังนี้

ปัจจุบันยังไม่สามารถยับยั้งการระบาดของโรคตั้งกล่าวได้อย่างเด็ดขาด ถึงแม้จะมีความพยายามในการจัดการเพื่อป้องกันรักษาโรคในหลากหลายวิธี อาทิ เช่น จำกัดแนะนำของสำนักงานกองทุนส่วนบุคคลของจังหวัดต่างๆ สำหรับยางพาราที่ยังคงเป็นครึ่งอยู่ นอกจากการใช้สารเคมี ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงแล้ว ได้แนะนำให้มีการบุคคลร่วมตัดการเชื่อมโยงผ่านทางรากจากต้นที่เป็นโรคไปสู่ต้นปกติ ส่วนการจัดการพื้นที่ก่อนปลูกในรอบการผลิตใหม่ จัดการโดยการบุคคลต่ออย่างถาวร ผ่านการทำลายเศษรากไม้ยาง และทำการไถพลิกหน้าดิน เพื่อพักหน้าดิน ในช่วงหน้าแล้ง เป็นต้น

เกษตรกรในแต่ละพื้นที่มีการจัดการเพื่อยับยั้งการระบาดของโรคในวิธีการที่หลากหลายดังนี้

1) เกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นอกจากการรักษาโรคโดยใช้สารเคมี ซึ่งไม่สามารถยับยั้งการระบาดได้แล้วนั้น เกษตรกรได้ทดลองปลูกพืชหลากหลายชนิดไว้ในพื้นที่ที่มีการระบาด ซึ่งพืชเหล่านั้น ได้แก่ ยางนา ตะเกียงทอง ประดู่ คูน กระฐินเทpa สักทอง และมะขอกกานี (ดังภาพประกอบที่ 2.4) พบร่วมเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง พื้นที่ดังกล่าวมีการระบาดของโรคภัยชราอย่างหนัก หรือแทนจะไม่เห็นการตายเพิ่มขึ้นของต้นยางบริเวณใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม การจัดการในลักษณะดังกล่าว สองคดีองกับ

การศึกษาของอุไร จันทรประทินและคณะ ที่ศึกษาพืชร่วมยางที่เป็นพืชอาศัยของเชื้อราโรครากขาวของยางพารา โดยศึกษาพืชร่วมยาง 8 ชนิด คือ ทุเรียน เนียงnak มังคุด มะลอกกานี ยางนา สะเดาบ้าน สัก เหรียง พบว่า พืชร่วมที่ไม่แสดงอาการเป็นโรคตลอดการทดลอง 2 ปี คือ มังคุด มะลอกกานี สัก และ เหรียง ส่วนพืชร่วมทั้ง 3 ชนิด คือ ทุเรียน สะเดาบ้านและเนียงnak ไม่สมควรปลูกแทนยางในหุ่มว่างหรือในพื้นที่ที่เคยเป็นโรครากรากขาวมาก่อน

ส่วนเกษตรกรหลายๆ ราย ที่ไม่สามารถยับยั้ง ป้องกันและรักษาโรคได้ ได้มีการแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต จากการปลูกยางพารา ไปปลูกปาล์มน้ำมันแทน

2) เกษตรกรในจังหวัดตัง

เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรค ได้ใช้วิธีการรักษาโรค โดยใช้สารเคมี การบุดครองตัวราก ใส่ปุ๋นขาว ใส่เกลือ สำหรับยางพาราที่ยังเปิดกรีดอยู่ ส่วนการจัดการพื้นที่ก่อนเพาะปลูกในรอบการผลิตใหม่นั้น ได้มีการจัดการบุดตอเผาทำลาย การไถพลิกหน้าดิน ซึ่งทำชำนาญฯ ครั้ง อย่างไรก็ตาม การจัดการดังกล่าวยังไม่สามารถยับยั้งการระบาดของโรคได้เลย ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง

3) เกษตรกรใน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีการยับยั้งการระบาดของโรครากรากขาวที่เกษตรกรในอำเภอพรหมคีรี ทดลองปฏิบัติ คือ การพักดินระยะยาว ใช้เวลาถึง 5 ปี ใน การพักดินโดยไม่ปลูกยางพาราชั่วlong ไป แต่หันไปปลูกมังคุดแทนในระหว่างรอการเพาะปลูกยางพาราในรอบการผลิตใหม่ ซึ่งวิธีการนี้อาจเป็นทางเลือกทำให้เกษตรกรมีความเสี่ยงต่อรายได้ที่ควรจะได้รับในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเพาะปลูกในรอบการผลิตใหม่ พบว่ายังไม่แสดงอาการของโรคแต่อย่างใด

นอกจากนั้นเกษตรกรในอำเภอร่อนพินูลย์ ได้ทำการป้องกันและกำจัดโรครากรากขาวโดยใช้สารเคมี (ดังภาพประกอบที่ 2.5) ซึ่งได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน ในเบื้องต้นนั้น ผลการใช้สารเคมีพบว่า รังับการระบาดได้ระดับหนึ่ง แต่ไม่มั่นใจว่าเชื้อโรคจะโคนทำลายอย่างเด็ดขาดหรือไม่



ภาพประกอบที่ 2.4 การทดลองปลูกพืชหลากหลายชนิดไว้ในพื้นที่ที่มีการระบาด



ภาพประกอบที่ 2.5 ตัวอย่างสารเคมีที่เกย์ตระกรในพื้นที่ศึกษาใช้ในการป้องกันกำจัดโรครากรขาว

2.3 ความเสียหายของยางพาราที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโรครากรขาว

จากลักษณะของโรค และการแพร่ระบาดซึ่งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมาก ให้แก่ประเทศไทย ที่มีพื้นที่เพาะปลูกยางพารา อาทิ ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย ศรีลังกา และฟิลิปปินส์ ตลอดจนประเทศไทย (Chee, 1990) ซึ่งจากการศึกษาของ Fox (1977, ล้านชีวิตในภารมณ์, 2541) ได้ศึกษาผลกระเทียมของโรครากรต่อจำนวนต้นที่เหลือและผลผลิตรวมของยาง ต่อไร่ต่อปี โดยการสำรวจเพื่อการคาดเดา rate ของการให้ผลผลิต (life yield) ของยาง โดยแสดงการ คำนวณปริมาณผลผลิตของต้นยางแต่ละต้นในต้นยางที่เป็นครีด เป็นเวลา 38 ปี ในสวน ยางที่ไม่เป็นโรค เป็นโรคระบาดความรุนแรงน้อย รุนแรงปานกลาง และรุนแรงมาก พบว่า จำนวน ต้นที่เหลือร้อยละ 90, 66, 53, และ 35 และผลผลิตรวมต่อไร่ต่อปี ร้อยละ 100, 81, 71 และ 56 และ

จากการศึกษาผลผลิตเฉลี่ยเป็นเวลา 4 ปี ในแปลงที่เป็นโรครากรขาวและโรครากรแดงที่ไม่มีการควบคุมและจัดการโรคเลย พบว่า ผลผลิตจะลดลงทุกปี คือ ในปีที่ 1, 2, 3 และ 4 โดยแปลงที่เป็นโรครากรขาวจะให้ผลผลิตเท่ากับ 953, 897, 861, 659 และแปลงที่เป็นโรครากรแดงจะให้ผลผลิตเท่ากับ 1155, 985, 939 และ 885 ปอนด์ต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ

ผลกระทบของโรคจากเชื้อราก *R. microporus* ในพื้นที่ป่าดิบเขาในประเทศไทย ตะวันตก ในสวนยางที่ปลูกจากต้นกล้าในปี พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) และปลูกจากต้นตอตาในปี พ.ศ. 2500 – 2504 (ค.ศ. 1957 – 1961) โดยเปรียบเทียบการสำรวจในปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) ซึ่งเป็นช่วงที่ยังไม่มีมาตรการในการควบคุมโรค กับปี พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) ซึ่งเป็นปีที่สำรวจหลังจากได้ดำเนินการการควบคุมโรคแล้ว หลังปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) พบว่ามีต้นยางที่ตายจากโรคดังกล่าวในปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) ถึงร้อยละ 32, 26, 36, 40, 28 และ 31 และในปี พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) มีต้นยางตายถึงร้อยละ 49, 46, 45, 42, 26 และ 29 ตามลำดับ และเมื่อสำรวจจำนวนต้นยางที่เหลืออยู่ในปี พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) โดยรวมต้นยางที่เป็นโรคแล้วหายจากการที่ได้รับการรักษาพบว่า ต้นยางที่ปลูกในปีต่างๆ นั้นเหลืออยู่เพียงร้อยละ 41, 36, 45, 47, 54 และ 57 จึงเห็นได้ว่าหากไม่มีการป้องกันในระยะแรกแล้วต้นยางมีโอกาสสูญทำลายโดยโรคมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรและรายได้ของประเทศเป็นอันมาก

นอกจากนี้ ในการศึกษาของ Liyanage de (1977) พบว่า ในประเทศไทยลังกา โรครากรขาวทำให้เกิดความเสียหายพาราธอร์อย่าง 10 ของพื้นที่ป่า เช่นเดียวกับประเทศไทยอ่าวอเรีย โคลส์ ที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของการเข้าทำลายของเชื้อรากสาเหตุโรค เท่ากับร้อยละ 2 ต่อปี (Gohet, 1991)

ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโรครากรขาวนี้ พิจารณาได้จากมูลค่าหรือผลประโยชน์สุทธิที่เกษตรกรได้รับจากการขายพารา มีทั้งมูลค่าจากการนำเข้าขายและไม่ขาย ซึ่งสถานะบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2544) ได้ประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ของเกษตรกรในการทำสวนยาง โดยต้นทุนในการผลิตยางพาราแบ่งเป็นสามระยะ คือ 1) ระยะเตรียมดินและปลูก 2) ระยะดูแลรักษาภายนอก 3) ระยะครึ่ง ส่วนผลประโยชน์สุทธิที่เกษตรกรได้รับ มีทั้งมูลค่าจากการขาย ไม่ใช่ ซึ่งหากมีการโภคต์ต้นยางในอายุที่แตกต่างกัน ผลประโยชน์ที่ได้รับมีความแตกต่างกันด้วย ส่วนผลผลิตน้ำยางนี้ เกษตรกรจะได้รับผลประโยชน์ตั้งแต่ยางเปิดครึ่ง ได้น้ำกึ่งคือ ยางมีอายุตั้งแต่ 7 ปีเป็นต้นไป และสามารถครึ่งยางพาราได้จนถึงอายุ 23-25 ปี ดังนั้นหากยางพาราประสบภัยปัญหาเรื่องโรครากรขาว ไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุใดของยาง แน่นอนว่าเกษตรกรจะประสบภัยปัญหาเรื่องโรครากร白白และบังเสียโอกาสของรายได้ที่จะได้รับเมื่อยางให้ผลผลิตอีกด้วย

สำหรับความเสียหายจากโรครากรขาวในยางพาราของพื้นที่ป่าดิบเขาในประเทศไทยนั้น ศูนย์วิจัยยางสงขลา (2553) ได้ประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจในสวนยางที่เป็นโรครากรขาวใน

เขตป่าดงดิบภาคใต้ตอนล่าง โดยทำการสำรวจแบบเฉพาะเจาะจงในสวนยางที่เป็นโรครากรขาว ใน 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ สงขลา พัทลุง สตูล และตรัง ซึ่งดำเนินการในปี 2551 – 2553 ผลการสำรวจ พบว่า จังหวัดพัทลุง พบการระบาดมากที่สุด จำนวน 86.7 % ร้อยละ 1.9 ของพื้นที่สำรวจ ทั้งหมด รองลงมาคือ จังหวัดตรัง จำนวน 43.3 % หรือร้อยละ 1 ของพื้นที่สำรวจทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ป่าดงดิบรวมของ 4 จังหวัด พบพื้นที่การระบาดของโรครากรขาว ร้อยละ 0.004 ของพื้นที่ป่าดงดิบรวมทั้ง 4 จังหวัด

2. 4 การประเมินความเสี่ยหายนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโรคและแมลง

การศึกษาความเสี่ยหายนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโรคและแมลงที่มีการประเมินไว้ สามารถสรุปเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินในครั้งนี้ ดังนี้

Ranjan (2004) ได้ใช้วิธี Markov Chain วิเคราะห์การเข้าทำลายของแมลง pink hibiscus mealybug ในรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การเข้าทำลายของแมลงดังกล่าวไม่ได้เป็นลักษณะเชิงเส้น และการเข้าทำลายขึ้นอยู่กับอัตราการมาถึง (rate of arrival) และการตรวจพบเจอแมลงศัตรูพืช ส่วน วิโรจน์ ตั้งสุทธิเจริญ (2548) ได้ประเมินค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการระบาดของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ภายใต้สถานการณ์สมมุติที่แตกต่างกัน พบว่า ความสูญเสียสูงถึง 4.7-46 พันล้านบาทในปี พ.ศ. 2551 และ 4.4-43 พันล้านบาท ในปี พ.ศ. 2552 และ 4.8-47.2 พันล้านบาท ในปี พ.ศ. 2553


กรภัทร ดำรงไทย (2545) ทำการประเมินผลเสี่ยหายนทางเศรษฐกิจของไม้สักอายุ 30 ปี จากหนอนผีเสื้อตันสัก โดยใช้หลักการวิเคราะห์โกร่งการด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิ พบว่าการผลิตไม้สักในสถานการณ์ถูกทำลายต่างๆ กันนั้น พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวกในทุกรายร่อง แมลงทำลายตั้งแต่ 1-10 รูต่อตันก็ตาม

การประเมินความเสี่ยหายนทางเศรษฐกิจนั้นมีหลากหลายวิธีการขึ้นอยู่กับชนิดของโรค เชื้อที่เป็นสาเหตุของโรค ตลอดทั้งปัจจัยอื่นๆ เช่น อัตราการมาถึง เวลาที่ตรวจเจอ เป็นต้น ส่วนการวิเคราะห์นั้นอาจจะใช้การหาความสัมพันธ์ การใช้วิธีการเชิงโปรแกรม การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทน เป็นต้น

หลักการโดยทั่วไปของการประเมินความเสี่ยหายนจากศัตรูพืช มักจะทำการประเมินรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความเสี่ยหายนของพืชที่พบ กับ อายุของพืช ลักษณะการทำลาย ปัจจัยทางกายภาพ ลักษณะพื้นที่และการจัดการที่แตกต่างกัน ซึ่งการประเมินความเสี่ยหายนจะทำการเปรียบกับสถานการณ์ที่พืชไม่ถูกทำลายเลยซึ่งเป็นกรณีพื้นฐาน (base case) ผลต่างที่ได้ถือว่าเป็นความเสี่ยหายนที่เกิดขึ้นจากศัตรูพืชนั้นเอง

2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรม และการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งการจัดการเมื่อเกิดโรคของเกษตรที่สำรวจ ผู้วิจัยได้ทำการพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแสดงในภาพประกอบที่ 2.6 ดังนี้



บทที่ 3

วิธีการดำเนินการวิจัย

ในบทนี้เป็นการนำเสนอระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งเป็นวิธีการนำไปสู่การวิเคราะห์ความเสียหายทางเศรษฐกิจ ที่เกิดจากโรคภาระในยางพาราในพื้นที่ศึกษา โดยการวิเคราะห์ความเสียหายทางเศรษฐกิจเริ่มจากการวิเคราะห์ฟังก์ชันการเข้าทำลาย (damage function) ของเชื้อราโรคภาระที่ปรากฏในสวนยางของเกษตรกรที่ทำการสำรวจ เมื่อได้ฟังก์ชันการเข้าทำลายแล้วจึงทำการท่านายจำนวนต้นที่แท้จริงที่เชื้อราเข้าทำลายเพื่อคำนวณความเสียหายที่เกิดจากการเสียโอกาสที่จะได้ผลผลิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าต้นยางไม่ถูกทำลาย รวมถึงต้นทุนที่ประหัดได้จากการไม่ต้องเสียเงินทุนไปกับต้นยางที่ถูกทำลาย โดยจะต้องจำลองสถานการณ์ของการเข้าทำลายเริ่มจากปีที่ 1 จนถึงปี 25 โดยทำการคิดคดคระแสรต้นทุนและผลตอบแทนมาเป็นปีปัจจุบันเพื่อทำการเปรียบเทียบสถานการณ์การเข้าทำลายในปีที่สมมุติต่างๆ ในระดับฟาร์ม

รายละเอียดของวิธีการวิจัย ซึ่งจะได้นำเสนอถึงข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้

3.1 ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.1.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยางพารา และโรคภาระที่เกิดขึ้นกับยางพารา ตลอดจนงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคในยางพารา โดยจะเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ในการผลิตยางพารา ตลอดลักษณะทางภูมิอากาศ ภาวะฝนตกและฤดูกาล และพื้นที่ปลูกยางในจังหวัดต่างๆ ที่คาดว่าจะมีความเกี่ยวพันกับการเกิดโรคและความรุนแรงของการระบาดของโรคภาระในยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อกลางทางเศรษฐกิจของผลิตยางพารา ตลอดจนภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งได้ใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนการศึกษาให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงในแต่ละประเด็นต่อไป

3.1.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ทำการเก็บรวบรวมจากภาคสนามโดยมีการสุ่มตัวอย่างและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำหนดขั้นตอนดังนี้

1) ประชากร

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ เกษตรกรชาวสวนยางพาราในภาคใต้ของประเทศไทย ที่ประสบปัญหาจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพารา

2) การสุ่มตัวอย่าง

2.1) การเลือกพื้นที่

ใช้วิธีการเลือกแบบเนพะเจาะจง (Purposive Selection) โดยเลือกจังหวัดที่พบร沧桑โรครากรขาว เป็นตัวแทนของจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออก จำนวน 4 จังหวัด และตัวแทนของภาคใต้ฝั่งตะวันตก จำนวน 4 จังหวัด ดังแสดงในตารางที่ 3.1

2.2) การเลือกตัวอย่าง

การคัดเลือกตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้คัดเลือกตัวอย่างเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

2.2.2) การคัดเลือกเกษตรกรที่เป็นตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ในระดับฟาร์ม

เนื่องจากไม่ทราบจำนวนประชากรของผู้เสียหายจากโรครากรขาว ในยางพาราเข้าทำลาย ทำให้ไม่สามารถใช้การสุ่มแบบอาทิตย์ความกว้างเป็นได้ และการสุ่มแต่ละครั้งนั้น ทุก ๆ หน่วยของประชากรมีโอกาสถูกสุ่มมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง ไม่เท่าเทียมกัน (ฉัตรศิริ, 2544) ดังนั้นในการสุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนจากประชากร โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive หรือ judgmental sampling) เนพะเจาะจงที่ประสบปัญหารากรขาวในยางพารา เท่านั้น ซึ่งการเลือกตัวอย่างนั้น ได้ทำการสอบถามเจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางในแต่ละพื้นที่ของทุกจังหวัด เกี่ยวกับพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการระบาดของโรค หลังจากนั้นจึงเข้าไปสอบถามความและเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (snowball sampling) เพื่อให้ได้เกษตรกรที่ประสบปัญหาจากโรครากรขาวในยาง โดยผลของการสุ่มตัวอย่างในแต่ละจังหวัด ดังแสดงในตารางที่ 3.1

2.2.3) การคัดเลือกเกษตรกรที่เป็นตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านดัชนทุน และผลตอบแทน

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ นอกจากราชได้ทราบข้อมูลการระบาดของโรครากรขาวแล้ว ยังได้ทำการสุ่มเลือกตัวอย่างเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อทำการสอบถามด้านดัชนทุนในการผลิตยาง โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive หรือ judgmental sampling) เพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัด ดังแสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 แสดงจำนวนตัวอย่างเกณฑ์ตรรกะที่ประสบปัญหาโรค rak ภายในยางพาราในพื้นที่ศึกษา

จังหวัด/อำเภอ	จำนวนตัวอย่าง	
	กลุ่มที่ 1	กลุ่มที่ 2
ชุมพร	30	2
ปะทิว	22	
ละแม	8	
สุราษฎร์ธานี	29	3
ท่าชนะ	20	
ท่าจัง	4	
บ้านนาเดิม	5	
นครศรีธรรมราช	45	4
เมือง	5	
ล้านสกา	10	
พรหมคีรี	9	
นบพิเตา	13	
ท่าศาลา	6	
พระพรหม	2	
สงขลา	26	2
หาดใหญ่	3	
คลองหอยไช่	13	
สะเดา	6	
ระนอง	50	3
กระบุรี	50	
กระน้ำ	30	3
เมือง	15	
เนื้อคลอง/คลองท่อม	4	
ปลายพะยາ	11	
ตรัง	29	3
สิงคโปร์	16	

ตารางที่ 3.1 (ต่อ)

จังหวัด/อำเภอ	จำนวนตัวอย่าง	
	กลุ่มที่ 1	กลุ่มที่ 2
นาโยว	13	
สตูล	24	1
เมือง	2	
ควบคุม	4	
ละงู	18	
รวม	263	21

หมายเหตุ กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกมาเพื่อสอบถามข้อมูลทั่วไป และการระบาดของโรค

กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกมาเพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกด้านต้นทุน

3) การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้

ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์รายบุคคล (Personal Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ เกษตรกรตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง 2 แบบ คือ แบบสอบถามชุดแรก เป็นการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งมีแนวคำถามประเด็นต่างๆ ได้แก่ ลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับยางพารา และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต เศรษฐกิจการผลิตยางพาราของเกษตรกร การประเมินการแพร่ระบาดของโรครากรขาว การจัดการโรครากรขาว และการประเมินความเสี่ยหายนทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพารา และแบบสอบถามเพื่อถามข้อมูลในเชิงลึกด้านต้นทุนการผลิต

3.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

รายละเอียดของวิธีการวิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยหายนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในระดับฟาร์ม ภายใต้สถานการณ์ที่กำหนดขึ้น และข้อมูลนี้เบื้องต้นที่เอื้ออำนวยต่อการวิเคราะห์ สามารถอธิบายในรายละเอียด ตามหัวข้อต่อไปนี้

3.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งมีคำถามประเด็นต่างๆ ได้แก่ ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับยางพารา และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต เศรษฐกิจการผลิตยางพาราของเกษตรกร การประเมินการแพร่ระบาดของโรครากรขาว

ขาว การจัดการโรคราข้าว โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอด้วยตารางประกอบคำอธิบาย

3.2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจระดับฟาร์ม

เนื่องจากสวนยางพาราเป็นพืชอายุยืน การประมาณการความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจึงต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของเวลา (time component) ที่เกี่ยวข้องกับค่าเสี่ยหโอกาสของเงิน (opportunity cost of money) ดังนั้นการวิเคราะห์จะแสดงองค์ประกอบของต้นทุน และผลตอบแทนทางการเงินของเกษตรกรชาวสวนยาง ด้วยตัวชี้วัดมูลค่าปัจจุบันสุทธิร่วมกับการประมาณการการเข้าทำลายของเชื้อร้ายได้สถานการณ์การเข้าทำลายที่แตกต่างกัน ก็จะสามารถประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจในระดับฟาร์มของเกษตรกรได้ โดยมีรายละเอียดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1) การหาฟังก์ชันการเข้าทำลาย (damage function)

การเข้าทำลายของเชื้อร้ายที่ก่อให้เกิดโรคราข้านั้นเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ต้นยางอายุยังน้อย 1 ปี เป็นต้นไป (สมอใจ, 2554) โดยจะเข้าทำลายทั้งในยางที่สภาพการปลูกในพื้นที่เป็นครั้งแรก (ยางเปิดใหม่ หรือยางรุ่นแรก) และ ยางที่ปลูกในรุ่นที่ 2 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ว่า ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ เช่น ดิน โครงสร้างของดิน พื้นที่ร่วน ที่ลุ่มหรือพื้นที่ไหล่เขา ตลอดลักษณะทางภูมิอากาศ ภาวะฝนตกและฤดูกาล และพื้นที่ปลูกยางในจังหวัดต่างๆ คาดว่าจะมีผลต่อการเกิดโรคและความรุนแรงของการเกิดโรคได้เช่นกัน

ซึ่งในการทดสอบว่าลักษณะทางกายภาพดังกล่าวจะมีผลต่อการเกิดโรคและความรุนแรงของการเกิดโรคหรือไม่นั้น ได้ทำการทดสอบความเป็นอิสระต่อกันโดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Statistics)

ในการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างจำนวนต้นที่แท้จริงถูกทำลายและอายุของยางที่สังเกตเห็นการเข้าทำลาย ตลอดจนลักษณะทางกายภาพ สภาพการปลูก และจังหวัดที่ปลูกยางนั้นสามารถเขียนในรูปสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้

$$NDD = f(AGE, CROP, AREA)$$

เมื่อ NDD คือ จำนวนต้นยางที่แท้จริงที่ถูกทำลายจากเชื้อร้ายที่ก่อให้เกิดโรคราข้าวในพื้นที่ 1 ไร่ โดยคำนวณจากจำนวนต้นที่สังเกตเห็นการเข้าทำลาย คูณกับระดับการเข้าทำลายที่มี 3 ระดับ ได้แก่

รุนแรงน้อย หรือ ระดับการเข้าทำลายประมาณ ร้อยละ 30

รุนแรงปานกลาง หรือ ระดับการเข้าทำลายประมาณ ร้อยละ 50

รุนแรงมาก หรือ ระดับการเข้าทำลายทึ่งหมวด หรือต้นยางตายทึ่งต้น
คิดเป็น ร้อยละ 100

AGE คือ อายุของต้นยางในแต่ละแปลงที่สังเกตุเห็นการเข้าทำลาย (ปี)

CROP คือ สภาพการปลูก ซึ่งเป็นตัวแปรหุ่นแทนลักษณะตัวแปรเชิงคุณภาพ ดังนี้

$CROP = 1$ เมื่อเป็นการปลูกยางรุ่นที่ 1 เป็นสภาพการปลูกยางในพื้นที่
เป็นครั้งแรก

= 0 เมื่อเป็นการปลูกยางรุ่นที่ 2 เป็นต้นไป

AREA คือ จังหวัดที่ปลูกยางและเป็นจังหวัดที่มีการสำรวจ ซึ่งเป็นตัวแปรหุ่นแทน
ลักษณะตัวแปรเชิงคุณภาพ ดังนี้

$AREA = 1$ เมื่อเป็นสวนยางในจังหวัดยะลา

= 0 เมื่อเป็นสวนยางในจังหวัดหนอง ตั้ง ศรีสุราษฎร์ธานี

$AREA2 = 1$ เมื่อเป็นสวนยางในจังหวัดหนอง

= 0 เมื่อเป็นสวนยางในจังหวัดยะลา ตั้ง ศรีสุราษฎร์ธานี
สงขลา ชุมพร และสุราษฎร์ธานี

$AREA3 = 1$ เมื่อเป็นสวนยางในจังหวัดตรัง

= 0 เมื่อเป็นสวนยางในจังหวัดยะลา ระนอง ศรีสุราษฎร์ธานี

สงขลา ชุมพร และสุราษฎร์ธานี

$AREA4 = 1$ เมื่อเป็นสวนยางในจังหวัดสตูล

= 0 เมื่อเป็นสวนยางในจังหวัดยะลา ระนอง ตรัง

สงขลา ชุมพร และสุราษฎร์ธานี

$AREA5 = 1$ เมื่อเป็นสวนยางในจังหวัดครศรีธรรมราช

= 0 เมื่อเป็นสวนยางในจังหวัดยะลา ระนอง ตรัง สตูล สงขลา

ชุมพร และสุราษฎร์ธานี

$AREA6 = 1$ เมื่อเป็นสวนยางในจังหวัดสงขลา

= 0 เมื่อเป็นสวนยางในจังหวัดยะลา ระนอง ตรัง สตูล

สงขลา ชุมพร และสุราษฎร์ธานี

$AREA7 = 1$ เมื่อเป็นสวนยางในจังหวัดชุมพร

= 0 เมื่อเป็นสวนยางในจังหวัดยะลา ระนอง ตรัง สตูล

สงขลา และสุราษฎร์ธานี

ในการประมาณการฟังก์ชันการทำลายข้างต้น ที่เป็นฟังก์ชันเชิงเดียว (single function) และตัวแปรตามเป็นตัวแปรเชิงปริมาณในมาตรฐานอัตราส่วน (ratio scale) ดังนั้นการใช้ วิธีการกำลังสองน้อยที่สุดแบบธรรมด้า หรือ Ordinary Least Squares (OLS) Methods คาดว่าจะ สามารถให้ค่าประมาณการเชิงเส้นที่ปราศจากอคติ และเป็นค่าที่ดีที่สุดได้ (best, linear and unbiased estimator) การตรวจสอบตัวแปรเพื่อค้นหาปัญหาทางเศรษฐมิตร เช่น ปัญหาการเลือกตัว แปรและปัญหาพหุสัมพันธ์ (specification error and multicollinearity) ใช้วิธีการตรวจสอบและการ แก้ไขตามวิธีการมาตรฐานที่เสนอแนะใน Koutsoyiannis (1983), Griffiths *et al.* (2009), Gujarat and Pooter (2010) และ อุยุทธ์ (2547)

เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการประมาณการฟังก์ชันการทำลายเป็นข้อมูลภาคตัดขวาง (cross-sectional data) ซึ่งมักจะเกิดปัญหาในข้อมูลที่เกี่ยวกับความคงที่ของตัวคลาดเคลื่อน (heteroscedasticity) ดังนั้น การตรวจสอบพฤติกรรมของตัวคลาดเคลื่อนดังกล่าวจึงมีความจำเป็น ซึ่งใน ที่นี้ได้ใช้วิธีของไวท์ (White heteroscedasticity) ส่วนปัญหาความสัมพันธ์กันของตัวคลาดเคลื่อนต่าง เวลา หรือต่างด้าวย่างกันนั้น ใช้วิธีการตรวจสอบด้วยวิธีการทดสอบค่าสถิติเดอร์บิน-วัตสัน (Durbin-Watson statistics) และในกรณีที่เกิดปัญหาในตัวคลาดเคลื่อนทั้งสองกรณี จะใช้วิธีการแก้ปัญหาตาม วิธีการที่เสนอแนะโดย Griffiths *et al.* (2009) และ อุยุทธ์ (2547)

ในส่วนของรูปแบบฟังก์ชัน (functional form) ที่เหมาะสมนั้น ในทางทฤษฎีทาง คณิตศาสตร์และโลกพืช นั้น พบว่าการเข้าทำลายมักจะเป็นในลักษณะของฟังก์ชันเอกโพเนนเชียล (exponential function) แต่ทั้งนี้ ลักษณะการเข้าทำลายอาจจะมีความแตกต่างกันที่กำหนดด้วยปัจจัย หรือตัวแปรที่แตกต่างกัน ได้ ดังนั้น การใช้วิธีการทดลอง (experimentation) เพื่อให้พฤติกรรมของข้อมูลเป็นตัวกำหนดรูปแบบของฟังก์ชัน เป็นการหารูปแบบฟังก์ชันที่เหมาะสมวิธี หนึ่ง หรืออาจจะใช้การทดสอบทางสถิติร่วมคู่ยกที่ได้ เช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างการทดสอบรูปแบบฟังก์ชัน แบบเส้นตรงและแบบล็อก-ล็อก (linear and log-log functional form) ที่ใช้โดย Nissapa (1992) และ Doran and Guise (1984)

2) กระแสต้นทุน (cash flow of costs) กระแสผลตอบแทน (cash flow of benefits) และการวิเคราะห์

รายการต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำสวนยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง คำนวณ โดยการดัดแปลงข้อมูลของพัชรินทร์ (2545) ลุ๊ช และบุญอา (2531) และได้จากการสัมภาษณ์ เกษตรกรเกี่ยวกับราคาของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำสวนยางพารา โดยต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ ปลูกสร้าง การดูแลรักษาสวนยาง รวมไปถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายเมื่อทำการรีดยางตั้งแต่อายุ 7 ปี เป็น ต้นไป ในการวิเคราะห์กระแสต้นทุน กระแสผลตอบแทน ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตาม

พื้นที่และลักษณะการผลิตผลผลิตของแต่ละจังหวัดที่ทำการศึกษา ได้แก่ การผลิตผลผลิตในลักษณะยางแผ่นดิน นำมายางสด และเศษยาง

2.1) ต้นทุนในการผลิตยางแผ่นดิน นำมายาง และเศษยางของเกษตรกร

ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อการจำหน่ายสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ศึกษานี้ พบว่า มีการผลิตและจำหน่ายยางใน 3 รูปแบบหลัก คือ ยางแผ่นดิน นำมายาง และเศษยาง ซึ่งมีต้นทุนที่เหมือน กันหลากรายการ จึงสามารถถกค่าไว้ในภาพรวม ได้ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้าง

(1.1) ค่าที่ดิน ที่ดินที่ใช้ในการทำสวนยางพารา โดยเกษตรกร เป็นเจ้าของที่ดินเอง ไม่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดิน แต่มีค่าภาษีบำรุงท้องที่ซึ่งต้องจ่ายให้กับองค์กร บริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนการทำสวนยางพาราในส่วนค่าภาษีบำรุงท้องที่ของที่ดิน จำนวน 5 บาทต่อไร่ต่อปี

(1.2) การปรับพื้นที่ มีค่าใช้จ่ายในการ โอดและการเผาปูน มีการ จ้างเป็นนาทต่อไร่ และการคิดจากค่าแรงงานขั้นต่ำของละจังหวัดคูณจำนวนเวลาทำงาน หน่วยเป็น นาทต่อไร่ต่อปี

(1.3) การวางแผนหลุม กิดค่าแรงจากค่าแรงงานงานขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดคูณจำนวนเวลาในการทำงาน รวมกับราคามีช่วงบต่อไร่ หน่วยเป็นนาทต่อไร่ต่อปี

(1.4) ค่าขุดหลุม ระยะปลูกที่ใช้ 3×7 เมตร กิดค่าแรงโดยการ คำนวณจาก จำนวนต้นยางคูณราคاجาขุดต่อหลุม หน่วยเป็นนาทต่อไร่ต่อปี

(1.5) การใส่ปุ๋ยรองก้น คำนวณจากปริมาณปุ๋ยที่ใส่คูณราคาน้ำปุ๋ย หน่วยเป็นนาทต่อไร่ต่อปี

(1.6) ค่าพันธุ์ยาง จำนวนต้นยางที่ปลูกคูณราคាដื่นต้น หน่วยเป็น นาทต่อไร่ต่อปี

(1.7) ค่าแรงงานปลูกยาง ในกรณีจ้างปลูกเป็นต้นคำนวณจาก จำนวนต้นยางที่ปลูกคูณราคaplูกต่อต้น และในกรณีจ้างเป็นรายวัน กิดจากค่าแรงงานขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดคูณกับจำนวนเวลาทำงาน หน่วยเป็นนาทต่อไร่ต่อปี

(1.8) การปลูกซ่อม รวมค่าแรงและราคาน้ำยางปลูกซ่อมเข้าด้วยกัน โดยคิดจากการอัตราการจ้างเป็นนาทต่อต้น หน่วยเป็นนาทต่อไร่ต่อปี

(1.9) การตัดแต่งกิ่งต้นยาง เกษตรกรจะตัดแต่งกิ่งยางปีละครั้ง ตั้งแต่ปีที่ 1 – 5 คิดจากค่าแรงงานขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดคูณกับจำนวนเวลาทำงาน หน่วยเป็นนาทต่อไร่ต่อปี

**(2) การปรับวัชพืช ค่าแรงในการปรับวัชพืชเท่ากับอัตราการจ้างขันต่อ
ของแต่ละจังหวัดคูณจำนวนเวลาการทำงาน และการจ้างปรับวัชพืชแบบเหมาบท่อไร่และบท
ต่ออัตร หน่วยเป็นบาทต่อไร่ต่อปี**

(3) การใส่ปุ๋ยบำรุงดินยาง

การใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดินยางคำนวณจากปริมาณปุ๋ย
ที่ใส่คูณราคาปุ๋ย หน่วยเป็นบาทต่อไร่ต่อปี เกษตรกรใส่ปุ๋ยตามสูตรที่แนะนำจากสำนักงานกองทุน
ส่งเสริมการทำการทำสวนยาง ส่วนปุ๋ยอินทรีย์เกษตรจะเลือกซื้อและใส่ปุ๋ยตามความเหมาะสม

**(4) ค่าแรงงานใส่ปุ๋ย กำหนดเท่ากับค่าแรงงานขันต่อข่องแต่ละจังหวัดคูณ
จำนวนเวลาทำงาน หน่วยเป็นบาทต่อไร่ต่อปี**

**(5) ค่าใช้จ่ายในการกรีด เก็บ และทำแผ่นยาง ในกรีดและทำแผ่น
จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ต่างๆ หลายรายการด้วยกัน บางรายการต้องคิดค่าเสื่อมราคาเฉลี่ยตามอายุการ
ใช้งาน แล้วนำมารบุคิดคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยลงรายการตามค่าเสื่อมอุปกรณ์ดังนี้**

(5.1) อุปกรณ์ในการกรีดยาง

**(5.1.1) ตะเกียงแบบเตอร์รี่ ใช้เพื่อให้แสงสว่างในการกรีด
ยาง คำนวณจาก จำนวนตะเกียงแบบเตอร์รี่คูณราคากำาทต่อดวง มีอายุการใช้งาน 5 ปี โดยคิดค่าเสื่อม
ราคแบบเส้นตรง หน่วยเป็นบาทต่อไร่ต่อปี**

**(5.1.2) มีดกรีดยาง คำนวณจากจำนวนมีดกรีดยางคูณราคา
มีดกรีดยางต่อเล่ม มีอายุการใช้งาน 1 ปี คิดค่าเสื่อมราคแบบเส้นตรง หน่วยเป็นบาทต่อไร่ต่อปี**

**(5.1.3) หินลับมีด คำนวณจากจำนวนหินลับมีดคูณราคากัน
ลับมีดต่อ ก้อน มีอายุการใช้งาน 1 ปี คิดค่าเสื่อมราคแบบเส้นตรง**

**(5.1.4) ค่าไฟฟาร์จมือแบบเตอร์รี่ คำนวณจากจำนวนยูนิต
ไฟฟ้าที่ใช้คูณราคายูนิตละ 4 บาท ตามอัตราการเก็บของรัฐบาล หน่วยเป็นบาทต่อไร่ต่อปี**

(5.2) อุปกรณ์ในการเก็บน้ำยาง

**5.2.1) ถั่วยรองน้ำยางและลวด牵挂าง คำนวณจาก
จำนวนถั่วยรองน้ำยางและลวด牵挂างคูณราคาก่อซุด มีอายุการใช้งาน 10 ปี โดยคิดค่าเสื่อมราค
แบบเส้นตรง หน่วยเป็นบาทต่อไร่ต่อปี**

**5.2.2) ช้อนยาง ใช้เพื่อรองรับน้ำยางที่ไหลออกมากจากต้น
ยางเพื่อกรีดให้ลงตำแหน่งถั่วยรองน้ำยาง คำนวณจากจำนวนช้อนยางคูณราคชาช้อนยางต่อชิ้น มีอายุ
การใช้งาน 1 ปี โดยคิดค่าเสื่อมราคแบบเส้นตรง หน่วยเป็นบาทต่อไร่ต่อปี**

5.2.3) ถังเก็บน้ำยาง จำนวนถังน้ำยางที่ใช้คุณราคาต่อถัง มีอายุการใช้งาน 3 ปี คิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง หน่วยเป็นบาทต่อไร่ต่อปี

5.2.4) ไม้กวาดยาง คำนวณจากจำนวน ไม้กวาดยางคุณราคาต่อค่ามีอายุการใช้งาน 1 ปี คิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง หน่วยเป็นบาทต่อไร่ต่อปี

(6) อุปกรณ์ในการทำงานแห่ง

(6.1) ถังรวมน้ำยาง เป็นถังที่รวมน้ำยางสดสำหรับการทำยางแห่งในแต่ละวัน มีอายุการใช้งาน 8 ปี คำนวณจากจำนวนถังน้ำยางคุณราคาต่อถัง ปี คิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง หน่วยเป็นบาทต่อไร่ต่อปี

(6.2) ตะกรงยาง คำนวณจากจำนวนตะกรงคุณราคาต่อตะกรง มีอายุการใช้งาน 10 ปี คิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง หน่วยเป็นบาทต่อไร่ต่อปี

(6.3) ตะแกรงกรองยาง ใช้กรองน้ำยางสดให้สะอาดจากเศษไม้และเศษใบไม้ คำนวณจากจำนวนตะแกรงคุณราคาต่อชิ้น มีอายุการใช้งาน 4 ปี คิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง หน่วยเป็นบาทต่อไร่ต่อปี

(6.4) ลวดกรองน้ำยาง คำนวณจากจำนวนลวดกรองน้ำยางคุณราคาต่อชิ้น อายุการใช้งาน 1 ปี คิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง หน่วยเป็นบาทต่อไร่ต่อปี

(6.5) จักรรีดยาง 1 ชุด ประกอบด้วยจักรรีดยางลีน และจักรรีดยางลายดอก จักรรีดยางนั้นมีไว้เพื่อทำให้ยางเป็นแผ่น โดยจักรรีดลีนเพื่อให้ยางเป็นแผ่นบางและรีดน้ำออกและรีดด้วยจักรรีดลายดอกอีกครึ่งหนึ่งเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวของยางแห่นช่วยให้ยางแห้งเร็วขึ้นและเก็บรักษาง่าย คิดคำนวณจากจำนวนชุดจักรรีดยางคุณราคาจักรรีดยางต่อชุด มีอายุการใช้งาน 15 ปี คิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง หน่วยเป็นบาทต่อไร่ต่อปี (ในกรณีผลผลิตในรูปของน้ำยาง และเศษยางไม่มีต้นทุนในส่วนนี้)

(6.6) โรงเรือนสำหรับทำยาง คำนวณจากจำนวนโรงเรือนคุณราคาโรงเรือน มีอายุการใช้งาน 20 ปี คิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง หน่วยเป็นบาทต่อไร่ต่อปี

(6.7) น้ำกรด เป็นกรดฟอร์มิก ซึ่งมีคุณสมบัติทำให้น้ำยางแข็งตัว คำนวณจากจำนวนน้ำกรดที่ใช้คุณราคาต่อขวด หน่วยเป็นบาทต่อไร่ต่อปี

(6.8) ไม้ตากยาง เนื่องจากเกษตรกรจัดทำไม้ได้เองในชุมชน โดยใช้ไม้ไผ่ขนาดยาว 3 – 4 เมตร ซึ่งตากยางได้ประมาณ 4 – 5 แผ่น ในการคำนวณจะใช้ค่าแรงงานขันต่อหัว กับ เทากับ เทียบกับเวลาที่ใช้ในการตัดไม้เพื่อทำไม้ตากยาง มีอายุการใช้งาน 2 ปี คิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง หน่วยเป็นบาทต่อไร่ต่อปี (ในกรณีผลผลิตในรูปของน้ำยาง และเศษยางไม่มีต้นทุนในส่วนนี้)

(6.9) ค่าแรงงานกรีด โดยมีอัตราการแบ่งผลประโยชน์แบบ 60 : 40, และ 50 : 50 ตามผลตอบแทนที่ได้รับ หน่วยเป็นบาทต่อไร่ต่อปี

2.2) ผลตอบแทนจากการผลิตยางแผ่นดินของเกษตรกร

ข้อกำหนดเบื้องต้นของการวิเคราะห์การลงทุนทำสวนยาง สำหรับในด้าน ผลตอบแทนจากสวนยางพาราของศึกษาในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้

(1) ยางพาราจะเริ่มให้ผลผลิตได้มีเมื่ออายุยางประมาณ 7 ปี โดยมีผลผลิตที่ แตกต่างกันไปในแต่ละปี และหมวดอายุการให้ผลประโยชน์จากน้ำยางเมื่ออายุ 25 ปี เกษตรกร ทั้งหมดได้รับเงินสนับสนุนการปลูกทดลองยาง จากกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ในช่วงยาง ก่อนเปิดกรีด อายุ 0 – 6 ปี โดยได้รับเงินสนับสนุนทั้งหมดจำนวน 55,000 บาทต่อไร่

(2) ราคายางดินแผ่นของยางพาราที่ใช้เป็นราคามูลค่าในปี พ.ศ. 2552 ที่ได้ จากการสัมภาษณ์เกษตรกร

(3) ราคามียางเป็นราคามียางเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2552 ที่ได้จากการ สัมภาษณ์เกษตรกร คือ 80,000 บาทต่อไร่

2.3) วิธีการวิเคราะห์ต้นทุน – ผลตอบแทนทางการเงินจากการผลิตยาง แผ่นดินของเกษตรกร

ต้นทุน - ผลตอบแทนทางการเงินคือไร่ของสวนยางมีการปรับเปลี่ยนมูลค่า ปัจจุบันตลอดอายุโครงการนั้น สามารถแบ่งออกเป็นต้นทุนช่วงยังไม่ให้ผลผลิต ต้นทุนช่วงให้ ผลผลิต ต้นทุนการกรีด เก็บน้ำยางและทำแพ่น และผลตอบแทนจากการทำแผ่นดินและการขายไม้ ยาง ซึ่งมีวิธีการวิเคราะห์ดังนี้

(1) ต้นทุนรวมในการทำสวนยางทั้งหมดคำนวณจากต้นทุนรวมหลังปรับ ค่าตามเวลาแล้ว โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 6.75 สามารถแบ่งต้นทุนออกเป็น 5 รายการ ดังนี้

(1.1) ต้นทุนช่วงยางยังไม่ให้ผลผลิต ซึ่งประกอบด้วย ค่าปรับ พื้นที่ ค่าวางแนวหลุม ค่าขุดหลุม ค่าปุ๋ยรองก้น ค่าพันธุ์ยาง ค่าแรงงานปลูก ค่าใช้จ่ายในการปลูก ซ้อม ค่าตัดแต่งกิ่ง ค่ากำจัดวัชพืช ค่าปุ๋ยบำรุงต้นยาง ค่าแรงงานใส่ปุ๋ย

(1.2) ต้นทุนการบำรุงรักษาช่วงยางให้ผลผลิต เป็นรายการ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสวนยางพารา โดยมีต้นทุนการบำรุงรักษาช่วงยางให้ผลผลิต ซึ่ง ประกอบด้วย ค่ากำจัดวัชพืช ค่าปุ๋ยบำรุงต้นยาง ค่าแรงงานใส่ปุ๋ย

(1.3) ต้นทุนอุปกรณ์ในการกรีด การเก็บและการทำแพ่น เป็น รายการต้นทุนในการดำเนินการในช่วงยางให้ผลผลิต ซึ่งประกอบด้วย ค่าอุปกรณ์การกรีด ค่า อุปกรณ์ในการเก็บน้ำยาง และค่าอุปกรณ์ในการทำยางแผ่นดิน

(1.4) ค่าแรงในการกรีด การเก็บและการทำแผ่น

(1.5) ค่าภาษีบำรุงท้องที่คือเป็นต้นทุนในการทำสวนยางของ

เกษตรกรชาวสวนยางด้วยการจัดเก็บโดยองค์การบริหารส่วนตำบลในอัตราไว้ละ 5 บาท

(2) ผลตอบแทน มีผลตอบแทนทางการเงินหลังปรับมูลค่าทั้งหมดของ การทำสวนยางพารา ซึ่งสามารถแบ่งรายการผลตอบแทนทางการเงินออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

(2.1) เงินอุดหนุนจากกองทุนสงเคราะห์ เป็นเงินอุดหนุนที่ได้ จากสำนักงานกองทุนฯ สำหรับการทำสวนยาง และได้รับเงินอุดหนุนในปีที่เริ่มปลูกจนยางอายุ 6 ปี ทั้งหมดเป็นเงิน ทั้งหมด 55,000 บาท ต่อไร่

(2.2) ยางแผ่นดิน น้ำยาง และเศษยาง ประมาณการจากน้ำยางใน รูปแบบการขายยางแผ่นดิน น้ำยางสด และเศษยาง ของเกษตร ซึ่งมีผลตอบแทนแตกต่างกันไปใน แต่ละปีตามปริมาณน้ำยางที่ได้รับ

(2.3) ไม้ยาง ผลตอบแทนในการขายไม้ยางในปีสุดท้าย ได้ 80,000 บาทต่อไร่

3) อัตราคิดลด และระยะเวลาของโครงการ

ในการวิเคราะห์โครงการทางด้านการเงิน เนื่องจากอายุโครงการมีอายุที่ยาวนาน จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนมูลค่าปัจจุบันเสียก่อน โดยใช้อัตราคิดลดมาคำนวณใหม่มูลค่าปัจจุบัน สุทธิ อัตราคิดลดที่นิยมนำมาใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงินนั้น มักจะใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในการ คำนวณ ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ แสดงถึงอัตราค่าเสีย โอกาสของเงินลงทุนในโครงการนั้นไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งใช้อัตราดอกเบี้ย ปี พ.ศ. 2552 เท่ากับร้อยละ 6.75 ต่อปี (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2554) โดยมีระยะเวลาของโครงการที่ 25 ปี (Nandris *et al.*, 1987)

4) การจำลองสถานการณ์ (scenario formulation) ระดับฟาร์ม

การประเมินความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจากโครงการข้าวในครั้งนี้ พิจารณาได้จาก มูลค่าปัจจุบันสุทธิในการทำสวนยางของเกษตรกร โดยต้นทุนในการผลิตยางพาราแบ่งเป็นสาม ระยะ คือ 1) ระยะเตรียมดินและปลูก 2) ระยะดูแลรักษา ก่อนกรีด 3) ระยะกรีด ส่วนผลประโยชน์ สุทธิที่เกษตรกรได้รับ นอกจากราคาจะเป็นผลผลิตจากยางในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นยางแผ่นดิน น้ำยางสด หรือเศษยางแล้วนั้น ยังมีมูลค่าจากไม้ยางในปีสุดท้ายอีกด้วย ซึ่งหากมีการเข้าทำลายของ โครงการข้าวกับต้นยางในอายุที่แตกต่างกัน ต้นทุนและผลประโยชน์จะมีความแตกต่างกันด้วย

จากที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นถึงลักษณะการเข้าทำลายของเชื้อรากที่ก่อให้เกิดโรค รากรข้าวนั้น จะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ต้นยางอายุขึ้นน้อย 1 ปี เป็นต้นไป โดยจะเข้าทำลายทั้งในยางที่สภาพ

การปลูกในพื้นที่เป็นครั้งแรก (ยางเปิดใหม่ หรือยางรุ่นแรก) และ ยางที่ปลูกในรุ่นที่ 2 เป็นต้นไป จึงได้จำลองสถานการณ์การเข้าทำลายของโรคต่อพื้นที่ปลูกยางพาราในระดับฟาร์มของเกษตรกร ตั้งแต่ปีแรก จนถึงอายุยางพารา 25 ปี ซึ่งการประมาณการจำนวนต้นที่ถูกทำลายที่แท้จริงนั้น ได้จาก ฟังก์ชันการเข้าทำลายของเชื้อราโรค根腐病 ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น และทำการจำลองสถานการณ์ การเข้าทำลายระดับฟาร์ม ตามวิธีการดังนี้

1) นูกลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายเลยในรอบ 25 ปี

นูกลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่ออยู่ในภาวะปกติหรือไม่ถูกทำลายเลยในรอบ 25 ปี ได้จากการนำผลรวมของผลตอบแทนหลังปรับนูกลค่าตามเวลาในแต่ละปี หักลบด้วยผลรวมของต้นทุนการผลิตยางพาราหลังปรับนูกลค่าตามเวลาในแต่ละปี ตามรูปแบบการผลิตในลักษณะต่างๆ (รายละเอียดในภาคผนวก ก)

2) นูกลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ละปี

นูกลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ละปี ได้จากการนำผลรวมของผลตอบแทนหลังปรับนูกลค่าตามเวลาในแต่ละปี หักลบด้วยผลรวมของต้นทุนการผลิตยางพาราหลังปรับนูกลค่าตามเวลาในแต่ละปี ตามรูปแบบการผลิตในลักษณะต่างๆ ทั้งนี้อยู่ภายใต้สถานการณ์จำลองดังนี้

2.1) เมื่อยางพาราถูกทำลายในปีที่ 1 นูกลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อถูกทำลายก็จะเริ่มคำนวณจากผลรวมของผลตอบแทนหักด้วยต้นทุนที่เข้าทำลายในปี 1 (ตามประมาณการจำนวนต้นที่ถูกทำลาย จากฟังก์ชันการทำลาย) และเมื่อยางพาราถูกทำลายในปีที่ 2 นูกลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อถูกทำลาย เท่ากับนูกลค่าปัจจุบันสุทธิในปีที่ 1 (ที่ไม่ถูกทำลาย) บวกกับนูกลค่าปัจจุบันสุทธิที่เริ่มทำลายในปีที่ 2 เป็นต้นไป และคำนวณในลักษณะดังกล่าวไปจนถึงปีสุดท้าย คือ อายุยางที่ 25 ปี เป็นไปตามลำดับ

2.1.1) นูกลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อถูกทำลายในปีที่ 1 เท่ากับ ผลรวมของนูกลค่าปัจจุบันผลตอบแทนหักลบนูกลค่าปัจจุบันต้นทุนที่เข้าทำลายตั้งแต่ปี 1 – 25

2.1.2) นูกลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อถูกทำลายในปีที่ 2 เท่ากับ นูกลค่าปัจจุบันสุทธิในปีที่ 1 (ที่ไม่ถูกทำลาย) บวกกับผลรวมของนูกลค่าปัจจุบันผลตอบแทนหักลบนูกลค่าปัจจุบันต้นทุนที่เข้าทำลายตั้งแต่ปี 2 – 25

2.1.3) นูกลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อถูกทำลายในปีที่ 3 เท่ากับ นูกลค่าปัจจุบันสุทธิในปีที่ 1 และ 2 (ที่ไม่ถูกทำลาย) บวกกับผลรวมของผลรวมของนูกลค่าปัจจุบันผลตอบแทนหักลบนูกลค่าปัจจุบันต้นทุนที่เข้าทำลายตั้งแต่ปี 3 – 25

และวิเคราะห์เข่นนีจังถึงปีที่ 25 ซึ่งต้องทำการวิเคราะห์ทั้งหมด เท่ากับ 25 ปี คุณด้วย 8 จังหวัด คุณด้วย ชนิดผลิตภัณฑ์ยางที่จำหน่าย (1-3 ชนิด) รวมจำนวนครั้งที่วิเคราะห์สูงสุด 600 ครั้ง

3) ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายเลยในรอบ 25 ปี กับมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ละปี คือมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับครัวเรือนเกษตรกร

5) ข้อสมมุติของการวิเคราะห์

เนื่องจากการทำสวนยางในภาคใต้ของประเทศไทยมีพัฒนาการมาอย่างนาน ทำให้มีการพัฒนาพันธุ์ยางที่แตกต่างกันเหมาะสมกับระบบนิเวศน์ที่แตกต่างกัน และมีรูปแบบการจัดการที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบการครีด การคูแลรักษา การขายผลผลิต ที่ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจ ด้านราคา และปัจจัยภายนอกมากำหนด ดังนั้นความซับซ้อนของการวิเคราะห์จึงมีมากขึ้น และมีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละครัวเรือนของเกษตรกรชาวสวนยาง

เพื่อให้การวิเคราะห์ความเสียหายทางเศรษฐกิจสามารถกระทำได้ภายในกรอบของข้อมูลและความเป็นไปได้ทางเทคนิค นั้น จึงจำเป็นต้องมีข้อสมมุติในการวิเคราะห์ ดังนี้

(1) จำนวนต้นยางมีจำนวนเท่ากับขั้ตตราการปลูกที่แนะนำโดยกองทุนสงเคราะห์ การทำสวนยาง 70 ต้น ต่อไร่ โดยใช้ระยะปลูก 3×7 เมตร

(2) พันธุ์ยางที่ปลูกเป็นพันธุ์ยางชนิดเดียวกันในแปลงเดียวกัน เช่น พันธุ์ RRIM600 เป็นพันธุ์เดียวกันทั้งแปลง

(3) ในแต่ละแปลงนั้น สมมุติว่ามีลักษณะดิน สภาพแวดล้อม และวิธีการจัดการแบบเดียวกัน

(4) วิธีการรักษาโรคภัยไข้เจ็บในปัจจุบันถือว่ายังไม่มี จึงไม่มีต้นทุนทางยาหรือต้นทุนอย่างอื่นๆ

(5) ในการวิเคราะห์นี้จะสมมุติว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากเชื้อโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังระบาดในปัจจุบัน

บทที่ 4

ผลการวิจัย

ในบทนี้เป็นการนำเสนอผลการวิจัย ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับยางพารา และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต เศรษฐกิจการผลิตยางพาราของเกษตรกร การประเมินการแพร่ระบาดของโรครากรขาว การจัดการโรครากรขาว และการประเมินความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาว ในยางพารา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

4.1 ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ศึกษา (ภาคใต้ 8 จังหวัด)

ข้อมูลลักษณะทางเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดต่างๆ ทั้งในภาพรวม ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) และภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) ดังนี้

4.1.1 ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในภาพรวม

ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคมของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในภาคใต้ ที่ได้คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างนี้ พบว่า เกษตรกรจำนวน 263 ราย ที่ได้รับความเสี่ยงจากโรครากรขาวในยางพารา มีลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม ดังแสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ศึกษา

ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม	ภาพรวมของพื้นที่ศึกษา	
	จำนวน (n=263)	ร้อยละ
อายุ (ปี)		
น้อยกว่าเท่ากับ 30	4	1.5
31 – 40	61	23.2
41 – 50	81	30.8
51-60	69	26.2
มากกว่า 60	48	18.3
อายุเฉลี่ย=49.7, อายุต่ำสุด=25.0, อายุสูงสุด=81.0, S.D.= 11.4		

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม	ภาพรวมของพื้นที่ศึกษา	
	จำนวน (n=263)	ร้อยละ
การศึกษา		
ไม่ได้รับการศึกษา	5	1.9
ประถมศึกษา	172	65.4
มัธยมศึกษาตอนต้นด้าน	29	11.0
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	27	10.3
อนุปริญญา/ปวส.	21	8.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	9	3.4
อาชีพหลัก		
ทำสวนยางพารา	250	95.1
ข้าราชการ	3	1.1
รับจ้างทั่วไป	4	1.5
ค้าขาย	3	1.1
ทำสวนปาล์ม	1	0.4
การเมือง	1	0.4
ธุรกิจส่วนตัว	1	0.4
อาชีพรอง		
ไม่มี	177	67.3
มี	86	32.7
ลักษณะอาชีพรอง*		
รับจ้างทั่วไป	22	25.6
ค้าขาย	14	16.3
ทำสวนยางพารา	11	12.8
ธุรกิจส่วนตัว	9	10.5
ทำสวนปาล์ม	7	8.1
ทำสวนผลไม้	6	7.0
ประมง	5	5.8

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม	ภาพรวมของพื้นที่ศึกษา	
	จำนวน (n=263)	ร้อยละ
นักการเมืองท้องถิ่น	4	4.7
ทำไร่ (กาแฟ สับปะรด)	4	4.7
เลี้ยงสัตว์	2	2.3
ข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ	2	2.3
ทำนา	2	2.3
ปลูกผัก	1	1.2

หมายเหตุ * สามารถตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่ได้รับความเสียหายจากโรค รากรขาว มีอายุเฉลี่ย 49.7 ปี อายุในช่วง อายุ 41 – 50 ปี มากที่สุด กิตเป็นร้อยละ 30.8 รองลงมา มีอายุ อายุในช่วง 51 - 60 ปี กิตเป็นร้อยละ 26.2 นอกจากนี้ มีอายุในช่วง 30 – 40 ปี ตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป และ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี กิตเป็นร้อยละ 23.2, 18.3 และ 1.5

สำหรับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา กิต เป็นร้อยละ 65.4 และมีการศึกษาอยู่ในแต่ละระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิตเป็นร้อยละ 11.0 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 10.3 อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 8.0 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ร้อยละ 3.4 และไม่ได้รับการศึกษาน้อยที่สุด ร้อยละ 1.9

การประกอบอาชีพของกลุ่มตัวอย่างนั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพหลักทำสวนยางพารา มากที่สุด กิตเป็นร้อยละ 95.1 และมีอาชีพหลักอื่นๆ ในสัดส่วนน้อย ได้แก่ รับจ้างทั่วไป ข้าราชการ ค้ายา ทำสวนปาล์ม การเมือง และธุรกิจส่วนตัว ส่วนอาชีพรองของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีกลุ่ม ตัวอย่างเพียงร้อยละ 32.7 ที่มีอาชีพรอง ซึ่งอาชีพรองที่ประกอบมากที่สุด คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป กิต เป็นร้อยละ 25.6 รองลงมาประกอบอาชีพค้ายา กิตเป็นร้อยละ 16.3 นอกจากนี้ประกอบอาชีพ รองอื่นๆ ตามสัดส่วน ได้แก่ ทำสวนยางพารา ร้อยละ 12.8 ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 10.5 ทำสวนปาล์ม ร้อยละ 8.1 ทำสวนผลไม้ ร้อยละ 7.0 ประมง ร้อยละ 5.8 นักการเมืองท้องถิ่น และทำไร่ ร้อยละ 4.7 เท่ากัน เลี้ยงสัตว์ ทำนา ข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ ร้อยละ 2.3 เท่ากัน และปลูกผัก ร้อยละ 1.2

4.1.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)

สำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้ทำการสำรวจการระบาดในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ซึ่งผลการศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ดังกล่าวนั้น มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราพื้นที่ภาคใต้ฟังตะวันออก (อ่าวไทย)

ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม	ชุมพร		ศรีราชา		นครศรีธรรมราช		สงขลา		รวม	
	จำนวน (n=30)	ร้อยละ	จำนวน (n=29)	ร้อยละ	จำนวน (n=45)	ร้อยละ	จำนวน (n=26)	ร้อยละ	จำนวน (n=130)	ร้อยละ
อายุ (ปี)										
น้อยกว่าเท่ากับ 30	1	3.3	-	-	-	-	1	3.8	2	1.5
31 – 40	7	23.3	5	17.2	5	11.1	1	3.8	18	13.8
41 – 50	8	26.7	9	31.0	13	28.9	11	42.3	41	31.5
51-60	10	33.3	7	24.1	13	28.9	6	23.1	36	27.7
มากกว่า 60	4	13.3	8	27.6	14	31.1	7	26.9	33	25.4
อายุเฉลี่ย	48.4		52.2		53.6		53.5		52.1	
อายุต่ำสุด	29.0		34.0		33.0		25.0		25.0	
อายุสูงสุด	66.0		72.0		67.0		73.0		73.0	
S.D.	10.4		11.9		9.5		11.5		10.8	
การศึกษา										
ไม่ได้รับการศึกษา	1	3.3	-	-	1	2.2	1	3.8	3	2.3
ประถมศึกษา	14	46.7	15	51.7	25	55.6	21	80.8	75	57.7
มัธยมศึกษาตอนต้น	8	26.7	4	13.8	5	11.1	1	3.8	18	13.8
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	4	13.3	7	24.1	6	13.3	1	3.8	18	13.8
อนุปริญญา/ปวส.	2	6.7	3	10.3	6	13.3	-	-	11	8.5
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	1	3.3	-	-	2	4.4	2	7.7	5	3.8

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม	ชุมพร		ศูนย์ภูรีชานี		นครศรีธรรมราช		สงขลา		รวม	
	จำนวน (n=30)	ร้อยละ	จำนวน (n=29)	ร้อยละ	จำนวน (n=45)	ร้อยละ	จำนวน (n=26)	ร้อยละ	จำนวน (n=130)	ร้อยละ
อาชีพหลัก										
ทำสวนยางพารา	28	93.4	29	100.0	41	91.2	26	100.0	124	95.4
ข้าราชการ	1	3.3	-	-	2	4.4	-	-	3	2.3
รับจ้างทั่วไป	1	3.3	-	-	1	2.2	-	-	2	1.5
ค้าขาย	-	-	-	-	1	2.2	-	-	1	0.8
อาชีพรอง										
ไม่มี	26	86.7	22	75.9	30	66.7	23	88.5	101	77.7
มี	4	13.3	7	24.1	15	33.3	3	11.5	29	22.3
ลักษณะอาชีพรอง*										
รับจ้างทั่วไป	1	25.0	1	14.3	4	26.7	-	-	6	20.7
ค้าขาย	1	25.0	3	42.9	2	13.3	2	66.7	8	27.6
ทำสวนยางพารา	-	-	-	-	4	26.7	-	-	4	13.8
ธุรกิจส่วนตัว	1	25.0	-	-	2	13.3	-	-	3	10.3
ทำสวนปาล์ม	1	25.0	1	14.3	-	-	-	-	2	6.9
ทำสวนผลไม้	-	-	-	-	4	26.7	-	-	4	13.8
ทำไร่ (กาแฟ สับปะรด)	-	-	1	14.3	-	-	1	33.3	2	6.9
ข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ	-	-	1	14.3	-	-	-	-	1	3.4

หมายเหตุ * สามารถตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) ในภาพรวมมีอายุเฉลี่ย 52.1 ปี หากพิจารณารายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา พบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 48.4 - 53.6 ปี ช่วงอายุของเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสงขลา มีลักษณะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มีอายุอยู่ในช่วง 41 – 50 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.0 และ 42.3 ปี ตามลำดับ จังหวัดชุมพร กลุ่มตัวอย่างมีอายุอยู่ในช่วง 51-60 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.3 ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างมีอายุตั้งแต่ 61 ปี ขึ้นไป มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.1

ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) มากกว่าครึ่งหรือร้อยละ 57.7 มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่ามีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด เช่น กัน โดยจังหวัดสงขลา เกษตรกรมีการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.8 รองลงมาคือจังหวัด นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร ร้อยละ 55.6, 51.7 และ 46.7 ตามลำดับ ระดับการศึกษาที่พบรองลงมาสำหรับจังหวัดชุมพร คือ มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 26.7 และการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าน้อยที่สุด ร้อยละ 3.3 ระดับการศึกษารองลงมาสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 24.1 และการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. น้อยที่สุด ร้อยละ 10.3 ระดับการศึกษารองลงมาสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และอนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 13.3 เท่ากัน และการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าน้อยที่สุด ร้อยละ 4.4 ส่วนระดับการศึกษารองลงมาสำหรับจังหวัดสงขลา คือ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ร้อยละ 7.7 และการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. น้อยที่สุด ร้อยละ 3.8 เท่ากัน

การประกอบอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) ทึ้งในภาพรวมและรายจังหวัดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักทำสวนยางพารา คิดเป็นร้อยละ 95.4, 93.3, 100.0, 91.1 และ 100.0 ของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ตามลำดับ ส่วนอาชีพรองของกลุ่มตัวอย่างแต่ละจังหวัด พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพรอง ร้อยละ 86.7, 75.9, 66.7 และ 88.5 และมีอาชีพรอง ร้อยละ 22.3, 13.3, 24.1, 33.3 และ 11.5 ของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรในภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) ภาพรวม จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ตามลำดับ สำหรับอาชีพรองของกลุ่มตัวอย่าง เกษตรกรในภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) ภาพรวม ที่พบมากที่สุดสามอันดับแรก ได้แก่ ค้าขายรับจ้างทั่วไป ทำสวนยางพารา และสวนผลไม้ สำหรับในจังหวัดชุมพร ได้แก่ รับจ้างทั่วไป ค้าขายธุรกิจส่วนตัว และทำสวนปาล์ม ร้อยละ 25.0 เท่ากัน อาชีพรองของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสุราษฎร์

ฐานี ได้แก่ ค้าขาย ร้อยละ 42.9 รับจ้างทั่วไป ทำสวนปาล์ม ทำไร์ (กาแฟ สับปะรด) และข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ ร้อยละ 14.3 เท่ากัน อาชีพรองของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ รับจ้างทั่วไป ทำสวนยางพารา ทำสวนผลไม้ ร้อยละ 26.7 เท่ากัน ค้าขาย และทำนา ร้อยละ 42.9 เท่ากัน ส่วนอาชีพรองของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสงขลา ได้แก่ ค้าขาย ร้อยละ 66.7 และนักการเมืองท้องถิ่น ร้อยละ 33.3 ตามลำดับ

4.1.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)

พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ทำการสำรวจการระบาดในจังหวัดระนอง ระดับ ตรัง และสตูล ซึ่งผลการศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ดังกล่าว สามารถแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราพื้นที่ภาคใต้ฟังตะวันตก (อันดามัน)

ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม	ระนอง		กระเบง		ตรัง		สตูล		รวม	
	จำนวน (n=50)	ร้อยละ	จำนวน (n=30)	ร้อยละ	จำนวน (n=29)	ร้อยละ	จำนวน (n=24)	ร้อยละ	จำนวน (n=133)	ร้อยละ
อายุ (ปี)										
น้อยกว่าเท่ากับ 30	1	2.0	1	3.3	-	-	-	-	2	1.5
31 – 40	13	26.0	10	33.3	10	34.5	10	41.7	43	32.3
41 – 50	14	28.0	8	26.7	11	37.9	7	29.2	40	30.1
51-60	15	30.0	8	26.7	5	17.2	5	20.8	33	24.8
มากกว่า 60	7	14.0	3	10.0	3	10.3	2	8.3	15	11.3
อายุเฉลี่ย	48.7		46.30		47.0		46.2		47.4	
อายุต่ำสุด	27.0		29.0		31.0		31.0		27.0	
อายุสูงสุด	80.0		66.0		81.0		68.0		81.0	
S.D.	11.9		10.16		13.1		10.4		11.5	
การศึกษา										
ไม่ได้รับการศึกษา	-	-	1	3.3	1	3.4	-	-	2	1.5
ประถมศึกษา	39	78.0	19	63.3	24	82.8	15	62.5	97	72.9
มัธยมศึกษาตอนต้น	5	10.0	3	10.0	1	3.4	2	8.3	11	8.3
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	3	6.0	4	13.3	2	6.9	-	-	9	6.8
อนุปริญญา/ปวส.	3	6.0	2	6.7	1	3.4	4	16.7	10	7.5
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	-	-	1	3.3	-	-	3	12.5	4	3.0

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม	ระนอง		กรุงบี		ตรัง		สตูล		รวม	
	จำนวน (n=50)	ร้อยละ	จำนวน (n=30)	ร้อยละ	จำนวน (n=29)	ร้อยละ	จำนวน (n=24)	ร้อยละ	จำนวน (n=133)	ร้อยละ
อาชีพหลัก										
ทำสวนยางพารา	47	94.0	29	96.7	28	96.6	22	91.6	126	94.6
รับจ้างทั่วไป	-	-	1	3.3	1	3.4	-	-	2	1.5
ค้าขาย	1	2.0	-	-	-	-	1	4.2	2	1.5
ทำสวนปาล์ม	-	-	-	-	-	-	1	4.2	1	0.8
การเมือง	1	2.0	-	-	-	-	-	-	1	0.8
ธุรกิจส่วนตัว	1	2.0	-	-	-	-	-	-	1	0.8
อาชีพรอง										
ไม่มี	32	64.0	11	36.7	20	69.0	13	54.2	76	57.1
มี	18	36.0	19	63.3	9	31.0	11	45.8	57	42.9
ลักษณะอาชีพรอง*										
รับจ้างทั่วไป	2	11.1	8	42.1	3	33.3	3	27.3	16	28.1
ค้าขาย	4	22.2	1	5.3	1	11.1	-	-	6	10.5
ทำสวนยางพารา	3	16.7	1	5.3	1	11.1	2	18.2	7	12.3
ธุรกิจส่วนตัว	3	16.7	1	5.3	2	22.2	2	18.2	8	14.0
ทำสวนปาล์ม	1	5.6	3	15.8	-	-	1	9.1	5	8.8
ทำสวนผลไม้	2	11.1	-	-	-	-	-	-	2	3.5

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม	ระนอง		กรุงปี		ตรัง		สตูล		รวม	
	จำนวน (n=50)	ร้อยละ	จำนวน (n=30)	ร้อยละ	จำนวน (n=29)	ร้อยละ	จำนวน (n=24)	ร้อยละ	จำนวน (n=133)	ร้อยละ
ประมง	-	-	4	21.1	-	-	1	9.1	5	8.8
ทำไร่ (กาแฟ สับปะรด)	2	11.1	2	10.5	2	22.2	-	-	6	10.5
เลี้ยงสัตว์	1	5.6	-	-	-	-	1	9.1	2	3.5
ข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ	-	-	1	5.3	-	-	-	-	1	1.8
ปลูกผัก	-	-	-	-	-	-	1	9.1	1	1.8

หมายเหตุ * สามารถตอบໄດ້มากกว่า 1 คำตอบ

จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกย์ตระกรผู้ป่วยพาราในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดับมัน) มีอายุเฉลี่ย 47.4 ปี เมื่อพิจารณารายจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง กระนี่ ตรัง และสตูล มีอายุเฉลี่ยใกล้เคียงกัน ระหว่าง 46.2 - 48.7 ปี ตามลำดับ อายุของกลุ่มเกย์ตระกรจังหวัดกระนี่ และสตูล มีลักษณะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มีอายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.3 และ 41.7 ปี ตามลำดับ จังหวัดระนอง กลุ่มตัวอย่างมีอายุอยู่ในช่วง 51-60 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.0 ส่วนจังหวัดตรัง กลุ่มตัวอย่างมีอายุอยู่ในช่วง 41 – 50 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.9 ตามลำดับ

ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกย์ตระกรผู้ป่วยพาราในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดับมัน) ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 72.9 มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างของแต่ละจังหวัดมีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างของจังหวัดตรังมีการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82.8 รองลงมาคือจังหวัดระนอง กระนี่ และสตูล ร้อยละ 78.0, 63.3 และ 62.5 ตามลำดับ ระดับการศึกษาที่พบร่องลงมาสำหรับจังหวัดระนอง กระนี่ และสตูล คือ มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 10.0 และการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และอนุปริญญา/ปวส. น้อยที่สุด ร้อยละ 6.0 เท่ากัน ระดับการศึกษารองลงมาสำหรับจังหวัดกระนี่ คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 13.3 และการศึกษาระดับบริษุญทรีหรือสูงกว่าน้อยที่สุด ร้อยละ 3.3 ระดับการศึกษารองลงมาสำหรับจังหวัดตรัง คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 6.9 และการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. น้อยที่สุด ร้อยละ 3.4 ส่วนระดับการศึกษารองลงมาสำหรับจังหวัดสตูล คือ อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 16.7 และการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น น้อยที่สุด ร้อยละ 8.3

การประกอบอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกย์ตระกรผู้ป่วยพาราในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดับมัน) ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.6 ประกอบอาชีพหลักทำสวนยางพารา เมื่อพิจารณากลุ่มตัวอย่างของแต่ละจังหวัดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักทำสวนยางพารา คิดเป็นร้อยละ 94.0, 96.7, 96.6 และ 91.7 ของกลุ่มตัวอย่างจังหวัดระนอง กระนี่ ตรัง และสตูล ตามลำดับ ส่วนอาชีพร่องของกลุ่มตัวอย่างเกย์ตระกรผู้ป่วยพาราในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดับมัน) ในภาพรวม และรายจังหวัด พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพร่อง ร้อยละ 57.1, 64.0, 69.0 และ 54.2 ยกเว้นจังหวัดกระนี่ที่ส่วนใหญ่มีอาชีพร่อง ร้อยละ 63.3 สำหรับอาชีพร่องของกลุ่มตัวอย่างเกย์ตระกรผู้ป่วยพาราในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดับมัน) ในภาพรวมที่พูนมากที่สุดสามอันดับแรก ได้แก่ รับจ้างทั่วไป ธุรกิจส่วนตัว และสวนยางพารา สำหรับอาชีพร่องในจังหวัดระนอง ได้แก่ ค้าขาย ร้อยละ 22.2 ทำสวนยางพารา ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 16.7 เท่ากัน รับจ้างทั่วไป ทำสวนผลไม้ ทำไร่ (กาแฟ สับปะรด) ร้อยละ 11.1 เท่ากัน ทำสวนปาล์ม และเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 5.6 เท่ากัน อาชีพร่องของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดกระนี่ ได้แก่ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 42.1 ประมาณ ร้อยละ 21.1 ทำสวนปาล์ม ร้อยละ 15.8 ทำไร่ (กาแฟ สับปะรด)

ร้อยละ 10.5 ค้ายา ทำสวนยางพารา ธุรกิจส่วนตัว และข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ ร้อยละ 5.3 เท่ากัน อาชีพรองของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดต่าง ได้แก่ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 33.3 ธุรกิจส่วนตัว ทำไร่ (กาแฟ สับปะรด) ร้อยละ 22.2 เท่ากัน ค้ายา ทำสวนยางพารา ร้อยละ 11.1 เท่ากัน ส่วนอาชีพรองของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสตูล ได้แก่ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 27.3 ทำสวนยางพารา ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 18.2 เท่ากัน ทำสวนปาล์ม ประมาณ เลี้ยงสัตว์และปลูกผัก ร้อยละ 9.1 เท่ากัน ตามลำดับ

4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกยางพารา และการผลิต

ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกยางพารา และการผลิตยางพาราของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดต่างๆ ทั้งในภาพรวม ภาคใต้ ผู้ปลูกยางพารา ภาคใต้ ผู้ปลูกยางพารา ในพื้นที่ศึกษา ดังนี้

4.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกยางพารา และการผลิตยางพาราในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา (ภาคใต้ 8 จังหวัด)

(1) ขนาดเนื้อที่ปลูกยางพารา

ข้อมูลเกี่ยวกับขนาดเนื้อที่ปลูกยางพาราของเกษตรกร ในพื้นที่ศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 ขนาดเนื้อที่ปลูกยางพาราในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา

ประเด็น	ภาพรวมของพื้นที่ศึกษา	
	จำนวน (n=263)	ร้อยละ
ขนาดเนื้อที่ปลูกยางพาราทั้งหมด (ไร่)		
น้อยกว่าเท่ากับ 5	29	11.0
6 – 10	61	23.2
11 – 20	82	31.2
21 – 30	36	13.7
31 – 40	23	8.7
41 – 50	8	3.0
มากกว่า 50	24	9.1
พื้นที่เฉลี่ย = 23.4, พื้นที่ต่ำสุด = 2.0, พื้นที่สูงสุด = 210.0, S.D.= 26.3		
จำนวน (แปลง)		
1 – 2	211	80.2
3 – 5	52	19.8
จำนวนเฉลี่ย = 1.8, จำนวนต่ำสุด = 1.0, จำนวนสูงสุด = 5.0, S.D.= 1.1		

จากตารางที่ 4.4 พบว่า เนื้อที่ปลูกยางพาราของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา รวม 8 จังหวัดในภาคใต้เฉลี่ย 23.4 ไร่ โดยมีเนื้อที่ปลูกยางพาราอยู่ในช่วง 11 – 20 ไร่ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.2 รองลงมาอยู่ในช่วง 6 – 10 ไร่ ร้อยละ 23.2 นอกจากนั้นมีเนื้อที่ 21 – 30 ไร่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ไร่ ตั้งแต่ 51 ไร่ ขึ้นไป 31 – 40 ไร่ และ 41 – 50 ไร่ น้อยที่สุด ร้อยละ 13.7, 11.0, 9.1, 8.7 และ 3.0 ตามลำดับ

ส่วนจำนวนแปลงยางพารานี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพื้นที่ยางพาราเฉลี่ย 1.8 แปลง โดยมีจำนวนแปลงอยู่ในช่วง 1 – 2 แปลง เป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.2 และมีเพียงส่วนน้อยที่มีพื้นที่อยู่ในช่วง 3 – 5 แปลง ร้อยละ 19.8

(2) ลักษณะการผลิตยางพารา

สำหรับข้อมูลลักษณะการผลิตยางพาราของกลุ่มตัวอย่างเกย์ตระกรผู้ปลูกยางพารา ในพื้นที่ศึกษา ซึ่งทำการวิเคราะห์เป็นรายแปลง มีจำนวนทั้งสิ้น 474 แปลง จากจำนวนเกย์ตระกร 263 ราย มีรายละเอียดในประเด็นต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 ลักษณะการผลิตยางพาราของเกย์ตระกรผู้ปลูกยางพาราในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา

หน่วย: แปลง

ประเด็น	ภาพรวมของพื้นที่ศึกษา	
	จำนวน(n=474)	ร้อยละ
จำนวนต้นยางพาราต่อไร่ (ต้น)		
น้อยกว่า 70	22	8.4
70 – 72	136	51.7
73 – 75	64	24.3
มากกว่า 75	41	15.6
จำนวนต้นเฉลี่ย = 72.4, จำนวนต้นต่ำสุด = 50.0, จำนวนต้นสูงสุด = 100.0, S.D.= 5.0		
รอบการผลิตยางพารา		
รอบแรก	200	42.2
รอบที่ 2	226	47.7
รอบที่ 3	48	10.1
อายุยาง (ปี)		
น้อยกว่าเท่ากับ 6	144	30.4
7 – 15	150	31.6
16 – 20	91	19.2

ตารางที่ 4.5 (ต่อ)

ประเด็น	ภาพรวมของพื้นที่ศึกษา	
	จำนวน(n=474)	ร้อยละ
21 - 25	50	10.5
มากกว่า 25	39	8.2
อายุยางเฉลี่ย = 13.3, อายุยางต่ำสุด = 0.1, อายุยางสูงสุด = 36.0, S.D.= 8.6		
พันธุ์ยาง		
พันธุ์ RRIM 600	368	77.6
พันธุ์ BPM 24	61	12.9
พันธุ์ PB 235	24	5.1
พันธุ์ 251	21	4.4
พันธุ์ GT1	19	4.0
พันธุ์ 311	12	2.5
พันธุ์ PB 260	8	1.7
พันธุ์ PB 255	5	1.1
พันธุ์ PB 250	2	0.4
การขอสองเคราะห์สวนยาง		
ไม่ขอทุน	187	39.5
ขอทุน	287	60.5
ลักษณะการใช้พื้นที่เดิมก่อนปลูกยาง		
ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	45	9.5
ป่าเลื่อมโถรม	134	28.3
ป่าไม้	113	23.8
ป่ายาง/ยางพาราพันธุ์พื้นเมือง	122	25.7
ที่นา	17	3.6
สวนผลไม้	13	2.7
ไร่กาแฟ	9	1.9
สวนมะพร้าว	4	0.8
สวนผสม	4	0.8
ป่าไผ่	3	0.6

ตารางที่ 4.5 (ต่อ)

ประเด็น	ภาพรวมของพื้นที่ศึกษา	
	จำนวน(n=474)	ร้อยละ
จำเปาะ	3	0.6
พืชล้มลุก เช่น พิกกอง แตงกว่า	2	0.4
ปาล์มน้ำมัน	2	0.4
สะเดาเทียน	2	0.4
แปลงม่อน	1	0.2
ระบบยางพารา (ปัจจุบัน)		
ระบบการปลูกยางอย่างเดียว (mono crop)	403	85.0
ระบบการปลูกยางกับพืชแซม (inter crop)	58	12.2
ระบบการปลูกยางแบบผสมผสาน (mixed crop)	13	2.7
ชนิดพืชแซม (inter crop)*	(n=58)	
สะเดาเทียน	13	22.4
มังคุด	11	19.0
ลองกอง	8	13.8
กล้วย	8	13.8
สะตอ	5	8.6
จำเปาะ	3	5.2
ผัก	3	5.2
ปาล์มน้ำมัน	3	5.4
สับปะรด	3	5.4
กระถินเทพา	2	3.4
เคียงทอง	2	3.4
มะละกอ	2	3.4
มะขอกกาน妃	2	3.4
ต้นตะกู	1	1.7
ทุเรียน	1	1.7

หมายเหตุ * สามารถตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

จากตารางที่ 4.5 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการผลิตยางพาราของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ศึกษา ซึ่งมีประเด็นต่างๆ ดังนี้

การปลูกยางพาราของเกษตรกร ในพื้นที่ 1 ไร์นั้น จะมีจำนวนต้นยางพาราเฉลี่ย 72.4 ต้น การกระจายของจำนวนต้นมากกว่าครึ่งหรือร้อยละ 51.7 อยู่ในช่วง 70 – 72 ต้น รองลงมาอยู่ในช่วง 73 – 75 ต้น ร้อยละ 24.3 นอกจากนี้มีจำนวนต้นตั้งแต่ 76 ต้นขึ้นไป และน้อยกว่า 70 ต้น ร้อยละ 15.6 และ 8.4 ตามลำดับ

สำหรับรอบการผลิตยางพารานี้ เป็นการผลิตในรอบที่ 2 มากที่สุด ร้อยละ 47.7 รองลงมา เป็นการผลิตในรอบแรก ร้อยละ 42.2 และมีเพียงส่วนน้อยที่ผลิตในรอบการผลิตที่ 3 ร้อยละ 10.1 โดยมีอายุยางเฉลี่ย 13.3 ปี การกระจายของอายุอยู่ในช่วง 7 – 15 ปี มากที่สุด ร้อยละ 31.6 รองลงมา เป็นยางอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 6 ปี ร้อยละ 30.4 นอกจากนี้มีอายุอยู่ในช่วง 16 – 20 ปี 21 – 25 ปี และตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไป ร้อยละ 19.2, 10.5 และ 8.2 ตามลำดับ

พันธุ์ยางที่เกษตรกรนำมาปลูกส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ RRIM 600 ร้อยละ 77.6 รองลงมาเป็น ยางพันธุ์ BPM 24 ร้อยละ 12.9 ซึ่งเป็นพันธุ์ยางชั้น 1 ที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูง (กรมวิชาการเกษตร, 2546) นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ยางที่พบเรียงตามลำดับ คือ PB 235, สถาบันวิจัยยาง 251, GT1, สถาบันวิจัยยาง 311, PB 260, PB 255, และ PB 250 คิดเป็นร้อยละ 5.1, 4.4, 4.0, 2.5, 1.7, 1.1 และ 0.4 ตามลำดับ

เกษตรกรผู้ปลูกยางส่วนใหญ่ได้รับส่งเคราะห์การทำสวนยาง ร้อยละ 60.5 และมีบางส่วนที่ ไม่ได้รับการส่งเคราะห์การทำสวนยาง ร้อยละ 39.5

พื้นที่ป่าเลื่อนโถมเป็นพื้นที่ก่อนที่เกษตรกรทำการปลูกยางพารามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.3 รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 23.8 และเป็นพื้นที่ป่ายางหรือพื้นที่ยางพาราพันธุ์พื้นเมือง ร้อยละ 25.7 นอกจากนี้เป็นพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ ที่นา สวนผลไม้ ไร่กาแฟ สวนมะพร้าว สวนผสม ป่าไผ่ จำปาดะ พืชล้มลุก เช่น ฟิกทอง แตงกวา ปาล์มน้ำมัน สะเดาเทียน และแปลงม่อน ตามลำดับ โดยมีเกษตรกรบางส่วนที่ไม่ทราบว่าพื้นที่เดิมนั้นเคยใช้ประโยชน์อะไรก่อน ร้อยละ 9.5

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการผลิตยางพาราในปัจจุบัน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีการผลิตยางพารา เป็นระบบการปลูกยางอย่างเดียว (mono crop) ร้อยละ 85.0 มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ผลิตในระบบ การปลูกยางกับพืชแซม (inter crop) และการปลูกยางแบบผสมผสาน (mixed crop) ร้อยละ 12.2 และ 2.7 ตามลำดับ โดยกรณีที่ปลูกกับพืชแซมนั้น พบว่า สะเดาเทียนเป็นชนิดพืชแซมที่ปลูกมากที่สุด ร้อยละ 22.4 รองลงมาเป็นมังคุด ร้อยละ 19.0 นอกจากนี้เป็นพืชชนิดต่างๆ ได้แก่ ลองกอง กล้วย สะตอ จำปาทอง พัก ปาล์มน้ำมัน สับปะรด กระถินเทพา เกี๊ยบทอง มะละกอ มะลอกานี ต้นตะกู และทุเรียน

(3) ระบบการผลิตยางพารา และการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 4.6 แสดงการเปลี่ยนแปลงระบบการทำสวนยางพาราของเกษตรกรก่อนที่จะมีการผลิตในปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำสวนยางพาราของ เนื่องจาก ร้อยละ 94.7 มีเพียงส่วนน้อยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดภาวะของโรคระบาด โดยเฉพาะโรครา กขาว จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการทำสวนยางพาราหรือไม่นั้น เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.1 เห็นว่าสาเหตุดังกล่าวไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการผลิต ส่วนในอนาคตจะเปลี่ยนระบบการทำสวนยางพาราหรือไม่นั้น เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 86.7 คิดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำสวนยางพารา มีเพียงบางส่วนร้อยละ 13.3 ที่คิดจะเปลี่ยนแปลง โดยจะเปลี่ยนแปลง การผลิตเป็นแบบผสมผสานมากที่สุด ร้อยละ 45.7 รองลงมาเปลี่ยนแปลงโดยการปลูกพืชอื่นแทน ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ร้อยละ 34.3 นอกจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบปลูกยางอย่างเดียว และปลูกยางกับพืชแซม ร้อยละ 11.4 และ 8.6 ตามลำดับ

ตารางที่ 4.6 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการผลิตยางพารา และการเปลี่ยนแปลง

ประเด็น	ภาพรวมของพื้นที่ศึกษา	
	จำนวน (n=263)	ร้อยละ
การเปลี่ยนแปลงระบบการทำสวนยางพารา		
ไม่เคย	249	94.7
เคย	14	5.3
โรครา กขาว เป็นปัจจัยส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการทำสวนยางพารา		
ไม่ใช่	237	90.1
ใช่	26	9.9
ในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงระบบการทำสวนยางพารา		
ไม่เปลี่ยน	228	86.7
เปลี่ยน	35	13.3
ระบบที่เปลี่ยน	(n=35)	
ระบบปลูกยางอย่างเดียว	4	11.4
ปลูกยางกับพืชแซม	3	8.6
ผสมผสาน	16	45.7
ปลูกพืชอื่นแทน ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน	12	34.3

4.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับยางพารา และการผลิตยางพาราพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)

ข้อมูลเกี่ยวกับยางพารา และการผลิตยางพาราของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีรายละเอียดดังนี้

(1) ขนาดเนื้อที่ปลูกยางพาราของเกษตรกรพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)

ข้อมูลเกี่ยวกับขนาดเนื้อที่ปลูกยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) ดังแสดงในตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) ในภาพรวม และรายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา มีขนาดเนื้อที่ปลูกยางพาราเฉลี่ย 28.1, 29.7, 38.2, 19.9 และ 29.5 ไร่ ตามลำดับ การกระจายของเนื้อที่ปลูกยางนั้น พบว่า อยู่ในช่วง 11 – 20 ไร่ มากที่สุด (ร้อยละ 30.8, 40.0, 27.6, 28.9 และ 26.9) สำหรับเนื้อที่ปลูกยางพาราอันดับรองลงมา นั้น ในภาพรวมมีเนื้อที่อยู่ในช่วง 6 – 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.2 เกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา มีเนื้อที่อยู่ในช่วง 6 – 10 ไร่ เช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 26.7 และ 23.1 ตามลำดับ ส่วนจังหวัดชุมพร มีเนื้อที่อยู่ในช่วง 21 – 30 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.7 และจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่อยู่ในช่วง 31 – 40 ไร่ และตั้งแต่ 51 ไร่ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 20.7 เท่ากัน ส่วนขนาดเนื้อที่ปลูกยางพาราที่พบน้อยที่สุดนั้น จังหวัดชุมพร พบว่า มีเนื้อที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ไร่ และเนื้อที่ 41 – 50 ไร่ (ร้อยละ 3.3 เท่ากัน) น้อยที่สุด จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ奔เนื้อที่ตั้งแต่ 41 – 50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.4 น้อยที่สุด จังหวัดนครศรีธรรมราช พ奔ว่ามีเนื้อที่ตั้งแต่ 41 – 50 ไร่ และตั้งแต่ 51 ไร่ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4.4 เท่ากัน สำหรับจังหวัดสงขลา พบว่า มีเนื้อที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.8 น้อยที่สุด

ส่วนจำนวนแปลงยางพารานั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) ในภาพรวม และรายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา มีพื้นที่ยางพาราเฉลี่ย 2.0, 1.6, 2.1, 2.2 และ 2.2 แปลง ตามลำดับ โดยการกระจายของจำนวนแปลงอยู่ในช่วง 1 – 2 แปลง เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 73.1, 86.7, 75.9, 66.7 และ 65.4 และมีเพียงบางส่วนที่มีพื้นที่อยู่ในช่วง 3 – 5 แปลง ร้อยละ 26.9, 13.3, 24.1, 33.3 และ 34.6 ของเกษตรกรในภาพรวม จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ตามลำดับ

ตารางที่ 4.7 ขนาดเนื้อที่ปลูกยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)

ประเด็น	ชุมพร		สุราษฎร์ธานี		นครศรีธรรมราช		สงขลา		รวม	
	จำนวน (n=30)	ร้อยละ	จำนวน (n=29)	ร้อยละ	จำนวน (n=45)	ร้อยละ	จำนวน (n=26)	ร้อยละ	จำนวน (n=130)	ร้อยละ
ขนาดเนื้อที่ปลูกยางพาราทั้งหมด (ไร่)										
น้อยกว่าเท่ากับ 5	1	3.3	-	-	5	11.1	1	3.8	7	5.4
6 – 10	4	13.3	3	10.3	12	26.7	6	23.1	25	19.2
11 – 20	12	40.0	8	27.6	13	28.9	7	26.9	40	30.8
21 – 30	5	16.7	5	17.2	5	11.1	5	19.2	20	15.4
31 – 40	4	13.3	6	20.7	6	13.3	4	15.4	20	15.4
41 – 50	1	3.3	1	3.4	2	4.4	-	-	4	3.1
มากกว่า 50	3	10.0	6	20.7	2	4.4	3	11.5	14	10.8
พื้นที่เปลี่ยน	29.7		38.2		19.9		29.5		28.1	
พื้นที่ต่ำสุด	5.0		8.0		2.0		2.0		2.0	
พื้นที่สูงสุด	150.0		210.0		72.0		200.0		210.0	
S.D.	28.7		38.9		16.2		38.0		30.5	
จำนวน (แปลง)										
1 – 2	26	86.7	22	75.9	30	66.7	17	65.4	95	73.1
3 – 5	4	13.3	7	24.1	15	33.3	9	34.6	35	26.9
จำนวนเฉลี่ย	1.6		2.1		2.2		2.2		2.0	
จำนวนต่ำสุด	1.0		1.0		1.0		1.0		1.0	
จำนวนสูงสุด	4.0		5.0		5.0		5.0		5.0	
S.D.	0.9		1.2		1.1		1.4		1.2	

(2) สักษณะการผลิตยางพาราของเกษตรกรพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)

ลักษณะการผลิตยางพาราของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) ดังตารางที่ 4.8 มีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี้

การปลูกยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) ในพื้นที่ 1 ไร่เนื้นปลูกยางพาราได้เฉลี่ย 72.0, 69.8, 70.3, 74.9 และ 71.8 ตัน สำหรับเกษตรกรในภาครวม จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ตามลำดับ การกระจายของจำนวนต้นยางพาราต่อไร่น้ำ พนว่า เกษตรกรในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และสงขามีการปลูกในจำนวน 70 – 72 ตันต่อไร่ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.0, 37.9 และ 65.4 ตามลำดับ ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการปลูกในจำนวนตั้งแต่ 76 ตันต่อไร่ขึ้นไป มากที่สุด ร้อยละ 35.6

รอบการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) มากกว่าครึ่งหรือร้อยละ 54.0 เป็นการผลิตในรอบที่ 2 สำหรับแต่ละจังหวัด พนว่า เกษตรกรในจังหวัดชุมพรมีการผลิตยางพารารอบแรกและรอบที่ 2 ใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 47.9 และ 45.8 ตามลำดับ เกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการผลิตยางพารารอบสองมากกว่ารอบแรกในสัดส่วนไม่มากนัก ร้อยละ 48.4 และ 43.5 ส่วนเกษตรกรในนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.3 มีการผลิตยางพารารอบแรก และเกษตรกรในจังหวัดสงขลา พนว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.4 มีการผลิตยางพารารอบที่ 2

ยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) ในภาครวม รายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขามีอายุเฉลี่ย 13.8, 16.7, 12.3, 12.8 และ 15.1 ปี ตามลำดับ การกระจายของอายุสำหรับเกษตรกรในแต่ละจังหวัด พนว่า อายุยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดชุมพรอยู่ในช่วง 16 – 20 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.5 ส่วนอายุยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา อยู่ในช่วง 7 – 15 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.3, 36.4 และ 28.6 ตามลำดับ

สำหรับประเด็นพันธุ์ยางพาราที่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) ใช้ปลูกนั้น ส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.1, 100.0, 95.2, 93.9 และ 92.9 ของเกษตรกรภาครวมและทุกจังหวัดนิยมปลูกพันธุ์ RRIM 600 ซึ่งเป็นพันธุ์ส่งเสริมของกรมวิชาเกษตร มีเพียงส่วนน้อยที่ใช้พันธุ์ยางอื่นๆ เช่น พันธุ์BPM 24 พันธุ์PB 255 พันธุ์PB 235 เป็นต้น

เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) ภาครวมมากกว่าครึ่งหรือร้อยละ 66.8 มีการขอรับทุนสนับสนุนทางการทำการทำสวนยาง ส่วนเกษตรกรในรายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขามากกว่าครึ่งมีการขอรับทุนสนับสนุนทางการทำการทำสวนยาง คิดเป็นร้อยละ 58.3, 59.7, 70.7 และ 75.0 ตามลำดับ

ลักษณะการใช้พื้นที่เดิมก่อนปลูกยางของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) เป็นป่ายาง/ยางพาราพันธุ์พื้นเมืองมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.1 รองลงมาเป็นป่าไม้ และป่าเสื่อม เป็นต้น ส่วนเกษตรกรในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา พบว่า การใช้พื้นที่ก่อนจะปลูกยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดชุมพรเป็นป่าเสื่อมโตรรม 多 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ ยางพาราพันธุ์พื้นเมือง ไร่กาแฟ เป็นต้น การใช้พื้นที่ก่อนจะปลูกยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นป่าไม้ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.3 รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโตรรม ป่ายางหรือยางพาราพันธุ์พื้นเมือง เป็นต้น การใช้พื้นที่ก่อนจะปลูกยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ป่ายางหรือยางพาราพันธุ์พื้นเมือง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.4 รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ สวนผลไม้ เป็นต้น การใช้พื้นที่ก่อนจะปลูกยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ป่ายางหรือยางพาราพันธุ์พื้นเมือง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.6 รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ ป่าเสื่อมโตรรม เป็นต้น

ระบบการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) ในภาพรวม และรายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ส่วนใหญ่เป็นระบบการปลูกยางอย่างเดียว คิดเป็นร้อยละ 78.9, 85.4, 90.3, 60.6 และ 92.9 ตามลำดับ และมีการผลิตในระบบการปลูกยางกับพืชแซม โดยที่เห็นเด่นชัดในจังหวัดนครศรีธรรมราชและชุมพร ซึ่งพืชแซมที่เกษตรกรทั้งสองจังหวัดปลูกแซมนั้น มีลักษณะแตกต่างกันตามพื้นที่ กล่าวคือ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชจะนิยมปลูกไม้ผล เช่น มังคุด ลองกอง ไม้ยืนต้น เช่น สะเดาเทียม สะตอ เป็นพืชแซมในสวนยางพารา ส่วนในจังหวัดชุมพร นิยมปลูกพืชล้มลุก เช่น มะละกอ กล้วย เป็นต้น และมีบางส่วนที่ปลูกไม้ยืนต้นประเภท มะ肖อกกานี ตะเคียนทอง ต้นตะกู เป็นต้น

ตารางที่ 4.8 ลักษณะการผลิตยางพาราของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)

หน่วย: แปลง

ประเด็น	ชุมพร		สุราษฎร์ธานี		นครศรีธรรมราช		สงขลา		รวม	
	จำนวน (n=48)	ร้อยละ	จำนวน (n=62)	ร้อยละ	จำนวน (n=99)	ร้อยละ	จำนวน (n=56)	ร้อยละ	จำนวน (n=265)	ร้อยละ
จำนวนต้นยางพาราต่อไร่ (ต้น)										
< 70	9	18.8	20	32.3	8	8.1	-	-	37	14.0
70 – 72	35	72.9	26	41.9	24	24.2	34	60.7	119	44.9
73 – 75	1	2.1	12	19.4	28	28.3	16	28.6	57	21.5
> 75	3	6.3	4	6.5	39	39.4	6	10.7	52	19.6
จำนวนต้นเฉลี่ย	69.3		69.7		74.9		72.0		72.0	
จำนวนต้นต่ำสุด	60.0		60.0		65.0		70.0		60.0	
จำนวนต้นสูงสุด	80.0		80.0		90.0		76.0		90.0	
S.D.	4.5		4.6		5.1		2.5		5.0	
รอบการผลิตยางพารา										
รอบแรก	23	47.9	27	43.5	34	72.3	9	16.1	87	32.8
รอบที่ 2	22	45.8	30	48.4	11	23.4	40	71.4	143	54.0
รอบที่ 3	3	6.3	5	8.1	2	4.3	7	12.5	35	13.2

ตารางที่ 4.8 (ต่อ)

หน่วย: แปลง

ประเด็น	ชุมพร		สุราษฎร์ธานี		นครศรีธรรมราช		สงขลา		รวม	
	จำนวน (n=48)	ร้อยละ	จำนวน (n=62)	ร้อยละ	จำนวน (n=99)	ร้อยละ	จำนวน (n=56)	ร้อยละ	จำนวน (n=265)	ร้อยละ
อายุยัง (ปี)										
น้อยกว่าเท่ากับ 6	8	16.7	18	29.0	31	31.3	16	28.6	73	27.5
7 – 15	11	22.9	25	40.3	36	36.4	16	28.6	88	33.2
16 – 20	18	37.5	11	17.7	12	12.1	8	14.3	49	18.5
21 – 25	7	14.6	6	9.7	7	7.1	9	16.1	29	10.9
มากกว่า 25	4	8.3	2	3.2	13	13.1	7	12.5	26	9.8
อายุยังเฉลี่ย	16.7		12.3		12.8		15.1		13.8	
อายุยังต่ำสุด	1.0		2.0		0.1		2.0		0.1	
อายุยังสูงสุด	33.0		33.0		30.0		30.0		33.0	
S.D.	8.0		7.6		9.1		8.7		8.6	
พั้นชี้ย่าง*										
พั้นชี้ BPM 24	2	4.2	2	3.2	-	-	1	1.8	5	1.9
พั้นชี้ RRIM 600	48	100.0	59	95.2	93	93.9	52	92.9	252	95.1
พั้นชี้ 251	-	-	1	1.6	4	4.0	1	1.8	6	2.3
พั้นชี้ 311	1	2.1	-	-	2	2.0	-	-	3	1.1

ตารางที่ 4.8 (ต่อ)

หน่วย: แปลง

ประเด็น	ชุมพร		สุราษฎร์ธานี		นครศรีธรรมราช		สงขลา		รวม	
	จำนวน (n=48)	ร้อยละ	จำนวน (n=62)	ร้อยละ	จำนวน (n=99)	ร้อยละ	จำนวน (n=56)	ร้อยละ	จำนวน (n=265)	ร้อยละ
พื้นที่ PB 255	-	-	-	-	2	2.0	-	-	2	0.8
พื้นที่ PB 235	-	-	1	1.6	-	-	4	7.1	5	1.9
พื้นที่ 563	-	-	1	1.6	-	-	-	-	1	0.4
การขอสองเคราะห์สวนยาง										
ไม่ขอทุน	20	41.7	25	40.3	29	29.3	14	25.0	88	33.2
ขอทุน	28	58.3	37	59.7	70	70.7	42	75.0	177	66.8
ลักษณะการใช้พื้นที่เดิมก่อนปลูกยาง										
ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	-	-	4	6.5	9	9.1	4	7.1	17	6.4
ป้าเลื่อมโถรม	18	37.5	16	25.8	3	3.0	9	16.1	46	17.4
ป้าไม้	8	16.7	25	40.3	27	27.3	9	16.1	69	26.0
สวนผลไม้	-	-	2	3.2	10	10.1	1	1.8	13	4.9
สวนมะพร้าว	2	4.2	-	-	-	-	-	-	2	0.8
ป่ายาง/ยางพาราพื้นที่พื้นเมือง	8	16.7	12	19.3	40	40.4	25	44.6	85	32.1
ไร่กาแฟ	5	10.4	3	4.8	1	1.0	-	-	9	3.4
พืชล้มลุก เช่น ฟักทองแตงกวา	2	4.2	-	-	-	-	-	-	2	0.8
ปาล์มน้ำมัน	1	2.1	-	-	-	-	-	-	1	0.4

ตารางที่ 4.8 (ต่อ)

หน่วย: แปลง

ประเด็น	ชุมพร		สุราษฎร์ธานี		นครศรีธรรมราช		สงขลา		รวม	
	จำนวน (n=48)	ร้อยละ	จำนวน (n=62)	ร้อยละ	จำนวน (n=99)	ร้อยละ	จำนวน (n=56)	ร้อยละ	จำนวน (n=265)	ร้อยละ
แปลงม่อน	1	2.1	-	-	-	-	-	-	1	0.4
ที่นา	3	6.3	-	-	2	2.0	3	5.4	8	3.0
ป่าไม้	-	-	-	-	-	-	3	5.4	3	1.1
สะเดาเทียม	-	-	-	-	-	-	2	3.6	2	0.8
จำปาดะ	-	-	-	-	3	3.0	-	-	3	1.1
สวนผสม	-	-	-	-	4	4.0	-	-	4	1.5
ระบบยางพารา										
ระบบการปลูกยางอย่างเดียว (mono crop)	41	85.4	56	90.3	60	60.6	52	92.9	209	78.9
ระบบการปลูกยางกับพืชแซน (inter crop)	7	14.6	4	6.5	29	29.3	4	7.1	44	16.6
- ระบบการปลูกยางแบบผสมผสาน (mixed crop)	-	-	2	3.2	10	10.1	-	-	12	4.5

ตารางที่ 4.8 (ต่อ)

หน่วย: แปลง

ประเด็น	ชุมพร		สุราษฎร์ธานี		นครศรีธรรมราช		สงขลา		รวม	
	จำนวน (n=48)	ร้อยละ	จำนวน (n=62)	ร้อยละ	จำนวน (n=99)	ร้อยละ	จำนวน (n=56)	ร้อยละ	จำนวน (n=265)	ร้อยละ
ชนิดพืชแพร่	(n=7)		(n=4)		(n=29)		(n=4)		(n=44)	
กระถินเทпа	1	14.3	-	-	1	3.4	-	-	2	4.5
ເຕີບນຫອງ	1	14.3	1	25.0	-	-	-	-	2	4.5
ກລ້ວຍ	1	14.3	-	-	3	10.3	2	50.0	6	13.6
ມະລະກອ	2	28.6	-	-	-	-	-	-	2	4.5
ມະຫອກການີ	2	28.6	-	-	-	-	-	-	2	4.5
ຜັກ	2	28.6	-	-	-	-	-	-	2	4.5
ດອນກອງ	1	14.3	-	-	5	17.2	1	25.0	7	15.9
ສະເດາເຖິມ	-	-	2	50.0	7	24.1	-	-	9	20.5
ປາລົມນໍາມັນ	-	-	1	25.0	-	-	-	-	1	2.3
ສະຕອ	-	-	-	-	4	13.8	-	-	4	9.1
ມັງຄຸດ	-	-	-	-	10	34.5	-	-	10	22.7
ຕິນຕະຖູ	1	14.3	-	-	-	-	-	-	1	2.3

หมายเหตุ * สามารถตอบໄດ້มากกว่า 1 คำตอบ

(3) ระบบการผลิตยางพารา และการเปลี่ยนแปลง

ระบบการผลิตยางพารา และการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) ดังตารางที่ 4.9 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ของภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) gamm รวม และทุกจังหวัดไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำสวนยางพารา คิดเป็นร้อยละ 89.2, 86.7, 100.0, 77.8 และ 100.0 ของเกษตรกรในภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) gamm รวม จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ตามลำดับ และมีความคิดเห็นว่า โภครากขาวไม่ได้เป็นปัจจัยส่งผลต่อการเปลี่ยนระบบการทำสวนยางพารา คิดเป็นร้อยละ 83.8, 73.3, 96.6, 73.3 และ 100.0 ของเกษตรกรในภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) gamm รวม และรายจังหวัด ตามลำดับ

ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราต่อการเปลี่ยนระบบการทำสวนยางพาราในอนาคตนี้ ส่วนใหญ่เกษตรกรในภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) gamm รวม จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช และสงขลา เห็นว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำสวนยาง คิดเป็นร้อยละ 78.5, 80.0, 80.0 และ 100.0 ตามลำดับ มีเพียงจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีความเห็นต่อการเปลี่ยนแปลง ใกล้เคียงกันระหว่างการเปลี่ยนแปลงและไม่เปลี่ยนระบบการทำสวนยาง ซึ่งระบบการผลิตที่คิดจะเปลี่ยนนี้ ส่วนใหญ่เกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีการเปลี่ยนไปเป็นระบบผสมผสาน คิดเป็นร้อยละ 84.6 สำหรับจังหวัดชุมพร และนครศรีธรรมราช หากมีการเปลี่ยนแปลง เกษตรกรจะปลูกพืชอื่นแทน ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน คิดเป็นร้อยละ 83.3 และ 55.6 ตามลำดับ

ตารางที่ 4.9 ระบบการผลิตยางพารา และการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)

ประเด็น	ชุมพร		สุราษฎร์ธานี		นครศรีธรรมราช		สงขลา		รวม	
	จำนวน (n=30)	ร้อยละ	จำนวน (n=29)	ร้อยละ	จำนวน (n=45)	ร้อยละ	จำนวน (n=26)	ร้อยละ	จำนวน (n=130)	ร้อยละ
การเปลี่ยนแปลงระบบการทำสวนยางพารา										
ไม่เคย	26	86.7	29	100.0	35	77.8	26	100.0	116	89.2
เคย	4	13.3	-	-	10	22.2	-	-	14	10.8
โครงการขาวเป็นมือจัดส่งผลต่อการเปลี่ยนระบบการทำสวนยางพารา										
ไม่ใช่	22	73.3	28	96.6	33	73.3	26	100.0	109	83.8
ใช่	8	26.7	1	3.4	12	26.7	-	-	21	16.2
ในอนาคตจะเปลี่ยนระบบการทำสวนยางพารา										
ไม่เปลี่ยน	24	80.0	16	55.2	36	80.0	26	100.0	102	78.5
เปลี่ยน	6	20.0	13	44.8	9	20.0	-	-	28	21.5
ระบบที่เปลี่ยน	(n=6)		(n=13)		(n=9)				(n=28)	
ระบบปลูกยางอย่างเดียว	-	-	1	7.7	1	11.1	-	-	2	7.1
ปลูกยางกับพืชแคร์ฟ	-	-	1	7.7	2	22.2	-	-	3	10.7
ผสมผสาน	1	16.7	11	84.6	1	11.1	-	-	13	46.4
ปลูกพืชอื่นแทน ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน	5	83.3	-	-	5	55.6	-	-	10	35.7

4.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับยางพารา และการผลิตยางพาราพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)

ข้อมูลเกี่ยวกับยางพารา และการผลิตยางพาราของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีรายละเอียดดังนี้

(1) ขนาดเนื้อที่ปลูกยางพารา

ขนาดเนื้อที่ปลูกยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) ดังแสดงในตารางที่ 4.10 พบว่า เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) ภาพรวม และรายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง grade B ตรัง และสตูลมีเนื้อที่ปลูกยางพาราเฉลี่ย 18.8, 25.2, 14.2, 14.7 และ 16.4 ไร่ ตามลำดับ ซึ่งขนาดเนื้อที่ปลูกยางพาราในจังหวัดระนองนั้นอยู่ในช่วง 11 – 20 ไร่ มากรถุด ร้อยละ 46.0 รองลงมาอยู่ในช่วง 6 – 10 ไร่ และ 21 – 30 ไร่ ร้อยละ 16.0 เท่ากัน ขนาดเนื้อที่ปลูกยางพาราในจังหวัดกระนองอยู่ในช่วง 6 – 10 ไร่ มากรถุด ร้อยละ 36.7 รองลงมาอยู่ในช่วง 11 – 20 ไร่ และ 21 – 30 ไร่ ร้อยละ 20.0 เท่ากัน ขนาดเนื้อที่ปลูกยางพาราในจังหวัดตรังมีขนาดน้อยกว่า หรือเท่ากับ 5 ไร่ มากรถุด ร้อยละ 31.0 รองลงมาอยู่ในช่วง 6 – 10 ไร่ และ 11 – 20 ไร่ ร้อยละ 27.6 เท่ากัน ส่วนขนาดเนื้อที่ปลูกยางพาราในจังหวัดสตูลนั้น อยู่ในช่วง 6 – 10 ไร่ มากรถุด ร้อยละ 37.5 รองลงมา มีขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ไร่ และ 11 – 20 ไร่ ร้อยละ 25.0 และ 20.8 ตามลำดับ

เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) ภาพรวม และรายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง grade B ตรัง และสตูลมีจำนวนแปลงยางพาราเฉลี่ย 1.6, 1.5, 1.7, 1.6 และ 1.5 แปลง ตามลำดับ ส่วนใหญ่มีการกระจายของจำนวนแปลง 1 – 2 แปลง คิดเป็นร้อยละ 87.2, 90.0, 83.3, 82.8 และ 91.7 ตามลำดับ

ตารางที่ 4.10 ขนาดเนื้อที่ปลูกยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ฟังค์ชันตก (อันดามัน)

ประเด็น	ระนอง		กระบี่		ตรัง		สตูล		รวม	
	จำนวน (n=50)	ร้อยละ	จำนวน (n=30)	ร้อยละ	จำนวน (n=29)	ร้อยละ	จำนวน (n=24)	ร้อยละ	จำนวน (n=133)	ร้อยละ
ขนาดเนื้อที่ปลูกยางพาราทั้งหมด (ไร่)										
น้อยกว่าเท่ากับ 5	2	4.0	5	16.7	9	31.0	6	25.0	22	16.5
6 – 10	8	16.0	11	36.7	8	27.6	9	37.5	36	27.1
11 – 20	23	46.0	6	20.0	8	27.6	5	20.8	42	31.6
21 - 30	8	16.0	6	20.0	1	3.4	1	4.2	16	12.0
31 – 40	2	4.0	1	3.3	-	-	-	-	3	2.3
41 - 50	1	2.0	1	3.3	2	6.9	-	-	4	3.0
มากกว่า 50	6	12.0	-	-	1	3.4	3	12.5	10	7.5
พื้นที่เนลลี่ย์	25.2		14.2		14.7		16.4		18.8	
พื้นที่ต่ำสุด	5.0		2.0		2.0		2.0		2.0	
พื้นที่สูงสุด	120.0		47.0		80.0		94.0		120.0	
S.D.	24.6		10.4		16.7		22.7		20.6	
จำนวน (แปลง)										
1 – 2	45	90.0	25	83.3	24	82.8	22	91.7	116	87.2
3 – 5	5	10.0	5	16.7	5	17.2	2	8.3	17	12.8
จำนวนเนลลี่ย์	1.5		1.7		1.6		1.5		1.6	
จำนวนต่ำสุด	1.0		1.0		1.0		1.0		1.0	
จำนวนสูงสุด	4.0		4.0		5.0		4.0		5.0	
S.D.	0.7		1.0		1.1		0.8		0.9	

(2) ลักษณะการผลิตยางพาราของเกษตรกรภาคใต้ผ่านตาก (อันดามัน)

ลักษณะการผลิตยางพาราของเกษตรกรภาคใต้ผ่านตาก (อันดามัน) ดังตารางที่ 4.11 มีรายละเอียดในประเด็นต่างๆ ดังนี้

ยางพาราของเกษตรกรในภาคใต้ผ่านตาก (อันดามัน) ภาพรวม และรายจังหวัด ได้แก่ ระนอง ยะรัง และสตูล มีจำนวนต้นต่อไร่เฉลี่ย 72.5, 70.9, 72.6, 73.6 และ 74.2 ต้น ตามลำดับ จำนวนต้นต่อไร่ของเกษตรกรจังหวัดระนองส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 70 – 72 ต้น ร้อยละ 82.7 ส่วนเกษตรกรจังหวัดยะรังมีจำนวนต้นต่อไร่อยู่ในช่วง 70 – 72 ต้น มากที่สุด ร้อยละ 51.0 รองลงมาอยู่ช่วง 73 – 75 ต้น ร้อยละ 33.3 เกษตรกรจังหวัดยะรังมีจำนวนต้นต่อไร่อยู่ในช่วง 73 – 75 ต้น มากที่สุด ร้อยละ 59.6 รองลงมาอยู่ช่วง 70 – 72 ต้น ร้อยละ 36.2 สำหรับเกษตรกรจังหวัดสตูลมี จำนวนต้นต่อไร่อยู่ในช่วง 73 – 75 ต้น มากที่สุด ร้อยละ 41.7 รองลงมาอยู่ช่วง 70 – 72 ต้น ร้อยละ 30.6 ตามลำดับ

รอบการผลิตยางพาราของเกษตรกร ในภาคใต้ผ่านตาก (อันดามัน) ภาพรวม มากกว่าครึ่งหรือร้อยละ 54.1 เป็นการผลิตในรอบแรก เมื่อพิจารณาในรายจังหวัด พบว่า เกษตรกร ในจังหวัดระนองเป็นรอบการผลิตรอบแรกมากที่สุด ร้อยละ 50.7 รองลงมาเป็นรอบการผลิตรอบที่ 2 ร้อยละ 44.0 รอบการผลิตยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดยะรัง เป็นรอบการผลิตรอบที่ 2 มากที่สุด ร้อยละ 49.0 รองลงมาเป็นรอบการผลิตรอบแรก ร้อยละ 41.2 รอบการผลิตยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดยะรังส่วนใหญ่เป็นรอบการผลิตรอบแรก ร้อยละ 72.3 รองลงมาเป็นรอบการผลิตรอบที่ 2 ร้อยละ 23.4 ส่วนรอบการผลิตยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดสตูลเป็นรอบการผลิตรอบแรกมากที่สุด ร้อยละ 55.6 รองลงมาเป็นรอบการผลิตรอบที่ 2 ร้อยละ 38.9 ตามลำดับ

ยางพาราของเกษตรกรในภาคใต้ผ่านตาก (อันดามัน) ภาพรวม และรายจังหวัด ได้แก่ เกษตรกรในจังหวัดระนอง ยะรัง และสตูล มีอายุเฉลี่ย 12.5, 10.7, 12.5, 14.5 และ 13.9 ปี ตามลำดับ สำหรับอายุยางพาราของเกษตรกรในแต่ละจังหวัด พบว่า เกษตรกรจังหวัดระนองมี ยางพาราที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 ปี มากที่สุด ร้อยละ 44.0 รองลงมาคือยางพาราในช่วง 7 – 15 ปี ร้อยละ 26.7 และมียางพาราอายุตั้งแต่ 26 ปี ขึ้นไปน้อยที่สุด ร้อยละ 4.0 เกษตรกรจังหวัดยะรังมี ยางพาราที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 ปี มากที่สุด ร้อยละ 45.1 รองลงมาคือยางพาราในช่วง 16 – 20 ปี ร้อยละ 23.5 และมียางพาราอายุตั้งแต่ 26 ปี ขึ้นไปน้อยที่สุด ร้อยละ 5.9 เกษตรกรจังหวัด ยะรังมียางพาราที่มีอายุในช่วง 7 – 15 ปี มากที่สุด ร้อยละ 42.6 รองลงมาคือยางพาราอายุน้อยกว่า หรือเท่ากับ 6 ปี ร้อยละ 19.1 และมียางพาราอายุ 16 – 20 ปี น้อยที่สุด ร้อยละ 8.5 ส่วนเกษตรกร จังหวัดสตูลมียางพาราที่มีอายุในช่วง 7 – 15 ปี มากที่สุด ร้อยละ 36.1 รองลงมา มียางพาราอายุ 16 – 20 ปี ร้อยละ 30.6 และมียางพาราอายุตั้งแต่ 26 ปี ขึ้นไปน้อยที่สุด ร้อยละ 2.8

เกย์ตระกรในภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) ภาครวม และรายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล ส่วนใหญ่ปูลูกยางพาราพันธุ์ RRIM 600 คิดเป็นร้อยละ 55.5, 86.3, 76.6 และ 88.9 ตามลำดับ ส่วนเกย์ตระกรในจังหวัดระนองเลือกปูลูกยางในหลากหลายพันธุ์กว่าพื้นที่อื่น โดยกว่าครึ่งหนึ่งของเกย์ตระกรปูลูกยางพาราพันธุ์ BPM 24 ร้อยละ 50.7 นอกจากนั้นยังพบพันธุ์ยางที่นิยมปูลูก ได้แก่ พันธุ์ GT1 พันธุ์ PB 235 พันธุ์ 251 เป็นต้น เกย์ตระกรในแต่ละจังหวัดมากกว่าครึ่ง ขอรับการสงเคราะห์สวนยาง ยกเว้นเกย์ตระกรในจังหวัดตรังที่มากกว่าครึ่งหรือร้อยละ 57.4 ไม่รับการสงเคราะห์สวนยาง

ลักษณะการใช้พื้นที่เดิมก่อนปูลูกยางของเกย์ตระกรในจังหวัดระนอง แตกต่างจากเกย์ตระกรจังหวัดอื่น กล่าวคือ ส่วนใหญ่พื้นที่สวนยางพาราเคยเป็นป่าสีอมโกรน ร้อยละ 76.0 ในขณะที่เกย์ตระกรในจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูลนั้น พื้นที่สวนยางพาราเคยเป็นป่าไม้ ป่าสีอมโกรน และป่ายาง/ยางพาราพันธุ์พื้นเมืองมาก่อน และระบบการผลิตยางพาราของเกย์ตระกรในแต่ละจังหวัดนั้น พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการผลิตระบบการปูลูกยางอย่างเดียว คิดเป็นร้อยละ 94.7, 84.3, 93.6 และ 100.0 ของเกย์ตระกรในจังหวัดระนอง กระนั้น ตรัง และสตูล ตามลำดับ สำหรับการผลิตในระบบการปูลูกยางกับพืชแซม พบในพื้นที่จังหวัดระบายน้ำมากที่สุด ซึ่งพืชแซมที่ปูลูกมากเป็นทั้งพืชยืนต้น ได้แก่ สะเดาทียอม ปาล์มน้ำมัน และพืชล้มลุก ได้แก่ สับปะรด เป็นต้น

ตารางที่ 4.11 ลักษณะการผลิตยางพาราของเกษตรกรภาคใต้ผ่านวันตก (อันดามัน)

หน่วย: แปลง

ประเด็น	ระนอง		กระบี่		ตรัง		สตูล		รวม	
	จำนวน (n=75)	ร้อยละ	จำนวน (n=51)	ร้อยละ	จำนวน (n=47)	ร้อยละ	จำนวน (n=36)	ร้อยละ	จำนวน (n=209)	ร้อยละ
จำนวนต้นยางพาราต่อไร่ (ต้น)										
น้อยกว่า 70	4	5.3	5	9.8	-	-	-	-	9	4.3
70 – 72	62	82.7	26	51.0	17	36.2	11	30.6	116	55.5
73 – 75	3	4.0	17	33.3	28	59.6	15	41.7	63	30.1
มากกว่า 75	6	8.0	3	5.9	2	4.3	10	27.8	21	10.0
จำนวนต้นเฉลี่ย	70.9		72.6		73.6		74.2		72.5	
จำนวนต้นต่ำสุด	50.0		65.0		70.0		70.0		50.0	
จำนวนต้นสูงสุด	90.0		100.0		76.0		81.0		100.0	
S.D.	5.5		5.1		2.0		3.3		4.6	
รอบการผลิตยางพารา										
รอบแรก	38	50.7	21	41.2	34	72.3	20	55.6	113	54.1
รอบที่ 2	33	44.0	25	49.0	11	23.4	14	38.9	83	39.7
รอบที่ 3	4	5.3	5	9.8	2	4.3	2	5.6	13	6.2

ตารางที่ 4.11 (ต่อ)

หน่วย: แปลง

ประเด็น	ระนอง		กรุงปี		ตรัง		สตูล		รวม	
	จำนวน (n=75)	ร้อยละ	จำนวน (n=51)	ร้อยละ	จำนวน (n=47)	ร้อยละ	จำนวน (n=36)	ร้อยละ	จำนวน (n=209)	ร้อยละ
อายุยัง (ปี)										
น้อยกว่าเท่ากับ 6	33	44.0	23	45.1	9	19.1	6	16.7	71	34.0
7 - 15	20	26.7	9	17.6	20	42.6	13	36.1	62	29.7
16 – 20	15	20.0	12	23.5	4	8.5	11	30.6	42	20.1
21 - 25	4	5.3	4	7.8	8	17.0	5	13.9	21	10.0
มากกว่า 25	3	4.0	3	5.9	6	12.8	1	2.8	13	6.2
อายุยังเฉลี่ย	10.7		12.5		14.5		13.9		12.5	
อายุยังต่ำสุด	1.0		1.0		1.2		0.7		0.7	
อายุยังสูงสุด	31.0		35.0		36.0		26.0		36.0	
S.D.	8.2		8.8		8.9		7.5		8.5	
พันธุ์ย่าง*										
พันธุ์ BPM 24	38	50.7	7	13.7	7	14.9	4	11.1	56	26.8
พันธุ์ RRIM 600	4	5.3	44	86.3	36	76.6	32	88.9	116	55.5
พันธุ์ 251	10	13.3	1	2.0	2	4.3	2	5.6	15	7.2
พันธุ์ 311	4	5.3	2	3.9	2	4.3	1	2.8	9	4.3

ตารางที่ 4.11 (ต่อ)

หน่วย: แปลง

ประเด็น	ระนอง		กรุงปี		ตรัง		สตูล		รวม	
	จำนวน (n=75)	ร้อยละ	จำนวน (n=51)	ร้อยละ	จำนวน (n=47)	ร้อยละ	จำนวน (n=36)	ร้อยละ	จำนวน (n=209)	ร้อยละ
พันธุ์ PB 255	-	-	1	2.0	1	2.1	1	2.8	3	1.4
พันธุ์ PB 235	14	18.7	1	2.0	3	6.4	1	2.8	19	9.1
พันธุ์ PB 260	8	10.7	-	-	-	-	-	-	8	3.8
พันธุ์ GT1	19	25.3	-	-	-	-	-	-	19	9.1
พันธุ์ PB 250	1	1.3	-	-	-	-	-	-	1	0.5
การขอสงเคราะห์สวนยาง										
ไม่ขอทุน	34	45.3	22	43.1	27	57.4	16	44.4	99	47.4
ขอทุน	41	54.7	29	56.9	20	42.6	20	55.6	110	52.6
ลักษณะการใช้พื้นที่เดิมก่อนปลูกยาง										
ไม่ระบุ/ไม่ทราบ	16	21.3	7	13.7	1	2.1	4	11.1	28	13.4
ป่าเดื่อมโถรม	57	76.0	17	33.3	7	14.9	7	19.4	88	42.1
ป่าไม้	1	1.3	14	27.5	19	40.4	10	27.8	44	21.1
สวนมะพร้าว	1	1.3	1	2.0	-	-	-	-	2	1.0
ป่ายาง/ยางพาราพันธุ์พื้นเมือง	-	-	11	21.6	13	27.7	13	36.1	37	17.7
ปาล์มน้ำมัน	-	-	1	2.0	-	-	-	-	1	0.5
ทีนา	-	-	-	-	7	14.9	2	5.6	9	4.3

ตารางที่ 4.11 (ต่อ)

หน่วย: แปลง

ประเด็น	ระนอง		กรุงปี		ตรัง		สตูล		รวม	
	จำนวน (n=75)	ร้อยละ	จำนวน (n=51)	ร้อยละ	จำนวน (n=47)	ร้อยละ	จำนวน (n=36)	ร้อยละ	จำนวน (n=209)	ร้อยละ
ระบบยาพารา										
ระบบการปลูกยางอย่างเดียว	71	94.7	43	84.3	44	93.6	36	100.0	194	92.8
ระบบการปลูกยางกับพืชแคร์ม	4	5.3	8	15.7	2	4.3	-	-	14	6.7
ระบบการปลูกยางแบบผสมผสาน	-	-	-	-	1	2.1	-	-	1	0.5
ชนิดพืชแคร์ม*	(n=4)		(n=8)		(n=2)				(n=14)	
กล้วย	1	25.0	1	12.5	-	-	-	-	2	14.3
ผัก	-	-	1	12.5	-	-	-	-	1	7.1
ลองกอง	1	25.0	-	-	-	-	-	-	1	7.1
สะเดาเทียม	-	-	3	37.5	1	50.0	-	-	4	28.6
ปาล์มน้ำมัน	-	-	2	25.0	-	-	-	-	2	14.3
สับปะรด	-	-	3	37.5	-	-	-	-	3	21.4
สะตอ	-	-	-	-	1	50.0	-	-	1	7.1
มังคุด	1	25.0	-	-	-	-	-	-	1	7.1
จำปาทอง	3	75.0	-	-	-	-	-	-	3	21.4
ทุเรียน	1	25.0	-	-	-	-	-	-	1	7.1

หมายเหตุ * สามารถตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

(3) ระบบการผลิตยางพารา และการเปลี่ยนแปลง

ระบบยางพารา และการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของเกษตรกรภาคใต้ทั่วไป (อันดามัน) ดังแสดงในตารางที่ 4.12 พบว่า เกษตรกรทั้งหมดของทุกจังหวัด ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำสวนยางพารา และมีความเห็นว่า โรครากรขาว ไม่ได้เป็นปัจจัยส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนระบบการทำสวนยางพารา และในอนาคตจะไม่เปลี่ยนระบบการทำสวนยางพารา

ตารางที่ 4.12 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบยางพารา และการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของเกษตรกรภาคใต้ทั่วไป (อันดามัน)

ประเด็น	ระนอง		กระนี่		ตรัง		สตูล		รวม	
	จำนวน (n=50)	ร้อย ละ	จำนวน (n=30)	ร้อย ละ	จำนวน (n=29)	ร้อย ละ	จำนวน (n=24)	ร้อย ละ	จำนวน (n=133)	ร้อย ละ
การเปลี่ยนแปลงระบบการทำสวนยางพารา										
ไม่เคย	50	100.0	30	100.0	29	100.0	24	100.0	133	100.0
เคย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โรครากรขาว เป็นปัจจัยส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนระบบการทำสวนยางพารา										
ไม่ใช่	50	100.0	27	90.0	27	93.1	24	100.0	128	96.2
ใช่	-	-	3	10.0	2	6.9	-	-	5	3.8
ในอนาคตจะเปลี่ยนระบบการทำสวนยางพารา										
ไม่เปลี่ยน	48	96.0	27	90.0	27	93.1	24	100.0	126	94.7
เปลี่ยน	2	4.0	3	10.0	2	6.9	-	-	7	5.3
ระบบที่เปลี่ยน	(n=2)		(n=3)		(n=2)				(n=7)	
ระบบปลูกบางอย่างเดียว	1	50.0	1	33.3	-	-	-	-	2	28.6
ปลูกยางกับพืชแซม	-	-			-	-	-	-	-	-
ผสมผสาน	1	50.0	2	66.7	-	-	-	-	3	42.9
ปลูกพืชอื่นแทน ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน	-	-	-	-	2	100.0	-	-	2	28.6

4.3 เศรษฐกิจการผลิตยางพาราของเกษตรกรในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา (ภาคใต้ 8 จังหวัด)

เศรษฐกิจการผลิตยางพาราของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดต่างๆ ทั้งในภาพรวม ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ดังนี้

4.3.1 การผลิต

ข้อมูลการผลิตยางพาราของเกษตรกร ในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา มีรายละเอียดในแต่ละ ประเด็น ดังนี้

(1) การผลิตยางพาราของเกษตรกรในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา

การผลิตยางพาราของเกษตรกร ในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา ดังตารางที่ 4.13 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นยางพาราที่ให้ผลผลิตแล้ว ร้อยละ 82.5 มีเพียงบางส่วนที่ยังไม่ให้ผลผลิต ร้อยละ 17.5 โดยมีจำนวนวันกรีดยางใน 1 ปีเฉลี่ย 132.7 วัน จำนวนวันกรีดยางอยู่ในช่วง 111 – 120 วัน มากที่สุด ร้อยละ 37.8 ส่วนจำนวนวันกรีดยางที่น้อยที่สุดอยู่ในช่วง 121 – 130 วัน ร้อยละ 6.0

สำหรับวัสดุที่ใช้ปลูกยางพารา พบว่า ส่วนใหญ่ใช้ดินยางชำลุง ร้อยละ 59.7 รองลงมาใช้ดินตอยาง ติดตาในแปลง ร้อยละ 21.3 และ 11.0 ตามลำดับ มีเพียงส่วนน้อยที่ใช้วัสดุ คละกันไปในแปลงปลูกยาง

สำหรับเกษตรกรที่ยางพาราให้ผลผลิตแล้วนั้น พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีการใช้สารเร่งน้ำยาง ร้อยละ 85.7 โดยให้เหตุผลว่า ยางพารายังอาชญาอย และกลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อต้นยาง เป็นต้น และมีบางส่วนของเกษตรกร ในพื้นที่ศึกษาที่มีการใช้สารเร่ง แต่ใช้ในปริมาณความเข้มข้น ไม่สูงมากนัก คือ ตั้งแต่ร้อยละ 2.5 – 5 เป็นต้น

ราคายางเฉลี่ยที่เกษตรกรได้รับเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมาเท่ากับ 49.1 บาทต่อกิโลกรัม ราคาอยู่ในช่วง 41 – 50 บาทต่อกิโลกรัม หากที่สุด ร้อยละ 30.0 รองลงมาอยู่ในช่วง 30 – 40 บาทต่อกิโลกรัม และน้อยกว่า 30 บาทต่อกิโลกรัม เป็นราคาที่น้อยที่สุด ในกระบวนการกรีดยางของเกษตรกรนั้น พบว่า กว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 58.5 ของเกษตรกรที่กรีดด้วยตัวเอง และที่เหลือ ร้อยละ 41.5 เป็นการจ้างกรีด โดยระบบการจ้างกรีดนั้นมีการแบ่งสรรผลประโยชน์แบบ 60:40 หากที่สุด ร้อยละ 35.6 รองลงมาใช้ระบบ 50:50 ร้อยละ 27.8 นอกจากการแบ่งผลประโยชน์เป็นสัดส่วนแล้วนั้น ยังมีรูปแบบการจ้างโดยการให้ค่าจ้างตามน้ำหนักยางพารา เช่น ให้ค่าจ้างกิโลกรัมละ 13 – 20 บาท นอกจากนั้นยังมีการจ้างเป็นรายวันอีกด้วย

สำหรับรูปแบบผลผลิตยางพารานั้น มีการผลิต 3 รูปแบบการผลิต นั่นคือ ผลผลิต ในรูปแบบน้ำยางสด ร้อยละ 44.2 รูปแบบยางแผ่นดิน ร้อยละ 34.1 และรูปแบบเศษยาง ร้อยละ 21.7

ตารางที่ 4.13 การผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ศึกษา

ประเด็น	จำนวน (n=263)	ร้อยละ
การใช้ผลผลิตยางพารา		
ซึ่งไม่ใช้ผลผลิต	46	17.5
ใช้ผลผลิต	217	82.5
จำนวนวันกรีดยางใน 1 ปี (วัน/ปี)		
90 – 110	32	14.7
111 – 120	82	37.8
121 – 130	13	6.0
131 – 140	20	9.2
141 – 150	33	15.2
มากกว่า 150	37	17.1
จำนวนวันกรีดเฉลี่ย = 132.7, จำนวนวันกรีดต่ำสุด = 90.0, จำนวนวันกรีดสูงสุด = 200.0, S.D.= 24.6		
วัสดุปูถูก		
ไม่มีทราบ/ซื้อสวนยาง	11	4.2
ต้นตอยาง	56	21.3
ติดตามแปลง	29	11.0
ต้นยางชำรุด	157	59.7
ต้นตอกับต้นยางชำรุด	9	3.4
ติดตามแปลงกับต้นยางชำรุด	1	0.4
การใช้สารเร่งน้ำยาง		
ไม่ใช้	186	85.7
ใช้	31	14.3
ประเภทสารเร่งน้ำยาง	(n=31)	
จำไม่ได้	9	29.0
เข้มข้นร้อยละ 5	8	25.8
อีเต็ว	6	19.4
ยาทายางหน้าแห้ง	2	6.5
เข้มข้นร้อยละ 2.5	4	12.9

ตารางที่ 4.13 (ต่อ)

ประเด็น	จำนวน (n=263)	ร้อยละ
เข้มข้นร้อยละ 12	1	3.2
โพรเทกซ์ไฟร์	1	3.2
เหตุผลที่ไม่ใช้สารเร่ง*	(n=186)	
ยางขังเด็ก	62	33.3
ไม่มีความจำเป็น	19	10.2
อยากได้ผลลัพธ์ที่นานนาน/น้ำยางหมดเร็ว	10	5.4
กลัวยางตาย	41	22.0
ใส่ปุ๋ย	2	1.1
ออกดีแล้ว	25	13.4
ไม่ทราบวิธีใช้/ไม่มีความรู้	1	0.5
ไม่ยางขายไม่ได้ราคา	1	0.5
ไม่ขอคลงทุน	1	0.5
ยางไม่มีเปอร์เซ็นต์น้ำยางแท้	1	0.5
น้ำยางออกมากเกิน	2	1.1
ราคายางที่ได้รับเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา (บาท/กก.)		
ไม่กรีด/จำไม่ได้	72	27.4
น้อยกว่า 30	8	3.0
30 – 40	54	20.5
41 – 50	79	30.0
51 – 60	19	7.2
61 – 70	17	6.5
มากกว่า 70	14	5.3
ราคายางเฉลี่ย		49.1
ราคายางต่ำสุด		18.0
ราคายางสูงสุด		100.0
S.D.		14.7
การกรีด		
กรีดเอง	127	58.5
ข้าง	90	41.5

ตารางที่ 4.13 (ต่อ)

ประเด็น	จำนวน (n=263)	ร้อยละ
ระบบการแบ่งสรรผลประโยชน์เมื่อมีการจ้างแรงงานกรีดยาง (ร้อยละ)		
60:40**	32	35.6
55:45	9	10.0
50:50	25	27.8
65:35	6	6.7
70:30	3	3.3
ให้ค่าจ้างตามน้ำหนัก (กก.ละ 13, 15, 16, 18, 20 บาท)	10	11.1
จ้างรายวัน	5	5.6
รูปแบบผลผลิตที่ขาย		
ยางแผ่น	74	34.1
น้ำยาง	96	44.2
เศษยาง	47	21.7

หมายเหตุ * สามารถตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

**ร้อยละที่เข้าของได้ : ร้อยละที่ผู้กรีดได้

(2) การผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ผ่านต่อวันออก (อ่าวไทย)

การผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ผ่านต่อวันออก (อ่าวไทย) ดังแสดงในตารางที่ 4.14 ซึ่งประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้

ยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ผ่านต่อวันออก (อ่าวไทย) ภาพรวม และรายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลาส่วนใหญ่ให้ผลผลิตแล้ว ร้อยละ 89.2, 100.0, 82.8, 93.3 และ 76.9 จำนวนวันกรีดยางใน 1 ปีเฉลี่ย 135.4, 136.5, 137.2, 134.6 และ 133.0 วัน ตามลำดับ ช่วงวันกรีดในแต่ละจังหวัด พบว่า มีจำนวนวันกรีดอยู่ในช่วง 111 – 120 วัน มากที่สุด ร้อยละ 43.3, 29.2, 38.1 และ 60.0 ของเกษตรกรในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ตามลำดับ เป็นที่น่าสังเกตว่าเกษตรกรในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราชมีจำนวนวันกรีดตั้งแต่ 151 วันขึ้นไป มากเป็นลำดับรองลงมา ในขณะที่เกษตรกรในจังหวัดสงขลา มีจำนวนวันกรีดอยู่ในช่วง 141 – 150 วัน เป็นอันดับรองลงมา

สำหรับวัสดุปลูกที่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ผ่านต่อวันออก (อ่าวไทย) ภาพรวม มีการใช้ต้นยางชำกุ่งมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.7 เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า เกษตรกรในจังหวัดชุมพร และสงขลา มีการใช้ต้นยางชำกุ่งมากที่สุดใกล้เคียงกัน ร้อยละ 83.3 และ 92.3 ส่วนเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช มีการใช้วัสดุปลูกที่หลากหลาย แต่ยังคงใช้ต้นยางชำ

ถุง มากที่สุด เช่น กัน เกษตรกร ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้วิธีติดตาในแปลง เป็นอันดับรองลงมา ส่วน จังหวัดนราธิวาส ใช้ต้นตอยาง เป็นอันดับรองลงมา

ในภาพรวมของพื้นที่ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) เกษตรกร ส่วนใหญ่ไม่ใช้สาร เร่งน้ำยา น้ำมัน ไม่เพียงเกษตรกร ในจังหวัดชุมพร ครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 53.3 มีการใช้สารเร่งน้ำยา ในขณะ ที่เกษตรกร ในจังหวัดอื่นๆ ไม่ใช้สารเร่งน้ำยา โดยเห็นว่า ย่างที่กรีดอยู่ยังอาบูน้อย ไม่จำเป็นต้องมี การใช้สารเร่งน้ำยา และกลัว เป็นอันตรายต่อ อย่าง เป็นต้น สำหรับกลุ่มที่ใช้สารเร่งน้ำ พบว่า ใช้สาร ที่มีความเข้มข้นตั้งแต่ร้อยละ 2.5 – 5 เป็นต้น

ราคายาง เนลี่ยที่เกษตรกร ในภาคใต้ ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) ภาพรวม และราย จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ได้รับเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา เท่ากับ 48.7, 48.8, 49.2, 50.4 และ 44.6 บาทต่อกิโลกรัม ตามลำดับ ราคายู ในช่วง 41 – 50 บาทต่อกิโลกรัม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.0, 34.5 และ 28.9 สำหรับทุกจังหวัด ยกเว้น จังหวัดสงขลา ที่ ราคายู ในช่วง 30 – 40 บาทต่อกิโลกรัม มากที่สุด ใน การกรีดยางของเกษตรกร แต่ละจังหวัดนั้น พบว่า กว่าครึ่งหนึ่งของเกษตรกร แต่ละจังหวัดกรีดด้วยตัวเอง และที่เหลือ เป็นการจ้างกรีด โดย ระบบการจ้างกรีดของ จังหวัดชุมพร และ สุราษฎร์ธานี นั้นมีการแบ่งสรรผลประโยชน์แบบ 60:40 มากที่สุด ร้อยละ 57.1 และ 75.0 ตามลำดับ เกษตรกร จังหวัดนราธิวาส นั้นมีการแบ่งสรร ผลประโยชน์แบบ 50:50 มากที่สุด ร้อยละ 61.1 ส่วนเกษตรกร จังหวัดสงขลา มีการแบ่งสรร ผลประโยชน์แบบ 55:45 มากที่สุด ร้อยละ 55.6

สำหรับรูปแบบผลผลิต ยางพารา ของเกษตรกร แต่ละจังหวัด มีความแตกต่าง กัน ใน บางจังหวัด กล่าวคือ จังหวัดชุมพร เกษตรกร ส่วนใหญ่ ขายผลผลิต ในรูปแบบยางแผ่นดิน ร้อยละ 60.0 มากที่สุด และ ผลผลิต ในรูปแบบน้ำยา ร้อยละ 40.0 เป็นอันดับรองลงมา เกษตรกร ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี ขายผลผลิต ในรูปแบบยางแผ่นดินมากที่สุด ร้อยละ 58.3 รองลงมา ผลผลิต ในรูปแบบ น้ำยา ร้อยละ 29.2 และ รูปแบบเศษยาง ร้อยละ 12.5 เกษตรกร ในจังหวัดนราธิวาส ขาย ผลผลิต ในรูปแบบยางแผ่นดิน และเศษยาง ในสัดส่วน ใกล้เคียง กัน ประมาณ ร้อยละ 40.5 และ 30.0 ตามลำดับ ส่วนเกษตรกร ในจังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่ ขายผลผลิต ในรูปแบบน้ำยา ร้อยละ 70.0

ตารางที่ 4.14 การผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ฟังตะวันออก (อ่าวไทย)

ประเด็น	ชุมพร		สุราษฎร์ธานี		นครศรีธรรมราช		สงขลา		รวม	
	จำนวน (n=30)	ร้อยละ	จำนวน (n=29)	ร้อยละ	จำนวน (n=45)	ร้อยละ	จำนวน (n=26)	ร้อยละ	จำนวน (n=130)	ร้อยละ
การให้ผลผลิตยางพารา										
ยังไม่ให้ผลผลิต	-	-	5	17.2	3	6.7	6	23.1	14	10.8
ให้ผลผลิต	30	100.0	24	82.8	42	93.3	20	76.9	116	89.2
จำนวนวันครีดยางใน 1 ปี (วัน/ปี)	(n=30)		(n=24)		(n=42)		(n=20)		(n=116)	
90 – 110	3	10.0	4	16.7	6	14.3	1	5.0	14	12.1
111 - 120	13	43.3	7	29.2	16	38.1	12	60.0	48	41.4
121 – 130	2	6.7	1	4.2	4	9.5	-	-	7	6.0
131 – 140	3	10.0	2	8.3	1	2.4	-	-	6	5.2
141 - 150	2	6.7	5	20.8	3	7.1	5	25.0	15	12.9
มากกว่า 150	7	23.3	5	20.8	12	28.6	2	10.0	26	22.4
จำนวนวันเฉลี่ย	136.5		137.2		134.6		133.0		135.4	
จำนวนวันต่ำสุด	90.0		100.0		100.0		110.0		90.0	
จำนวนวันสูงสุด	200.0		200.0		200.0		200.0		200.0	
S.D.	28.6		27.8		24.2		22.0		25.5	

ตารางที่ 4.14 (ต่อ)

ประเด็น	ชุมพร		สุราษฎร์ธานี		นครศรีธรรมราช		สงขลา		รวม	
	จำนวน (n=30)	ร้อยละ	จำนวน (n=29)	ร้อยละ	จำนวน (n=45)	ร้อยละ	จำนวน (n=26)	ร้อยละ	จำนวน (n=130)	ร้อยละ
วัสดุปูลูก										
ไม่ทราบ/ซื้อสวนยาง	-	-	3	10.3	1	2.2	-	-	4	3.1
ดันตอยาง	-	-	5	17.2	12	26.7	1	3.8	18	13.8
ติดตาในแปลง	4	13.3	8	27.6	6	13.3	1	3.8	19	14.6
ดันยางชำรุด	25	83.3	13	44.8	26	57.8	24	92.3	88	67.7
ติดตาในแปลงกับดันยางชำรุด	1	3.3	-	-	-	-	-	-	1	0.8
การใช้สารเร่งน้ำยาง	(n=30)		(n=24)		(n=42)		(n=20)		(n=116)	
ไม่ใช้	14	46.7	20	83.3	38	90.5	19	95.0	91	78.4
ใช้	16	53.3	4	16.7	4	9.5	1	5.0	25	21.6
ประเภทสารเร่งน้ำยาง	(n=16)		(n=4)		(n=4)		(n=1)		(n=25)	
จำไม่ได้	1	6.3	3	75.0	1	25.0	1	100.0	6	24.0
เข้มข้นร้อยละ 5	6	37.5	-	-	2	50.0	-	-	8	32.0
อีเต็ว	6	37.5	-	-	-	-	-	-	6	24.0
ยาทายางหน้าแห้ง	2	12.5	-	-	-	-	-	-	2	8.0
เข้มข้นร้อยละ 2.5	1	6.3	1	25.0	1	25.0	-	-	3	12.0

ตารางที่ 4.14 (ต่อ)

ประเด็น	ชุมพร		สุราษฎร์ธานี		นครศรีธรรมราช		สงขลา		รวม	
	จำนวน (n=30)	ร้อยละ	จำนวน (n=29)	ร้อยละ	จำนวน (n=45)	ร้อยละ	จำนวน (n=26)	ร้อยละ	จำนวน (n=130)	ร้อยละ
เหตุผลที่ไม่ใช้สารเร่ง*	(n=14)		(n=20)		(n=38)		(n=19)		(n=91)	
ข้างเด็ก	6	42.9	10	50.0	10	26.3	3	15.8	29	31.9
ไม่มีความจำเป็นต้องใช้	1	7.1	2	10.0	6	15.8	-	-	9	9.9
อยากได้ผลิตที่ขวนาน/ น้ำขางหมดเร็ว	4	28.6	1	5.0	3	7.9	-	-	8	8.8
กลัวขางตาข	1	7.1	4	20.0	5	13.2	8	42.1	18	19.8
ใส่ปุ๋ย					1	2.6	-	-	1	1.1
ออกคีเเล้ว	1	7.1	2	10.0	8	21.1	2	10.5	13	14.3
ไม่ทราบวิธีใช้/ไม่มีความรู้	-	-	-	-	1	2.6	-	-	1	1.1
ไม่ขางขาไม่ได้ราก	-	-	-	-	1	2.6	-	-	1	1.1
ขางไม่มีปอร์เช่นต้นขาง	-	-	-	-	-	-	1	5.3	1	1.1
นำขางออกมากเกิน	-	-	-	-	-	-	2	10.5	2	2.2

ตารางที่ 4.14 (ต่อ)

ประเด็น	ชุมพร		สุราษฎร์ธานี		นครศรีธรรมราช		สงขลา		รวม	
	จำนวน (n=30)	ร้อยละ	จำนวน (n=29)	ร้อยละ	จำนวน (n=45)	ร้อยละ	จำนวน (n=26)	ร้อยละ	จำนวน (n=130)	ร้อยละ
ราคายางที่ได้รับเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา (บาท/กก.)										
ไม่กรีด/จำไม่ได้	1	3.3	9	31.0	8	17.8	9	34.6	27	20.8
น้อยกว่า 30	-	-	1	3.4	2	4.4	1	3.8	4	3.1
30 - 40	5	16.7	4	13.8	9	20.0	8	30.8	26	20.0
41 – 50	21	70.0	10	34.5	13	28.9	5	19.2	49	37.7
51 – 60	-	-	2	6.9	6	13.3	1	3.8	9	6.9
61 – 70	2	6.7	2	6.9	6	13.3	2	7.7	12	9.2
มากกว่า 70	1	3.3	1	3.4	1	2.2	-	-	3	2.3
ราคายางเฉลี่ย	48.8		49.2		50.4		44.6		48.7	
ราคายางต่ำสุด	30.0		20.0		24.0		27.0		20.0	
ราคายางสูงสุด	80.0		80.0		100.0		70.0		100.0	
S.D.	10.7		14.5		15.3		11.9		13.4	
การกรีด	(n=30)		(n=24)		(n=42)		(n=20)		(n=116)	
กรีดเอง	16	53.3	12	50.0	24	57.1	11	55.0	63	54.3
ซื้อ	14	46.7	12	50.0	18	42.9	9	45.0	53	45.7

ตารางที่ 4.14 (ต่อ)

ประเด็น	ชุมพร		สุราษฎร์ธานี		นครศรีธรรมราช		สงขลา		รวม	
	จำนวน (n=30)	ร้อยละ	จำนวน (n=29)	ร้อยละ	จำนวน (n=45)	ร้อยละ	จำนวน (n=26)	ร้อยละ	จำนวน (n=130)	ร้อยละ
ระบบการแบ่งสรรผลประโยชน์เมื่อมีการจ้างแรงงานครึ่งราย	(n=14)		(n=12)		(n=18)		(n=9)		(n=53)	
60:40**	8	57.1	9	75.0	5	27.8	2	22.2	24	20.7
55:45	-	-	1	8.3	1	5.6	5	55.6	7	6.0
50:50	1	7.1	2	16.7	11	61.1	2	22.2	16	13.8
65:35	5	35.7	-	-	-	-	-	-	5	4.3
ข้างรายวัน	-	-	-	-	1	5.6	-	-	1	0.9
รูปแบบผลผลิตที่ขาย	(n=30)		(n=24)		(n=42)		(n=20)		(n=116)	
ยางแผ่น	18	60.0	14	58.3	17	40.5	6	30.0	55	47.4
นำยาง	12	40.0	7	29.2	12	28.6	14	70.0	45	38.8
เศษยาง	-	-	3	12.5	13	31.0	-	-	16	13.8

หมายเหตุ * สามารถตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

** ร้อยละที่เข้าของได้ : ร้อยละที่ผู้กรอกได้

(3) การผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)

การผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) ดังแสดงในตารางที่ 4.15 มีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี้

ยางพาราของเกษตรกรในภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) ภาพรวม และรายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง grade ตั้ง และสตูล ส่วนใหญ่ให้ผลผลิตแล้ว คิดเป็นร้อยละ 75.9, 70.0, 73.3, 79.3 และ 87.5 ตามลำดับ จำนวนวันกรีดยางใน 1 ปีเฉลี่ย 129.6, 111.4, 133.9, 141.4 และ 142.6 วัน ตามลำดับ จำนวนวันกรีดในจังหวัดระนอง มีจำนวนวันกรีดอยู่ในช่วง 90 – 110 วัน มากที่สุด ร้อยละ 45.7 รองลงมา มีจำนวนวันกรีดอยู่ในช่วง 111 – 120 วัน ร้อยละ 42.9 เกษตรกรในจังหวัดยะลา มีจำนวนวันกรีดอยู่ในช่วง 111 – 120 วัน มากที่สุด ร้อยละ 45.5 รองลงมา มีจำนวนวันกรีดอยู่ในช่วง 141 – 150 วัน ร้อยละ 22.7 เกษตรกรในจังหวัดตรัง มีจำนวนวันกรีดอยู่ในช่วง 141 – 150 วัน มากที่สุด ร้อยละ 39.1 รองลงมา มีจำนวนวันกรีดอยู่ในช่วง 111 – 120 วัน ร้อยละ 26.1 สำหรับเกษตรกรในจังหวัดสตูล มีจำนวนวันกรีดตั้งแต่ 151 วันขึ้นไป มากที่สุด ร้อยละ 28.6 รองลงมา มีจำนวนวันกรีดอยู่ในช่วง 131 – 140 วัน ร้อยละ 23.8

สำหรับวัสดุปลูกที่เกษตรกรในภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) แต่ละจังหวัดใช้ในการปลูกยางพารานั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มีการใช้วัสดุการปูกรดโดยใช้ต้นยางชำกรุงมากที่สุด เหมือนกัน ร้อยละ 42.0, 50.0, 62.1 และ 62.5 ของเกษตรกรในจังหวัดระนอง grade ตั้ง และสตูล ตามลำดับ และใช้ต้นตออย่าง เป็นอันดับรองลงมา เกษตรกรในแต่ละจังหวัดส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้สารเร่งน้ำยาง โดยให้เหตุผลสำคัญ คือ อายุยางยังน้อย กล่าวจะเป็นอันตรายต่อต้นยาง เป็นต้น

ราคายางเฉลี่ยที่เกษตรกรในภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) ภาพรวม และรายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง grade ตั้ง และสตูล ได้รับเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมาเท่ากับ 49.6, 46.5, 51.8, 49.3 และ 53.7 บาทต่อกิโลกรัม ตามลำดับ ราคาอยู่ในช่วง 41 – 50 บาทต่อกิโลกรัม มากที่สุด ร้อยละ 23.3 และ 41.4 สำหรับจังหวัดยะลา และตรัง ส่วนจังหวัดยะลา และสงขลา มีราคาอยู่ในช่วง 30 – 40 บาทต่อกิโลกรัม มากที่สุด ร้อยละ 26.0 และ 29.2 ตามลำดับ ใน การกรีดยางของเกษตรกรแต่ละจังหวัดนั้น พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรแต่ละจังหวัดกรีดยางด้วยตัวเอง ยกเว้นจังหวัดระนองที่ ส่วนใหญ่จ้างกรีด และระบบการแบ่งผลประโยชน์ของจังหวัดดังกล่าว มีลักษณะแตกต่างจากจังหวัดอื่น กล่าวคือ เกษตรกรจะใช้วิธีการให้ค่าจ้างตามน้ำหนักของผลผลิต ส่วนเกษตรกรในจังหวัดยะลา และตรังนั้น มีการแบ่งผลประโยชน์แบบ 50:50 มากที่สุด ร้อยละ 50.0 และ 75.0 ตามลำดับ ส่วนเกษตรกรจังหวัดสตูล มีการแบ่งสรรผลประโยชน์แบบ 60:40 มากที่สุด ร้อยละ 85.7

สำหรับรูปแบบผลผลิตยางพาราของเกษตรกรในภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) ภาพรวมครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 50.5 มีผลผลิตในรูปแบบน้ำยางสด สำหรับเกษตรกรแต่ละจังหวัดมีความ

แตกต่างกันในบางจังหวัด กล่าวคือ จังหวัดตรังและสตูล เกษตรกรส่วนใหญ่มีผลผลิตในรูปแบบน้ำยาง สด ร้อยละ 87.0 และ 85.7 เกษตรกรในจังหวัดยะลา มีผลผลิตในรูปแบบยางแผ่นดินและเศษยางในสัดส่วนใกล้เคียงกัน ร้อยละ 45.7 และ 51.4 ส่วนเกษตรกรในจังหวัดยะลา มีผลผลิตในรูปแบบน้ำยางสด และเศษยาง ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน ร้อยละ 54.5 และ 45.5

ตารางที่ 4.15 การผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ผ่านวันตก (อันดามัน)

ประเด็น	ระนอง		กรุงบี		ตรัง		สตูล		รวม	
	จำนวน (n=50)	ร้อยละ	จำนวน (n=30)	ร้อยละ	จำนวน (n=29)	ร้อยละ	จำนวน (n=24)	ร้อยละ	จำนวน (n=133)	ร้อยละ
การให้ผลผลิตยางพารา										
ขังไม่ให้ผลผลิต	15	30.0	8	26.7	6	20.7	3	12.5	32	24.1
ให้ผลผลิต	35	70.0	22	73.3	23	79.3	21	87.5	101	75.9
จำนวนวันกรีดยางใน 1 ปี (วัน/ปี)	(n=35)		(n=22)		(n=23)		(n=21)		(n=101)	
90 – 110	16	45.7	-	-	1	4.3	1	4.8	18	17.8
111 – 120	15	42.9	10	45.5	6	26.1	3	14.3	34	33.7
121 – 130	1	2.9	2	9.1	-	-	3	14.3	6	5.9
131 – 140	1	2.9	4	18.2	4	17.4	5	23.8	14	13.9
141 - 150	1	2.9	5	22.7	9	39.1	3	14.3	18	17.8
มากกว่า 150	1	2.9	1	4.5	3	13.0	6	28.6	11	10.9
จำนวนวันกรีดเฉลี่ย	111.4		133.9		141.4		142.6		129.6	
จำนวนวันกรีดต่ำสุด	90.0		120.0		100.0		110.0		90.0	
จำนวนวันกรีดสูงสุด	180.0		180.0		200.0		170.0		200.0	
S.D.	20.0		16.2		20.6		18.0		23.2	

ตารางที่ 4.15 (ต่อ)

ประเด็น	ระนอง		กรุงปี		ตรัง		สตูล		รวม	
	จำนวน (n=50)	ร้อยละ	จำนวน (n=30)	ร้อยละ	จำนวน (n=29)	ร้อยละ	จำนวน (n=24)	ร้อยละ	จำนวน (n=133)	ร้อยละ
วัสดุปูลูก										
ไม่ทราบ/ซื้อสวนยาง	4	8.0	2	6.7	-	-	1	4.2	7	5.3
ต้นดอนยาง	14	28.0	8	26.7	9	31.0	7	29.2	38	28.6
ติดดาวในแปลง	2	4.0	5	16.7	2	6.9	1	4.2	10	7.5
ต้นยางชำรุด	21	42.0	15	50.0	18	62.1	15	62.5	69	51.9
ต้นดอนกับต้นยางชำรุด	9	18.0	-	-	-	-	-	-	9	6.8
การใช้สารเร่งน้ำยาง	(n=35)		(n=22)		(n=23)		(n=21)		(n=101)	
ไม่ใช้	31	88.6	22	100.0	23	100.0	19	90.5	95	94.1
ใช้	4	11.4	-	-	-	-	2	9.5	6	5.9
ประเภทสารเร่งน้ำยาง	(n=4)						(n=2)		(n=6)	
จำไม่ได้	3	75.0	-	-	-	-	-	-	3	50.0
เข้มข้นร้อยละ 2.5	-	-	-	-	-	-	1	50.0	1	16.7
เข้มข้นร้อยละ 12	-	-	-	-	-	-	1	50.0	1	16.7
ไบร์เทคส์ไฟร์	1	25.0	-	-	-	-	-	-	1	16.7

ตารางที่ 4.15 (ต่อ)

ประเด็น	ระนอง		กรุงปี		ตรัง		สตูล		รวม	
	จำนวน (n=50)	ร้อยละ	จำนวน (n=30)	ร้อยละ	จำนวน (n=29)	ร้อยละ	จำนวน (n=24)	ร้อยละ	จำนวน (n=133)	ร้อยละ
เหตุผลที่ไม่ใช้สารเร่ง*	(n=31)		(n=22)		(n=23)		(n=19)		(n=95)	
บางยังเล็ก	11	35.5	9	40.9	8	34.8	5	26.3	33	34.7
ไม่มีความจำเป็น	4	12.9	2	9.1	4	17.4	-	-	10	10.5
อยากได้ผลิตที่ยาวนาน/นานาช่วงหมู่เร็ว	-	-	-	-	1	4.3	1	5.3	2	2.1
กลัวยางตาย	12	38.7	6	27.3	4	17.4	1	5.3	23	24.2
ใส่ปุ๋ย	1	3.2	-	-	-	-	-	-	1	1.1
ออกดีแล้ว	2	6.5	2	9.1	4	17.4	4	21.1	12	12.6
ไม่อยากลงทุน	-	-	-	-	-	-	1	5.3	1	1.1
ราคายางที่ได้รับเป็นผ่านรถ(บาท/กก.)										
ไม่กรีด/จำไม่ได้	17	34.0	11	36.7	8	27.6	9	37.5	45	33.8
น้อยกว่า 30	3	6.0	1	3.3	-	-	-	-	4	3.0
30 - 40	13	26.0	4	13.3	4	13.8	7	29.2	28	21.1
41 – 50	10	20.0	7	23.3	12	41.4	1	4.2	30	22.6
51 – 60	1	2.0	4	13.3	3	10.3	2	8.3	10	7.5
61 – 70	4	8.0	-	-	1	3.4	-	-	5	3.8
มากกว่า 70	2	4.0	3	10.0	1	3.4	5	20.8	11	8.3

ตารางที่ 4.15 (ต่อ)

ประเด็น	ระนอง		กรุงปี		ตรัง		สตูล		รวม	
	จำนวน (n=50)	ร้อยละ	จำนวน (n=30)	ร้อยละ	จำนวน (n=29)	ร้อยละ	จำนวน (n=24)	ร้อยละ	จำนวน (n=133)	ร้อยละ
ราคายางเนลลี่	46.5		51.8		49.3		53.7		49.6	
ราคายางต่าสุด	18.0		22.0		35.0		30.0		18.0	
ราคายางสูงสุด	90.0		90.0		80.0		80.0		90.0	
S.D.	16.5		17.3		10.4		20.8		16.3	
การกรีด	(n=35)		(n=22)		(n=23)		(n=21)		(n=101)	
กวีดรอง	13	37.1	18	81.8	19	82.6	14	66.7	64	63.4
ข้าง	22	62.9	4	18.2	4	17.4	7	33.3	37	36.6
ระบบการแบ่งสรรผลประโยชน์*	(n=22)		(n=4)		(n=4)		(n=7)		(n=37)	
60:40**	1	4.5	1	25.0	-	-	6	85.7	8	21.6
55:45	-	-	1	25.0	1	25.0	-	-	2	5.4
50:50	3	13.6	2	50.0	3	75.0	1	14.3	9	24.3
65:35	1	4.5	-	-	-	-	-	-	1	2.7
70:30	3	13.6	-	-	-	-	-	-	3	8.1
ให้ค่าช่างตามน้ำหนัก (กก.ละ 13, 15, 16, 18, 20 บาท)	10	45.3	-	-	-	-	-	-	10	27.0
ข้างรายวัน	4	18.2	-	-	-	-	-	-	4	10.8

ตารางที่ 4.15 (ต่อ)

ประเด็น	รัฐนอง		กระบี		ตรัง		สตูล		รวม	
	จำนวน (n=50)	ร้อยละ	จำนวน (n=30)	ร้อยละ	จำนวน (n=29)	ร้อยละ	จำนวน (n=24)	ร้อยละ	จำนวน (n=133)	ร้อยละ
รูปแบบผลผลิตที่ขาย	(n=35)		(n=22)		(n=23)		(n=21)		(n=101)	
ยางแผ่น	16	45.7	-	-	2	8.7	1	4.8	20	19.8
น้ำยาง	1	2.9	12	54.5	20	87.0	18	85.7	51	50.5
เศษยาง	18	51.4	10	45.5	1	4.3	2	9.5	30	29.7

หมายเหตุ * สามารถตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

** ร้อยละที่เข้าของได้ : ร้อยละที่ผู้กรีดได้

4.3.2 ผลผลิตและรายได้

ผลผลิตและรายได้จากยางพาราของเกษตรกร โดยจำแนกตามพื้นที่ในการรวมของพื้นที่ที่ศึกษา ภาคใต้ฟังตัววันออก และภาคใต้ฟังตัววันตก มีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี้

(1) ผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา (ภาคใต้ 8 จังหวัด)

ผลผลิตและรายได้จากยางพาราของเกษตรกรในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 4.16

ตารางที่ 4.16 ผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา

ประเด็น	จำนวน (n=263)	ร้อยละ
ผลผลิต (กก./ไร่/ปี)		
75-150	51	23.5
151-225	79	36.4
226-300	52	24.0
301-375	27	12.4
มากกว่า 375	8	3.7
ผลผลิตเฉลี่ย = 215.8, ผลผลิตต่ำสุด = 75.0, ผลผลิตสูงสุด = 480.0, S.D.= 78.8		
รายได้(บาท/ไร่/ปี)		
น้อยกว่าเท่ากับ 10,000	53	24.4
10,001 – 15,000	63	29.0
15,001 – 20,000	54	24.9
20,001 – 25,000	26	12.0
มากกว่า 25,000	21	9.7
รายได้เฉลี่ย = 15,155.8, รายได้ต่ำสุด = 3,335.0, รายได้สูงสุด = 44,800.0, S.D.= 7,010.4		

ผลผลิตและรายได้จากยางพาราของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 4.16 พบว่า ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 215.8 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตอยู่ในช่วง 151 - 225 กิโลกรัมต่อไร่ มากที่สุด ร้อยละ 36.4 รองลงมาอยู่ในช่วง 226 - 300 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 24.0 และผลผลิตตั้งแต่ 375 กิโลกรัมต่อไร่ขึ้นไป น้อยที่สุด ร้อยละ 3.7 ส่วนรายได้ของเกษตรกรจากการผลิต

ขางพารา พบว่า เกษตรกรได้รับรายได้เฉลี่ย 15,155.8 บาทต่อไร่ การกระจายของรายได้อูปในช่วง 10,001 – 15,000 บาทต่อไร่ มากที่สุด ร้อยละ 29.0 รองลงมาอยู่ในช่วง 15,001 – 20,000 บาทต่อไร่ ร้อยละ 24.9 และรายได้ตั้งแต่ 25,001 บาทขึ้นไป น้อยที่สุด ร้อยละ 9.7

(2) ผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)

ผลผลิตและรายได้จากยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.17 พบว่า เกษตรกรในภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) ภาพรวม และ รายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ได้รับผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 212.1, 203.0, 228.8, 209.5 และ 210.9 กิโลกรัม ผลผลิตอยู่ในช่วง 151 - 225 กิโลกรัมต่อไร่ มากที่สุด ร้อยละ 35.5, 40.0, 29.2, 38.1 และ 30.0 ตามลำดับ

เกษตรกรในภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) ภาพรวม และรายจังหวัด ได้แก่ จังหวัด ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลาได้รับรายได้จากการเฉลี่ย 15,995.7, 15,926.5, 16,387.3, 15,116.5 และ 17,476.2 บาทต่อไร่ รายได้อูปในช่วง 10,001 – 15,000 บาทต่อไร่ มากที่สุด สำหรับเกษตรกรในรายสูตร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา คิดเป็นร้อยละ 29.2, 31.0 และ 35.0 ตามลำดับ ส่วนเกษตรกรในจังหวัดชุมพรนั้น มีรายได้อูปในช่วง 15,001 – 20,000 บาทต่อไร่ มากที่สุด ร้อยละ 36.7

ตารางที่ 4.17 ผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ฟังค์ชันอุตสาหกรรม (อ.ว.ไทย)

ประเด็น	ชุมพร		สุราษฎร์ธานี		นครศรีธรรมราช		สงขลา		รวม	
	จำนวน (n=30)	ร้อยละ	จำนวน (n=29)	ร้อยละ	จำนวน (n=45)	ร้อยละ	จำนวน (n=26)	ร้อยละ	จำนวน (n=130)	ร้อยละ
ผลผลิต(กก./ไร่/ปี)	(n=30)		(n=24)		(n=42)		(n=20)		(n=116)	
75-150	8	26.7	5	20.8	11	26.2	5	25.0	29	25.0
151-225	12	40.0	7	29.2	16	38.1	6	30.0	41	35.3
226-300	8	26.7	7	29.2	9	21.4	5	25.0	29	25.0
301-375	2	6.7	4	16.7	4	9.5	4	20.0	14	12.1
มากกว่า 375	-	-	1	4.2	2	4.8	-	-	3	2.6
ผลผลิตเฉลี่ย	203.0		228.8		209.5		210.9		212.1	
ผลผลิตต่ำสุด	120.0		75.0		84.0		75.0		75.0	
ผลผลิตสูงสุด	324.0		379.0		424.3		363.0		424.3	
S.D.	59.3		81.5		85.0		86.1		78.1	
รายได้(บาท/ไร่/ปี)	(n=30)		(n=24)		(n=42)		(n=20)		(n=116)	
น้อยกว่าเท่ากับ 10,000	3	10.0	4	16.7	12	28.6	3	15.0	22	19.0
10,001 – 15,000	10	33.3	7	29.2	13	31.0	7	35.0	37	31.9
15,001 – 20,000	11	36.7	6	25.0	6	14.3	3	15.0	26	22.4
20,001 – 25,000	4	13.3	4	16.7	4	9.5	3	15.0	15	12.9
มากกว่า 25,000	2	6.7	3	12.5	7	16.7	4	20.0	16	13.8
รายได้เฉลี่ย	15,926.5		16,387.3		15,116.5		17,476.2		15,995.7	
รายได้ต่ำสุด	8,400.0		6,000.0		3,486.0		6,705.0		3,486.0	
รายได้สูงสุด	25,650.0		34,299.5		35,910.0		44,800.0		44,800.0	
S.D.	4,887.2		7,031.6		7,804.0		8,903.4		7,170.7	

**(3) ผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
(อันดามัน)**

ผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) ดังแสดงในตารางที่ 4.18 พบว่า เกษตรกรในภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) ภาพรวม และรายจ้างหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง กระเบื้อง ตราช และสตูล ได้รับผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 220.0, 222.7, 216.2, 225.9 และ 212.9 กิโลกรัม ผลผลิตอยู่ในช่วง 151 - 225 กิโลกรัมต่อไร่ หากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.6, 31.4, 40.9, 34.8 และ 47.6 ตามลำดับ

เกษตรกรในภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) ภาพรวม และรายจ้างหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง กระเบื้อง ตราช และสตูล ได้รับรายได้จากการเก็บยางพาราเฉลี่ย 14,191.1, 12,492.6, 12,323.3, 17,040.0 และ 15,858.6 บาทต่อไร่ รายได้ของเกษตรกรในจังหวัดระนองอยู่ในช่วง 10,001 – 15,000 บาทต่อไร่ หากที่สุด ร้อยละ 40.0 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทต่อไร่ สำหรับเกษตรกรจังหวัดกระเบื้อง ส่วนเกษตรกรในจังหวัดตราช และสตูลนั้น มีรายได้อยู่ในช่วง 15,001 – 20,000 บาทต่อไร่ หากที่สุด ร้อยละ 39.1 และ 33.3 ตามลำดับ

ตารางที่ 4.18 ผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ฟังตะวันตก (อันดามัน)


ประเด็น	ร่อง		กระปี่		ตรัง		สูง		รวม	
	จำนวน (n=50)	ร้อยละ	จำนวน (n=30)	ร้อยละ	จำนวน (n=29)	ร้อยละ	จำนวน (n=24)	ร้อยละ	จำนวน (n=133)	ร้อยละ
ผลผลิต (กก./ไร่/ปี)	(n=35)		(n=22)		(n=23)		(n=21)		(n=101)	
75-150	8	22.9	5	22.7	5	21.7	4	19.0	22	21.8
151-225	11	31.4	9	40.9	8	34.8	10	47.6	38	37.6
226-300	6	17.1	5	22.7	7	30.4	5	23.8	23	22.8
301-375	9	25.7	1	4.5	1	4.3	2	9.5	13	12.9
มากกว่า 375	1	2.9	2	9.1	2	8.7	-	-	5	5.0
ผลผลิตเฉลี่ย	222.7		216.2		225.9		212.9		220.0	
ผลผลิตต่ำสุด	99.0		88.4		80.0		86.4		80.0	
ผลผลิตสูงสุด	382.5		382.5		480.0		318.0		480.0	
S.D.	82.0		80.8		91.9		64.7		79.8	
รายได้ (บาท/ไร่/ปี)	(n=35)		(n=22)		(n=23)		(n=21)		(n=101)	
น้อยกว่าเท่ากับ 10,000	12	34.3	10	45.5	5	21.7	4	19.0	31	30.7
10,001 – 15,000	14	40.0	2	9.1	5	21.7	5	23.8	26	25.7
15,001 – 20,000	4	11.4	8	36.4	9	39.1	7	33.3	28	27.7
20,001 – 25,000	4	11.4	2	9.1	1	4.3	4	19.0	11	10.9
มากกว่า 25,000	1	2.9	-	-	3	13.0	1	4.8	5	5.0
รายได้เฉลี่ย	12,492.6		12,323.3		17,040.0		15,858.6		14,191.1	
รายได้ต่ำสุด	3,335.0		4,176.0		7,392.0		6,480.0		3,335.0	
รายได้สูงสุด	29,160.0		24,975.2		38,400.0		26,712.0		38,400.0	
S.D.	5,946.7		6,199.8		8,118.4		5,675.3		6,727.9	

4.4 การระบาดของโรครากรขาว

จากการสำรวจข้อมูลของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในภาพรวมพื้นที่ศึกษา ซึ่งเกษตรกรมีจำนวนแปลงปลูกยางทั้งหมด 474 แปลง ในจำนวนดังกล่าวพบการระบาดของโรครากรขาว จำนวน 379 แปลง โดยมีรายละเอียดต่างๆ จำแนกตามภาพรวม 8 จังหวัด และแต่ละจังหวัด ดังนี้

4.4.1 การแพร่ระบาดของโรครากรขาวในยางพาราในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา (ภาคใต้ 8 จังหวัด)

การสำรวจการแพร่ระบาดของโรครากรขาวในยางพารา สำหรับพื้นที่ศึกษาในภาพรวม โดยใช้เครื่องมือระบุตำแหน่งบนพื้นผิวโลก (GPS) กำหนดพิกัดของพื้นที่สำรวจที่ได้รับแพร่ระบาดของโรครากรขาว เพื่อนำเสนอให้เห็นผ่านแผนที่แสดงการแพร่ระบาดของโรคในภาพรวมและรายจังหวัดที่ทำการสำรวจ และพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของการแพร่ระบาดของโรคกับลักษณะดิน จากการซ่อนทับกับฐานข้อมูลลักษณะดิน ซึ่งจำแนกโดยกรมพัฒนาที่ดิน (สถาบันวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์, 2554) ดังแสดงในภาพประกอบที่ 4.1



ภาพประกอบที่ 4.1 แสดงการระบาดของโรครากรขาวในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา

จากภาพประกอบที่ 4.1 พบรการระบาดของโรครากขาวในพาร์วัมของพื้นที่ที่ทำการศึกษา มีความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกัน สามารถสรุปพื้นที่ที่มีการระบาดในแต่ละระดับ ดังนี้

1) พื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง ได้แก่ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอ ละแม จังหวัดชุมพร ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ตำบลประสงค์ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชูน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลดอนตะโภ อำเภอท่าศาลา ตำบลหนองหงส์ อำเภอพระมหาวิหาร ตำบลกำแพงเชา อำเภอเมือง ตำบลท่าดี อำเภอ dane ตำบลนาสงสາ ตำบลนาเรหง อำเภอโนนบิน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง ตำบลปลายประชา อำเภอปลายประชา จังหวัดยะลา ตำบลไม่ฝาด อำเภอสีเกา ตำบลซ่อง อำเภอโนนไทย จังหวัดตรัง ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ตำบลคลุนกาหลง อำเภอควบคุม จังหวัดสตูล

2) พื้นที่ที่มีการระบาดระดับปานกลาง ได้แก่ ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง ตำบลชุมโภ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ตำบลสำนักแรด ตำบลป่าดังเบชาร์ ตำบลทุ่งหมื่น อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

3) พื้นที่ที่มีการระบาดน้อย ได้แก่ ตำบลปากศัย อำเภอเหนือคลอง ตำบลหัวยน้ำขาว อำเภอคลองห่อม จังหวัดยะลา ตำบลปากคลุย ตำบลคลองไทร อำเภอท่าจາ ตำบลสมอห้อง ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชูน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลพะตง ตำบลบ้านพู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตำบลปากน้ำ ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู ตำบลพิมาน อำเภอเมือง ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ตำบลน้ำจีด ตำบลปากจัน ตำบลลมมนุ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ในการศึกษาการแพร่ระบาดของโรครากขาวในยางพารานั้น โดยมีการประเมินปัจจัยที่คาดว่าจะเอื้อต่อการแพร่ระบาด ในแต่ละประเด็นสำคัญ ดังนี้

1) ลักษณะดินในสวนยางพารา

ลักษณะดิน เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่อาจจะส่งผลต่อการระบาดของโรครากขาวในยางพารา (Soekirman, 2006 อ้างถึงในวสันณ์ เพชรรัตน์ และคณะ, 2552) สำหรับการศึกษาระดับนี้ พบรักษณะดินประเภทต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 4.19

ตารางที่ 4.19 ลักษณะคินในสวนยางพาราของเกษตรกรในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา

หน่วย: แปลง

ลักษณะคิน	จำนวน (n=379)	ร้อยละ
ร่วน	160	42.2
ทราย	57	15.0
เหนียว	92	24.3
ลูกรัง	70	18.5

การสำรวจพื้นที่ระบบของโภครากขาวในยางพารา พบว่า พื้นที่ยางพารามีลักษณะคินประเภทคินร่วนมากที่สุด ร้อยละ 42.2 รองลงมาเป็นคินประเภทคินเหนียว ร้อยละ 24.3 นอกจากนั้นยังพบคินประเภทคินลูกรัง และคินทราย ร้อยละ 18.5 และ 15.0 ตามลำดับ

2) พันธุ์ยาง

สำหรับพันธุ์ยางพารา จากการสังเกตด้วยสายตาและการสอบถามจากเกษตรกร เจ้าของสวนยาง พบว่าเป็นโภครากขาวมากที่สุด คือ พันธุ์ RRIM 600 ร้อยละ 77.3 รองลงมาคือ พันธุ์ BPM 24 ร้อยละ 14.0 (ตารางที่ 4.20) สอดคล้องกับการศึกษาของ อุไร จันทรประทิน และคณะ (2542) ที่ได้ทำการศึกษาการรวบรวมและศึกษาแหล่งเกิดโภครากขาวของยางพาราในเขตป่าลูกยางภาคใต้ พบว่า พันธุ์ RRIM 600 เป็นโภครากขาวสามารถข้าทำลายได้มากที่สุด

ตารางที่ 4.20 พันธุ์ยางพาราที่พบการระบุของโภครากขาวในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา

หน่วย: แปลง

พันธุ์ยาง	จำนวน (n=379)	ร้อยละ
พันธุ์ RRIM 600	293	77.3
พันธุ์ BPM 24	53	14.0
พันธุ์ PB 235	21	5.5
พันธุ์ 251	19	5.0
พันธุ์ GT1	15	4.0
พันธุ์ 311	8	2.1
พันธุ์ PB 260	4	1.1
พันธุ์ PB 255	4	1.1
พันธุ์ PB 250	1	0.3

3) รอบการผลิต

รอบการผลิตย่างพาราของเกย์ตระกรในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 4.21 พบว่า โรค rak ขาวเข้าทำลายยางพาราในรอบการผลิตที่ส่องมากที่สุด ร้อยละ 47.5 รองลงมาพบการเข้าทำลายของโรคในรอบแรกของการผลิต ร้อยละ 41.2 และมีบางส่วนที่โรคเข้าทำลายในรอบการผลิตที่สาม ร้อยละ 11.3

ตารางที่ 4.21 รอบการผลิตย่างพาราของเกย์ตระกรในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา

หน่วย: แปลง

รอบการผลิต	จำนวน (n=379)	ร้อยละ
รอบแรก	156	41.2
รอบที่ส่อง	180	47.5
รอบที่สาม	43	11.3


4) ปีที่เริ่มระบาด

จากการสำรวจพื้นที่การระบาดของโรค rak ขาวในยางพารา พบว่า การระบาดของโรค rak ขาวเริ่มระบาดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน โดยพบการระบาดเริ่มต้นในปีต่างๆ ดังตารางที่ 4.22 ช่วงปีที่เริ่มพบเห็นการระบาดมากที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2546 – 2550 คิดเป็นร้อยละ 42.7 รองลงมาพบการเริ่มระบาดของโรค rak ขาวในยางพาราช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป ร้อยละ 31.2 ซึ่งพบการระบาดน้อยในช่วงก่อน ปี พ.ศ. 2530 ร้อยละ 1.3 ซึ่งหากพิจารณาในรายปีที่พบการระบาดเริ่มแรกในปี พ.ศ. 2527 จำนวน 2 แปลง และค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนในปี พ.ศ. 2552 มีจำนวน แปลงที่เพิ่มเห็นการระบาดของโรคมากที่สุด ถึง 49 แปลง และลดลงที่ 29 แปลง ในปี พ.ศ. 2553 ดังแสดงในภาพประกอบที่ 4.2 จากกราฟในภาพจะเห็นว่า การพบเห็นการระบาดในแปลงมีลักษณะขึ้นๆ ลงๆ คาดว่าเกิดเพราะปัจจัยสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง แต่จะเห็นแนวโน้มจำนวนแปลงที่พบเห็นการระบาดเพิ่มมากขึ้นในปีหลังๆ ในลักษณะกราฟแนวโน้มแบบเอกโพเนนเชียล (exponential trend)

ตารางที่ 4.22 ช่วงปีที่พบการเริ่มระบบของโรค rak�າในยางพารา

หน่วย: แปลง

ช่วงปีที่เริ่มระบบ	จำนวน (n=379)	ร้อยละ
ก่อน ปี พ.ศ. 2530	5	1.3
2531 – 2535	14	3.7
2536 – 2540	28	7.4
2541 – 2545	52	13.7
2546 – 2550	162	42.7
ตั้งแต่ 2550 ขึ้นไป	118	31.2



ภาพประกอบที่ 4.2 แสดงปีที่เริ่มระบบของโรค rak�າในยางพาราในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา

5) จำนวนต้นยางพาราที่ถูกทำลายด้วยโรค rak�າ

การสำรวจยางพาราที่มีการระบบของโรค rak�າ พบรจำนวนต้นยางพาราที่ถูกทำลายด้วยโรค rak�າ ดังแสดงในตารางที่ 4.23

ตารางที่ 4.23 จำนวนต้นยางพาราที่ถูกทำลายด้วยโรครากรขาว

หน่วย: แปลง

รายการ	จำนวน (n=379)	ร้อยละ
จำนวนต้นที่โดนทำลาย (ต้นต่อแปลง)		
น้อยกว่าเท่ากับ 10	118	31.1
11 – 20	60	15.8
21 – 30	46	12.1
31 – 40	19	5.0
41 – 50	21	5.5
51 – 70	18	4.8
71 – 100	18	4.8
101 – 200	39	10.3
201 – 300	22	5.8
มากกว่า 300	18	4.8
จำนวนต้นเฉลี่ย = 70.54, จำนวนต้นต่ำสุด = 1.00, จำนวนต้นสูงสุด = 650.00, S.D. = 103.36		
ร้อยละของจำนวนต้นยางในแปลงทั้งหมด		
น้อยกว่าเท่ากับ 0.50	42	11.1
0.51 – 1.00	30	7.9
1.01 - 5.00	149	39.3
5.01 – 10.00	54	14.2
10.01 – 20.00	39	10.3
20.01 – 50.00	50	13.2
50.01 – 70.00	11	2.9
มากกว่า 70.00	4	1.1
ร้อยละของจำนวนต้นเฉลี่ย = 10.62, ร้อยละของจำนวนต้นต่ำสุด = 0.004, ร้อยละของจำนวนต้นสูงสุด = 86.67, S.D. = 15.87		

จากตารางที่ 4.23 แสดงจำนวนต้นยางพาราที่ถูกทำลายด้วยโรครากรขาวเฉลี่ย 70.54 ต้นต่อแปลง จำนวนต้นที่โดนทำลายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ต้นต่อแปลง มากที่สุด ร้อยละ 31.1 รองลงมาอยู่ในช่วง 11 – 20 ต้นต่อแปลง ร้อยละ 15.8 และจำนวนต้นที่ถูกทำลายตั้งแต่ 100 ต้นต่อแปลงขึ้นไปถึงร้อยละ 20.8 เมื่อคิดเป็นจำนวนร้อยละจากจำนวนต้นยางพาราทั้งหมด พบร่วมกันโดยเฉลี่ยแล้วต้นยางที่ถูกทำลายด้วยโรครากรขาวคิดเป็นร้อยละ 10.62 ของจำนวนต้นยางพาราทั้งหมด และพบว่า อยู่ในช่วงร้อยละ 1.01 - 5.00 ของจำนวนทั้งหมด ร้อยละ 39.3 รองลงมาอยู่ในช่วงร้อยละ 5.01 – 10.00 และร้อยละ 20.01 – 50.00 คิดเป็นร้อยละ 14.2 และ 13.2 ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาจำนวนต้นยางพาราเฉลี่ยที่ถูกทำลายตามระยะของการถูกทำลาย ดังแสดงในตารางที่ 4.24 พบร่วมกันว่า ส่วนใหญ่จะพบในระยะโค่นล้ม ไปแล้วเฉลี่ย 69.4 ต้นต่อแปลง ส่วนระยะอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นระยะเริ่มทำลาย ในเหลือง และในร่วงต้นตาย เกษตรกรจะสังเกตเห็นได้น้อย

ตารางที่ 4.24 จำนวนต้นยางพาราเฉลี่ยต่อแปลงที่ถูกทำลายตามระยะของการถูกทำลาย

หน่วย: ต้นต่อแปลง

ระยะของการถูกทำลาย	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	SD.
เริ่มทำลาย	11.8	2.0	50.0	14.6
ใบเหลือง	5.2	1.0	40.0	5.7
ใบร่วงต้นตาย	9.0	1.0	70.0	11.4
โค่นล้ม	69.4	1.0	650.0	102.9
รวม	70.5	1.0	650.0	103.4

6) ระยะเวลาในการเข้าทำลาย และช่วงฤดูกาลที่มีการระบาดของโรคrunแรง

สำหรับระยะเวลาในการเข้าทำลายตั้งแต่แรกเริ่มทำลายไปจนถึงระยะที่ต้นยางพาราโค่นล้ม ตลอดจนฤดูกาลที่คาดว่าจะเกิดการระบาดของโรคนั้น ดังแสดงในตารางที่ 4.25 โดยระยะแรกคือตั้งแต่แรกเริ่มทำลายถึงระยะใบเหลือง ใช้เวลาเฉลี่ย 59.9 วันหรือประมาณ 2 เดือน ใช้เวลาอยู่ในช่วง 31 – 60 วัน มากที่สุด ร้อยละ 23.2 และตั้งแต่ 91 วันขึ้นไป น้อยที่สุด ร้อยละ 6.9 นอกจากนั้นเกษตรบางส่วนที่ไม่ได้สังเกตหรือจำไม่ได้ ร้อยละ 24.0

ระยะเวลาที่ใบเหลืองจนถึงใบร่วงต้นตาย ใช้เวลาเฉลี่ย 76.0 วันหรือประมาณ 2 เดือนครึ่ง ใช้เวลาอยู่ในช่วง 31 – 60 วัน มากที่สุด ร้อยละ 21.1 รองลงมาคือระยะเวลาตั้งแต่ 91 วันขึ้นไป ร้อยละ 17.9 และเวลาไม่เกิน 15 วัน เป็นระยะที่น้อยที่สุด ร้อยละ 11.3 นอกจากนั้นเกษตรบางส่วนที่ไม่ได้สังเกตหรือจำไม่ได้ ร้อยละ 19.0

ระยะเวลาที่ใบร่างจนถึงโค่นล้ม ใช้เวลาเฉลี่ย 125.9 วันหรือประมาณ 4 เดือน ใช้เวลาอยู่ในช่วงตั้งแต่ 91 ขึ้นไป มากที่สุด ร้อยละ 19.3 เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงดังกล่าวเกย์ตระกร กว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 59.9 ไม่ได้สังเกตหรือประมาณระยะเวลาดังกล่าวไว้ได้

หากนำจำนวนวันเฉลี่ยจากที่เกย์ตระกรสังเกตเห็นในระยะเริ่มทำลาย จนใบเหลือง จนถึงระยะใบร่าง และโค่นล้ม พบร่วม ใช้เวลาทั้งสิ้น 262 วัน หรือประมาณ 8-9 เดือน ถือเป็น ระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน

สำหรับช่วงฤดูกาลที่มีการระบาดของโรครุนแรงนี้ เกย์ตระกรเห็นว่าช่วงฤดูฝน เป็นช่วงที่มีการระบาดของโรครากขาวรุนแรง มากที่สุด ร้อยละ 36.7 รองลงมาคือช่วงฤดูร้อน ร้อย ละ 16.6 และเห็นว่ามีการระบาดลดลงทั้งปี ร้อยละ 3.2 ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของศูนย์ ปฏิบัติการข่าวเกย์ตระกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา (2550) ซึ่งกล่าวว่า โรครากขาว จะเกิดการระบาดในยางพาราได้ตลอดทั้งปี แต่จะระบาดอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูฝน อย่างไรก็ตาม มีเกย์ตระกรอึกจำนวนไม่น้อยถึงร้อยละ 43.5 ที่ไม่ได้สังเกตช่วงที่มีการระบาดหนัก ของโรครากขาวในยางพาราของพื้นที่ยางพาราตอนเอง

ตารางที่ 4.25 ระยะเวลาในการเข้าทำลายตั้งแต่แรกเริ่มทำลายไปจนถึงระยะที่ต้นยางพาราโค่นล้ม และช่วงฤดูกาลที่มีการระบาดของโรครุนแรง

รายการ	จำนวน (n=379)	ร้อยละ
ระยะเริ่มทำลาย ถึง ระยะใบเหลือง (วัน)		
ไม่ได้สังเกต/จำไม่ได้	91	24.0
ไม่เกิน 30 วัน	48	12.7
30 วัน	73	19.3
31 – 60 วัน	88	23.2
61 – 90 วัน	53	14.0
ตั้งแต่ 91 ขึ้นไป	26	6.9
จำนวนวันเฉลี่ย = 59.9, จำนวนวันต่ำสุด = 7.0, จำนวนวันสูงสุด = 365.0, S.D. = 48.7		

ตารางที่ 4.25 (ต่อ)


รายการ	จำนวน (n=379)	ร้อยละ
ระยะเวลาในเหลือง ถึง ใบร่วงต้นตาย (วัน)		
ไม่ได้สังเกต/จำไม่ได้	72	19.0
ไม่เกิน 15 วัน	43	11.3
16 – 30 วัน	63	16.6
31 – 60 วัน	80	21.1
61 – 90 วัน	53	14.0
ตั้งแต่ 91 ขึ้นไป	68	17.9
จำนวนวันเฉลี่ย = 76.0, จำนวนวันต่ำสุด = 10.0, จำนวนวันสูงสุด = 365.0, S.D. = 67.2		
ระยะเวลาในร่วง ถึง โคลนล้ม (วัน)		
ไม่ได้สังเกต/จำไม่ได้	227	59.9
ไม่เกิน 15 วัน	5	1.3
16 – 30 วัน	18	4.7
31 – 60 วัน	31	8.2
61 – 90 วัน	25	6.6
ตั้งแต่ 91 ขึ้นไป	73	19.3
จำนวนวันเฉลี่ย = 125.9, จำนวนวันต่ำสุด = 5.0, จำนวนวันสูงสุด = 365.0, S.D. = 90.1		
ช่วงฤดูกาลที่มีการระบาดของโรครุนแรง		
ไม่ได้สังเกต/จำไม่ได้	165	43.5
ฝน	139	36.7
ร้อน	63	16.6
ตลอดทั้งปี	12	3.2

4.4.2 การแพร่ระบาดของโรครากรขาวในยางพารา ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)

การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา โดยนำเสนอค่วยแผนที่ตามพิกัดของพื้นที่สำรวจที่ได้รับแพร่ระบาดของโรครากรขาว เป็นรายจังหวัด ดังภาพประกอบที่ 4.3 -4.6

การระบาดของโรครากรขาวในจังหวัดชุมพร ซึ่งมีความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกัน โดยสามารถสรุปพื้นที่ที่มีการระบาดในแต่ละระดับ จากภาพประกอบที่ 4.3 ดังนี้


- 1) พื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง ได้แก่ ตำบลคลองยาง อ่าเภอปะทิว และตำบลทุ่งควัวัด อ่าเภอฉะแม
- 2) พื้นที่ที่มีการระบาดระดับปานกลาง ได้แก่ ตำบลชุมโภ อำเภอปะทิว
- 3) พื้นที่ที่มีการระบานด้อย ได้แก่ ตำบลปากคลอง อ่าเภอปะทิว



ภาพประกอบที่ 4.3 แสดงการระบาดของโรครากรขาวในพื้นที่จังหวัดชุมพร

การระบาดของโรครากขาวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกัน โดยสามารถสรุปพื้นที่ที่มีการระบาดในแต่ละระดับ จากภาพประกอบที่ 4.4 ดังนี้


- พื้นที่ที่มีการระบุครุณแรง ได้แก่ ตำบลประสงค์ ตำบลคลองพ่า อำเภอท่าชนะ
 - พื้นที่ที่มีการระบุระดับปานกลาง ได้แก่ ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม
 - พื้นที่ที่มีการระบุคนน้อย ได้แก่ ตำบลปากคลุย ตำบลคลองไทร อำเภอท่าจัง ตำบลสมอทอง ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ



ภาพประกอบที่ 4.4 แสดงการระบาดของโรครากรขาวในพื้นที่จังหวัดสระบุรีชานี

การระบาดของโรครากวัวในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกัน โดยสามารถสรุปพื้นที่ที่มีการระบาดในแต่ละระดับ จากภาพประกอบที่ 4.5 ดังนี้


- พื้นที่ที่มีการระบุครุนแรง ได้แก่ ตำบลดอนตะโภ อำเภอท่าศาลา ตำบลหนองแหง อำเภอพรหมคีรี ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง ตำบลท่าดี อำเภอตานสกฯ และตำบลนาแหง อำเภอ nabpitam
 - พื้นที่ที่มีการระบุระดับปานกลาง ไม่พบว่ามีการระบุด้วยระดับดังกล่าว
 - พื้นที่ที่มีการระบุน้อย ได้แก่ ตำบลไทยบูรี อำเภอท่าศาลา และตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม



ภาพประกายที่ 45 แสดงการระบายด้วยโกรกรากขาวในพื้นที่จังหวัดนนคห์ธรนราษ

การระบาดของโรครากวัวในจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกัน สามารถสรุปพื้นที่ที่มีการระบาดในแต่ละระดับ จากภาพประกอบที่ 4.6 ดังนี้

- 1) พื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง ได้แก่ ตำบลโภค�่วง อำเภอคลองหอยโข่ง
- 2) พื้นที่ที่มีการระบาดระดับปานกลาง ได้แก่ ตำบลล้านนาดแท้ว ตำบลป่าดังเบชาร์ ตำบลทุ่งหม้อ อำเภอสะเดา
- 3) พื้นที่ที่มีการระบานด้อย ได้แก่ ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลพะထง ตำบลบ้านพรุ อำเภอไหหลำ



ภาพประกอบที่ 4.6 แสดงการระบาดของโรครากวัวในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

ในการศึกษาการแพร่ระบาดของโรครากขาวในยางพารา ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) โดยมีการประเมินปัจจัยที่จะเอื้อต่อการแพร่ระบาด ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี้

1) ลักษณะดินในสวนยางพารา

ลักษณะดินของสวนยางพารา ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) ที่พบการแพร่ระบาดของโรครากขาว เป็นลักษณะดินประเภทต่างๆ ดังแสดงตารางที่ 4.26

ตารางที่ 4.26 ลักษณะดินในสวนยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)

หน่วย: แปลง

ลักษณะดิน	ชุมพร		สุราษฎร์ธานี		นครศรีธรรมราช		สงขลา		รวม	
	จำนวน (n=37)	ร้อย ละ	จำนวน (n=51)	ร้อย ละ	จำนวน (n=82)	ร้อยละ	จำนวน (n=42)	ร้อย ละ	จำนวน (n=212)	ร้อย ละ
ร่วน	19	51.3	11	21.6	51	62.1	17	40.5	98	46.2
ทราย	8	21.6	12	23.5	15	18.3	3	7.1	38	17.9
เหนียว	5	13.5	16	31.4	10	12.2	18	42.8	49	23.1
ลูกรัง	5	13.5	12	23.6	6	7.3	4	9.5	27	12.7

ลักษณะดินในสวนยางพาราของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) เป็นดินร่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.2 เมื่อพิจารณารายจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ที่พบการระบาดของโรครากขาว แต่ละพื้นที่มีลักษณะดินที่แตกต่างกัน กล่าวคือ พื้นที่สวนยางพาราของเกย์ตรรในจังหวัดชุมพรเป็นพื้นที่ยางพารามีลักษณะดินเป็นดินร่วนมากที่สุด ร้อยละ 51.3 รองลงมาเป็นดินประเภทดินทราย ร้อยละ 21.6 พื้นที่สวนยางพาราของเกย์ตรรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่ยางพารามีลักษณะดินประเภทดินเหนียวมากที่สุด ร้อยละ 31.4 รองลงมาเป็นดินประเภทดินลูกรัง ดินทราย และดินร่วน ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ร้อยละ 23.6, 23.5 และ 21.6 พื้นที่สวนยางพาราของเกย์ตรรในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ยางพารามีลักษณะดินประเภทดินร่วนมากที่สุด ร้อยละ 62.1 รองลงมาเป็นดินประเภทดินทราย ร้อยละ 18.3 สำหรับพื้นที่สวนยางพาราของเกย์ตรรในจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ยางพารามีลักษณะดินประเภทดินเหนียว และดินร่วน ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ร้อยละ 42.8 และ 40.5 ตามลำดับ

2) พันธุ์ยาง

สำหรับพันธุ์ยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) ภาพรวม และรายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลาที่พบว่าเป็นโรครากขาวมากที่สุด คือ พันธุ์ RRIM 600 ร้อยละ 94.8, 100.0, 96.1, 93.9 และ 90.5 ตามลำดับ รองลงมาคือ พันธุ์

BPM 24 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี ส่วนพันธุ์ที่พบเป็นโรมากอันดับรองลงมาของ จังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา คือ พันธุ์ 251 และพันธุ์ PB 235 ตามลำดับ (ตารางที่ 4.27)

ตารางที่ 4.27 พันธุ์ยางพาราที่พบจากการระบาดของโรครากรขาวในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)

หน่วย: แปลง

พันธุ์ยาง*	ชุมพร		สุราษฎร์ธานี		นครศรีธรรมราช		สงขลา		รวม	
	จำนวน (n=37)	ร้อย ละ	จำนวน (n=51)	ร้อย ละ	จำนวน (n=82)	ร้อย ละ	จำนวน (n=42)	ร้อย ละ	จำนวน (n=212)	ร้อย ละ
พันธุ์ RRIM 600	37	100.0	49	96.1	77	93.9	38	90.5	201	94.8
พันธุ์ BPM 24	2	5.4	2	3.9	-	-	1	2.4	5	2.4
พันธุ์ PB 235	-	-	1	2.0	-	-	4	9.5	5	2.4
พันธุ์ 251			1	2.0	4	4.9	1	2.4	6	2.8
พันธุ์ 311	1	2.7	-	-	1	1.2	-	-	2	0.9
พันธุ์ PB 255	-	-	-	-	2	2.4	-	-	2	0.9

หมายเหตุ * ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

3) รอบการผลิต

รอบการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) มากกว่า ครึ่งหรือร้อยละ 51.4 โรครากรขาวเข้าทำลายยางพาราในรอบที่สองของการผลิต เมื่อพิจารณาราย จังหวัด พบว่า พื้นที่ของจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีนั้น โรครากรขาวเข้าทำลายยางพาราในรอบ การผลิตแรกมากที่สุด ร้อยละ 51.4 และ 47.1 ส่วนพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา พบการ เข้าทำลายของโรคในรอบสองของการผลิต มากที่สุด (ร้อยละ 52.4 และ 69.0)

ตารางที่ 4.28 รอบการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)

หน่วย: แปลง

รอบการผลิต	ชุมพร		สุราษฎร์ธานี		นครศรีธรรมราช		สงขลา		รวม	
	จำนวน (n=37)	ร้อย ละ	จำนวน (n=51)	ร้อย ละ	จำนวน (n=82)	ร้อย ละ	จำนวน (n=42)	ร้อย ละ	จำนวน (n=212)	ร้อย ละ
รอบแรก	19	51.4	24	47.1	22	26.8	6	14.3	71	33.5
รอบที่สอง	15	40.5	22	43.1	43	52.4	29	69.0	109	51.4
รอบที่สาม	3	8.1	5	9.8	17	20.7	7	16.7	32	15.1

4) ปีที่เริ่มระบาด

การระบาดของโรครากวัวในยางพาราของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) ดังแสดงตารางที่ 4.29 พบรการระบาดของโรครากวัวเริ่มระบาดก่อนปี พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน โดยพบรการระบาดเริ่มต้นในช่วงปี พ.ศ. 2546 – 2550 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.2 เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบร่วมกัน ช่วงปีที่เริ่มพบเห็นการระบาดมากที่สุดสำหรับเกย์ตระกรในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา คือ ปี พ.ศ. 2546 – 2550 คิดเป็นร้อยละ 56.8, 49.0, 34.1 และ 57.1 ตามลำดับ รองลงมาพบรการเริ่มระบาดของโรครากวัวช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป คิดเป็นร้อยละ 24.3, 27.5, 24.4 และ 21.4 ตามลำดับ เกย์ตระกรในจังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่พบรการเริ่มระบาดก่อนปี พ.ศ. 2535

ตารางที่ 4.29 ช่วงปีที่พบรการเริ่มระบาดของโรครากวัวในยางพารา

หน่วย: แปลง

ช่วงปีที่เริ่มระบาด	ชุมพร		สุราษฎร์ธานี		นครศรีธรรมราช		สงขลา		รวม	
	จำนวน (n=37)	ร้อย ละ	จำนวน (n=51)	ร้อย ละ	จำนวน (n=82)	ร้อย ละ	จำนวน (n=42)	ร้อย ละ	จำนวน (n=212)	ร้อย ละ
ก่อนปี พ.ศ. 2530	-	-	1	2.0	2	2.4	1	2.4	4	1.9
2531 – 2535	-	-	2	3.9	7	8.5	3	7.1	12	5.7
2536 – 2540	2	5.4	2	3.9	9	11.0	2	4.8	15	7.1
2541 – 2545	5	13.5	7	13.7	16	19.5	3	7.1	31	14.6
2546 – 2550	21	56.8	25	49.0	28	34.1	24	57.1	98	46.2
หลังปี พ.ศ. 2550	9	24.3	14	27.5	20	24.4	9	21.4	52	24.5

5) จำนวนต้นยางพาราที่ถูกทำลายด้วยโรครากวัว

การระบาดของโรครากวัวในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) ที่ประกอบด้วยจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา พบรจำนวนต้นยางพาราที่ถูกทำลายด้วยโรครากวัว ดังแสดงในตารางที่ 4.30

ตารางที่ 4.30 จำนวนต้นยางพาราที่ถูกทำลายด้วยโรครากรขาวในพื้นที่ภาคใต้ฟังตะวันออก (อ่างไทย)

รายการ	ชุมพร		สุราษฎร์ธานี		นครศรีธรรมราช		สงขลา		รวม	
	จำนวน (n=37)	ร้อยละ	จำนวน (n=51)	ร้อยละ	จำนวน (n=82)	ร้อยละ	จำนวน (n=42)	ร้อยละ	จำนวน (n=212)	ร้อยละ
จำนวนต้นที่โดนทำลาย(ต้นต่อแปลง)										
น้อยกว่าเท่ากับ 10	11	29.7	22	43.1	10	12.2	10	23.8	53	25.0
11 – 20	7	18.9	6	11.8	16	19.5	6	14.3	35	16.5
21 – 30	3	8.1	5	9.8	8	9.8	4	9.5	20	9.4
31 – 40	2	5.4	2	3.9	2	2.4	2	4.8	8	3.8
41 – 50	3	8.1	2	3.9	3	3.7	2	4.8	10	4.7
51 – 70	3	8.1	-	-	4	4.9	6	14.3	13	6.1
71 – 100	1	2.7	-	-	8	9.8	3	7.1	12	5.7
101 – 200	5	13.5	8	15.7	13	15.9	4	9.5	30	14.2
201 – 300	2	5.4	4	7.8	7	8.5	4	9.5	17	8.0
มากกว่า 300	-	-	2	3.9	11	13.4	1	2.4	14	6.6
จำนวนต้นเฉลี่ย	55.3		72.6		126.6		73.6		90.7	
จำนวนต้นต่ำสุด	1.0		1.0		3.0		2.0		1.0	
จำนวนต้นสูงสุด	300.0		500.0		650.0		350.0		650.0	
S.D.	69.4		109.9		140.9		84.5		116.4	

ตารางที่ 4.30 (ต่อ)

รายการ	ชุมพร		สุราษฎร์ธานี		นครศรีธรรมราช		สงขลา		รวม	
	จำนวน (n=37)	ร้อยละ	จำนวน (n=51)	ร้อยละ	จำนวน (n=82)	ร้อยละ	จำนวน (n=42)	ร้อยละ	จำนวน (n=212)	ร้อยละ
ร้อยละของจำนวนทั้งหมด										
น้อยกว่าเท่ากับ 0.5	4	10.8	19	37.3	1	1.2	1	2.4	25	11.8
0.51 – 1.00	8	21.6	3	5.9	4	4.9	5	11.9	20	9.4
1.01 - 5.00	15	40.5	15	29.4	18	22.0	17	40.5	65	30.7
5.01 – 10.00	3	8.1	6	11.8	14	17.1	7	16.7	30	14.2
10.01 – 20.00	5	13.5	4	7.8	12	14.6	4	9.5	25	11.8
20.01 – 50.00	-	-	3	5.9	25	30.5	6	14.3	34	16.0
50.01 – 70.00	1	2.7	-	-	6	7.3	2	4.8	9	4.2
มากกว่า 70.00	1	2.7	1	2.0	2	2.4	-	-	4	1.9
ร้อยละของจำนวนคืนเฉลี่ย	8.01		6.60		20.37		10.93		13.0	
ร้อยละของจำนวนคืนต่ำสุด	0.10		0.004		0.54		0.50		0.004	
ร้อยละของจำนวนคืนสูงสุด	85.00		71.42		86.67		66.67		86.7	
S.D.	17.35		13.03		20.08		15.20		18.1	

จากตารางที่ 4.30 แสดงจำนวนต้นยางพาราในภาคใต้ฟังตะวันออก (อ่าวไทย) ภาครวม และรายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลาที่ถูกทำลายด้วยโรครา กขาวเฉลี่ย 90.7, 55.30, 72.59, 126.61 และ 73.60 ต้นต่อแปลง ตามลำดับ ซึ่งของจำนวนต้นที่โดนทำลายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ต้น มาที่สุดในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา ร้อยละ 29.7, 43.1, 23.8 ยกเว้นจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งการกระจายของจำนวนต้นที่โดนทำลายอยู่ในช่วง 11 – 20 ต้น มาที่สุดร้อยละ 19.5 และจำนวนต้นที่ถูกทำลายตั้งแต่ 100 ต้นขึ้นไป พบริจังหวัด สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช มาที่สุด เมื่อคิดเป็นร้อยละจากจำนวนต้นยางพาราทั้งหมดในภาครวม และรายจังหวัด คือ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา พบริว่า โดยเฉลี่ยแล้วคิดเป็นร้อยละ 13.0, 8.01, 6.60, 20.37 และ 10.93 ของจำนวนต้นยางพาราทั้งหมด ตามลำดับ จะเห็นว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอัตราส่วนของการถูกทำลายมากกว่าเมื่อเทียบกับ จังหวัดอื่นๆ

เมื่อพิจารณาระยะของการถูกทำลายในภาครวม และรายจังหวัด คือ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ดังตารางที่ 4.31 พบริว่า ส่วนใหญ่จะพบในระยะโคลนล้ม ไปแล้วเฉลี่ย 90.7, 53.7, 75.6, 122.7 และ 75.2 ต้น ตามลำดับ ส่วนระยะอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นระยะเริ่มทำลาย ใบเหลือง และใบร่วงต้นตาย เกษตรกรจะสังเกตเห็นได้น้อยกว่า

ตารางที่ 4.31 จำนวนต้นยางพาราเฉลี่ยที่ถูกทำลายตามระยะของการถูกทำลายในพื้นที่ภาคใต้ฟัง ตะวันออก (อ่าวไทย)

หน่วย : ต้น/แปลง

ระยะของการถูกทำลาย	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	S.D.
ชุมพร (n=37)				
เริ่มทำลาย	6.5	3.0	10.0	4.9
ใบเหลือง	3.5	1.0	14.0	3.2
ใบร่วงต้นตาย	4.6	1.0	10.0	4.0
โคลนล้ม	53.7	3.0	300.0	69.7
รวม	55.3	1.0	300.0	69.3
สุราษฎร์ธานี (n=51)				
เริ่มทำลาย	13.6	4.0	50.0	20.4
ใบเหลือง	5.2	1.0	15.0	4.3
ใบร่วงต้นตาย	2.5	1.0	5.0	1.5
โคลนล้ม	75.6	2.0	500.0	110.0
รวม	72.6	1.0	500.0	109.9

ตารางที่ 4.31 (ต่อ)

ระยะของการถูกทำลาย	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	S.D.
นครศรีธรรมราช (n=82)				
เริ่มทำลาย	-	-	-	-
ใบเหลือง	5.6	1.0	30.0	5.3
ใบร่วงดันตาย	10.6	1.0	50.0	12.3
โคลนล้ม	122.7	2.0	650.0	139.5
รวม	126.6	3.0	650.0	140.9
สงขลา (n=42)				
เริ่มทำลาย	-	-	-	-
ใบเหลือง	6.3	1.0	20.0	6.2
ใบร่วงดันตาย	12.9	2.0	70.0	15.7
โคลนล้ม	75.2	1.0	350.0	86.3
รวม	73.6	2.0	350.0	84.5
ภาครวมภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) (n=212)				
เริ่มทำลาย	11.6	3.0	50.0	17.1
ใบเหลือง	5.2	1.0	30.0	5.0
ใบร่วงดันตาย	9.6	1.0	70.0	12.7
โคลนล้ม	90.7	1.0	650.0	116.4
รวม	90.7	1.0	650.0	116.4

6) ระยะเวลาในการเข้าทำลาย และช่วงถูกกลาที่มีการระบาดของโรครุนแรง

สำหรับระยะเวลาในการเข้าทำลายตั้งแต่แรกเริ่มทำลายไปจนถึงระยะที่ต้นยางพาราโคลนล้ม ตลอดจนถูกกลาที่คาดว่าจะเกิดการระบาดของโรคในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) ดังแสดงในตารางที่ 4.32

ตารางที่ 4.32 ระยะเวลาในการเข้าทำลายตั้งแต่แรกเริ่มทำลายไปจนถึงระยะที่ดันยางพาราโค่นล้ม และช่วงฤดูกาลที่มีการระบาดของโรครุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก (อ้างไทย)

ประเด็น	ชุมพร		สุราษฎร์ธานี		นครศรีธรรมราช		สงขลา		รวม	
	จำนวน (n=37)	ร้อยละ	จำนวน (n=51)	ร้อยละ	จำนวน (n=82)	ร้อยละ	จำนวน (n=42)	ร้อยละ	จำนวน (n=212)	ร้อยละ
ระยะเริ่มทำลาย ถึง ระยะใบเหลือง (วัน)										
ไม่ได้สังเกต/จำไม่ได้	2	5.4	16	31.4	12	14.6	14	33.3	44	20.8
ไม่เกิน 30 วัน	6	16.2	3	5.9	16	19.5	5	11.9	30	14.2
30 วัน	10	27.0	11	21.6	19	23.2	6	14.3	46	21.7
31 – 60 วัน	14	37.8	7	13.7	22	26.8	6	14.3	49	23.1
61 – 90 วัน	4	10.8	8	15.7	9	11.0	5	11.9	26	12.3
ตั้งแต่ 91 ขึ้นไป	1	2.7	6	11.8	4	4.9	6	14.3	17	8.0
จำนวนวันเฉลี่ย	47.3		72.1		49.9		69.9		57.3	
จำนวนวันต่ำสุด	7.0		7.0		10.0		7.0		7.0	
จำนวนวันสูงสุด	120.0		365.0		180.0		150.0		365.0	
S.D.	27.3		64.1		35.3		49.7		44.9	

ตารางที่ 4.32 (ต่อ)

ประเด็น	ชุมพร		สุราษฎร์ธานี		นครศรีธรรมราช		สงขลา		รวม	
	จำนวน (n=37)	ร้อยละ	จำนวน (n=51)	ร้อยละ	จำนวน (n=82)	ร้อยละ	จำนวน (n=42)	ร้อยละ	จำนวน (n=212)	ร้อยละ
ระยะเวลาในเหลือง ถึง ใบร่วงต้นตาย (วัน)										
ไม่ได้สังเกต/ไม่ได้	2	5.4	13	25.5	6	7.3	13	31.0	34	16.0
ไม่เกิน 15 วัน	6	16.2	4	7.8	14	17.1	3	7.1	27	12.7
16 - 30 วัน	5	13.5	13	25.5	16	19.5	5	11.9	39	18.4
31 – 60 วัน	11	29.7	10	19.6	20	24.4	8	19.0	49	23.1
61 – 90 วัน	5	13.5	7	13.7	9	11.0	4	9.5	25	11.8
ตั้งแต่ 91 ขึ้นไป	8	21.6	4	7.8	17	20.7	9	21.4	38	17.9
จำนวนวันเฉลี่ย	95.2		58.2		71.2		86.7		75.7	
จำนวนวันต่ำสุด	2.0		3.0		3.0		10.0		2.0	
จำนวนวันสูงสุด	365.0		160.0		360.0		240.0		365.0	
S.D.	106.2		37.9		66.4		70.0		72.7	

ตารางที่ 4.32 (ต่อ)

ประเด็น	ชุมพร		สุราษฎร์ธานี		นครศรีธรรมราช		สงขลา		รวม	
	จำนวน (n=37)	ร้อยละ	จำนวน (n=51)	ร้อยละ	จำนวน (n=82)	ร้อยละ	จำนวน (n=42)	ร้อยละ	จำนวน (n=212)	ร้อยละ
ระยะเวลาในร่วง ถึง โคนล้ม (วัน)										
ไม่ได้สังเกต/จำไม่ได้	20	54.1	26	51.0	48	58.5	35	83.3	129	60.8
ไม่เกิน 15 วัน	1	2.7	-	-	-	-	1	2.4	2	0.9
16 - 30 วัน	4	10.8	3	5.9	5	6.1	-	-	12	5.7
31 – 60 วัน	-	-	10	19.6	7	8.5	3	7.1	20	9.4
61 – 90 วัน	2	5.4	2	3.9	6	7.3	2	4.8	12	5.7
ตั้งแต่ 91 ขึ้นไป	10	27.0	10	19.6	16	19.5	1	2.4	37	17.5
จำนวนวันเฉลี่ย	163.5		108.2		124.6		86.6		124.4	
จำนวนวันต่ำสุด	10.0		30.0		30.0		6.0		6.0	
จำนวนวันสูงสุด	365.0		365.0		365.0		240.0		365.0	
S.D.	132.2		76.7		81.1		73.2		93.2	
อุบัติเหตุที่ระบาดหนัก										
ไม่ได้สังเกต/จำไม่ได้	7	18.9	27	52.9	28	34.1	32	76.2	94	44.3
ฝน	26	70.3	20	39.2	27	32.9	6	14.3	30	14.2
ร้อน	1	2.7	4	7.8	23	28.0	2	4.8	79	37.3
ตลอดทั้งปี	3	8.1			4	4.9	2	4.8	9	4.2

จากตารางที่ 4.32 แสดงระยะเวลาในการเข้าทำลายสำหรับเกย์ตระกรในภาพรวม และรายจังหวัด คือ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา โดยระยะแรกคือตั้งแต่แรกเริ่มทำลายถึงระยะใบเหลือง ใช้เวลาเฉลี่ย 57.3, 47.3, 72.1, 49.9 และ 69.9 วัน ตามลำดับ อุปในช่วง 31 – 60 วัน มากที่สุด

ระยะเวลาที่ใบเหลืองจนถึงใบร่วงต้นตาย ใช้เวลาเฉลี่ย 75.7, 95.2, 58.2, 71.2 และ 86.7 วัน กระจายอยู่ในช่วง 31 – 60 วัน มากที่สุด ยกเว้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีการกระจายของจำนวนวันอยู่ในช่วง 16 - 30 วัน มากที่สุด

ระยะเวลาที่ใบร่วงจนถึงโคลนล้ม ใช้เวลาเฉลี่ย 124.4, 163.5, 108.2, 124.6 และ 86.6 วัน กระจายอยู่ในช่วงตั้งแต่ 91 ปี ไป มากที่สุด เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงตั้งก่อตัวเกย์ตระกรในแต่ละจังหวัดกว่าครึ่งหนึ่ง ไม่ได้สังเกตหรือประมาณระยะเวลาดังกล่าวได้


สำหรับช่วงฤดูกาลที่มีการระบบของโรครุนแรงนั้น เกย์ตระกรในภาพรวม และรายจังหวัดแต่ละจังหวัดเห็นว่าช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่มีการระบบของโรครากขาวรุนแรง มากที่สุด รองลงมาคือช่วงฤดูร้อน ยกเว้นจังหวัดชุมพร ที่เห็นว่ามีการระบบลดลงทั้งปีในอันดับรองลงมา และเป็นที่น่าสังเกตว่าเกย์ตระกรในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.2 ไม่ได้มีการสังเกตเห็นการระบบที่รุนแรงในช่วงฤดูโคลนเลย

4.4.3 การแพร่ระบบของโรครากขาวในยางพารา ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)

การแพร่ระบบของโรคในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) อันประกอบไปด้วยจังหวัดระนอง ยะลา ตรัง และสตูล โดยนำเสนอด้วยแผนที่ตามพิกัดของพื้นที่สำรวจที่ได้รับแพร่ระบบของโรครากขาว เป็นรายจังหวัด ดังภาพประกอบที่ 4.7 -4.10

การระบาดของโรคราคขาวในจังหวัดระนอง ซึ่งมีความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกัน สามารถสรุปพื้นที่ที่มีการระบาดในแต่ละระดับ จากภาพประกอบที่ 4.7 ดังนี้


- พื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง ได้แก่ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบูรี
 - พื้นที่ที่มีการระบาดระดับปานกลาง ไม่ปรากฏการระบาดในระดับดังกล่าว
 - พื้นที่ที่มีการระบาดน้อย ได้แก่ ตำบลน้ำจีด ตำบลปากจัน ตำบลมะมุ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบูรี



ภาพประกอบที่ 4.7 แสดงการระบาดของโรครากรขาวในพื้นที่จังหวัดระนอง

การระบาดของโรครากรขาวในจังหวัดกระนี่ ซึ่งมีความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกัน สามารถสรุปพื้นที่ที่มีการระบาดในแต่ละระดับ จากภาพประกอบที่ 4.8 ดังนี้


- 1) พื้นที่ที่มีการระบادرุนแรง ได้แก่ ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง ตำบลป่าลายพระญา อำเภอป่าลายพระญา
- 2) พื้นที่ที่มีการระบาดระดับปานกลาง ได้แก่ ตำบลทับปริญ อำเภอเมือง
- 3) พื้นที่ที่มีการระบาดน้อย ได้แก่ ตำบลป่ากาศัย อำเภอเหนือคลอง ตำบลหัวขัน้ำขาว อำเภอคลองท่อม



ภาพประกอบที่ 4.8 แสดงการระบาดของโรครากรขาวในพื้นที่จังหวัดกระนี่

การระบาดของโรค rak ภายในจังหวัดตรัง ซึ่งมีความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกัน สามารถสรุปพื้นที่ที่มีการระบาดในแต่ละระดับ จากภาพประกอบที่ 4.9 ดังนี้


- 1) พื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง ได้แก่ ตำบลไทรฟ้า อ่าเภอสีเกา ตำบลช่อง อำเภอโนโຍ
- 2) พื้นที่ที่มีการระบาดระดับปานกลาง ได้แก่ ตำบลบ่อหิน อ่าเภอสีเกา
- 3) พื้นที่ที่มีการระบาดน้อย ไม่ปรากฏการระบาดในระดับดังกล่าว



ภาพประกอบที่ 4.9 แสดงการระบาดของโรค rak ในพื้นที่จังหวัดตรัง

การระบาดของโรครากรขาวในจังหวัดสตูล ซึ่งมีความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกัน สามารถสรุปพื้นที่ที่มีการระบาดในแต่ละระดับ จากภาพประกอบที่ 4.10 ดังนี้

- 1) พื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง ได้แก่ ตำบลควนกาหลง อ่าเภอควนกาหลง
- 2) พื้นที่ที่มีการระบาดระดับปานกลาง ได้แก่ ตำบลละงู อ่าเภอละงู
- 3) พื้นที่ที่มีการระบานด้อย ได้แก่ ตำบลปากน้ำ ตำบลน้ำผุด อ่าเภอละงู ตำบลพิมาน อ่าเภอเมือง และตำบลวังประจัน อ่าเภอควนโคน



ภาพประกอบที่ 4.10 แสดงการระบาดของโรครากรขาวในพื้นที่จังหวัดสตูล

ในการศึกษาการแพร่ระบาดของโรครากรขาวในยางพารา ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) โดยมีการประเมินปัจจัยที่คาดว่าจะเอื้อต่อการแพร่ระบาด ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี้

1) ลักษณะดินในสวนยางพารา

ลักษณะดินของสวนยางพารา ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) ที่พบการแพร่ระบาดของโรครากรขาว เป็นลักษณะดินประเภทต่างๆ ดังแสดงตารางที่ 4.33

ตารางที่ 4.33 ลักษณะดินในสวนยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)

หน่วย: แปลง

ลักษณะดิน	ระนอง		กระบี่		ตรัง		สตูล		รวม	
	จำนวน (n=59)	ร้อยละ	จำนวน (n=43)	ร้อยละ	จำนวน (n=35)	ร้อยละ	จำนวน (n=30)	ร้อยละ	จำนวน (n=167)	ร้อยละ
ร่วน	13	22.0	14	32.6	21	60.0	14	46.7	62	37.1
ทราย	7	11.9	7	16.3	2	5.7	3	10.0	19	11.4
เหนียว	14	23.7	13	30.2	9	25.7	7	23.3	43	25.7
ลูกรัง	25	42.4	9	20.9	3	8.6	6	20.0	43	25.7

ลักษณะดินในสวนยางพาราของภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) ที่พบราก缓缓 ของโครงการข้าวมากที่สุด เป็นลักษณะดินร่วน กิดเป็นร้อยละ 37.1 เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด ซึ่ง ประกอบด้วยจังหวัดระนอง กระบี่ ตรัง และสตูล มีลักษณะดินที่แตกต่างกัน กล่าวคือ พื้นที่สวนยางพาราของเกย์ตระกรในจังหวัดระนองเป็นมีลักษณะดินประเภทดินลูกรังมากที่สุด ร้อยละ 42.4 รองลงมาเป็นดินประเภทดินเหนียว ร้อยละ 23.7 พื้นที่สวนยางพาราของเกย์ตระกรในจังหวัดกระบี่ มีลักษณะดินประเภทดินร่วนมากที่สุด ร้อยละ 32.6 รองลงมาเป็นดินประเภทดินเหนียว ร้อยละ 30.2 พื้นที่สวนยางพาราของเกย์ตระกรในจังหวัดตรังมีลักษณะดินประเภทดินร่วนมากที่สุด ร้อยละ 60.0 รองลงมาเป็นดินประเภทดินเหนียว ร้อยละ 25.7 สำหรับพื้นที่สวนยางพาราของเกย์ตระกรใน จังหวัดสตูลมีลักษณะดินประเภทดินร่วนมากที่สุด ร้อยละ 46.7 รองลงมาเป็นลักษณะดินเหนียว และลูกรัง ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน ตามลำดับ

2) พันธุ์ยาง

พันธุ์ยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) ภาพรวม และรายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล ที่พบว่าเป็นโครงการข้าวมากที่สุด คือ พันธุ์ RRIM 600 ร้อยละ 55.1, 83.7, 74.3 และ 86.7 ส่วนจังหวัดระนอง พันธุ์ยางพาราที่พบว่าเป็นโครงการข้าวมากที่สุด คือ พันธุ์ BPM 24 ร้อยละ 50.8 ซึ่งพันธุ์ดังกล่าวพบเป็นโรคอันดับรองลงมาในพื้นที่จังหวัด กระบี่ ตรัง และสตูล ส่วนในจังหวัดระนอง พันธุ์ GT1 และพันธุ์ PB 235 พบรักในอันดับรองลง ตามลำดับ (ดังตารางที่ 4.34)

ตารางที่ 4.34 พันธุ์ยางพาราที่พบจากกระบวนการดองโรคราขาวในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)

หน่วย: แปลง

พันธุ์ยาง	ระนอง		กระนี่		ตรัง		สตูล		รวม	
	จำนวน (n=59)	ร้อย ละ	จำนวน (n=43)	ร้อย ละ	จำนวน (n=35)	ร้อย ละ	จำนวน (n=30)	ร้อย ละ	จำนวน (n=167)	ร้อย ละ
พันธุ์ RRIM 600	4	6.8	36	83.7	26	74.3	26	86.7	92	55.1
พันธุ์ BPM 24	30	50.8	7	16.3	7	20.0	4	13.3	48	28.7
พันธุ์ PB 235	14	23.7	1	2.3	1	2.9	-	-	16	9.6
พันธุ์ 251	9	15.3	1	2.3	1	2.9	2	6.7	13	7.8
พันธุ์ GT1	15	25.4	-	-	1	2.9	-	-	16	9.6
พันธุ์ 311	2	3.4	2	4.7	-	-	1	3.3	5	3.0
พันธุ์ PB 260	4	6.8	-	-	-	-	-	-	4	2.4
พันธุ์ PB 255	-	-	1	2.3	1	2.9	-	-	2	1.2
พันธุ์ PB 250	1	1.7	-	-	-	-	-	-	1	0.6

3) รอบการผลิต

รอบการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) ดังแสดง

ในตารางที่ 4.35 พบว่า ในภาพรวม มากว่าครึ่งหรือร้อยละ 50.9 โรคราขาวเข้าทำลายยางพาราในรอบการผลิตแรก เมื่อพิจารณารายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง กระนี่ ตรัง และสตูล พบร่วมกันที่ ของจังหวัดระนองและกระนี่นั้น โรคราขาวเข้าทำลายยางพาราในรอบการผลิตที่สองมากที่สุด ร้อยละ 49.2 และ 46.5 ตามลำดับ ส่วนพื้นที่จังหวัดตรัง และสตูล พบรากเข้าทำลายของโรคในรอบ การผลิตแรก มากที่สุด ร้อยละ 62.9 และ 56.7 ตามลำดับ

ตารางที่ 4.35 รอบการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)

หน่วย: แปลง

รอบการผลิต	ระนอง		กระนี่		ตรัง		สตูล		รวม	
	จำนวน (n=59)	ร้อย ละ	จำนวน (n=43)	ร้อย ละ	จำนวน (n=35)	ร้อย ละ	จำนวน (n=30)	ร้อย ละ	จำนวน (n=167)	ร้อย ละ
รอบแรก	27	45.8	19	44.2	22	62.9	17	56.7	85	50.9
รอบที่สอง	29	49.2	20	46.5	11	31.4	11	36.7	71	42.5
รอบที่สาม	3	5.1	4	9.3	2	5.7	2	6.7	11	6.6

4) ปีที่เริ่มระบาด

การสำรวจพื้นที่การระบาดของโรค raksha ในยางพาราของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) ได้แก่ จังหวัดระนอง กระบี่ ตรัง และสตูล โดยพบการระบาดเริ่มต้นในปีต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 4.36

ตารางที่ 4.36 ช่วงปีที่พบการเริ่มระบาดของโรค raksha ในยางพาราของภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)

หน่วย: แปลง

ช่วงปีที่เริ่มระบาด	ระนอง		กระบี่		ตรัง		สตูล		รวม	
	จำนวน (n=59)	ร้อย ละ	จำนวน (n=43)	ร้อย ละ	จำนวน (n=35)	ร้อย ละ	จำนวน (n=30)	ร้อย ละ	จำนวน (n=167)	ร้อย ละ
น้อยกว่าเท่ากับ 2530	-	-	-	-	1	2.9	-	-	1	0.6
2531 – 2535	-	-	2	4.7	-	-	-	-	2	1.2
2536 – 2540	5	8.5	2	4.7	2	5.7	4	13.3	13	7.8
2541 – 2545	6	10.2	7	16.3	3	8.6	5	16.7	21	12.6
2546 – 2550	20	33.9	16	37.2	17	48.6	11	36.7	64	38.3
ตั้งแต่ 2550 ขึ้นไป	28	47.5	16	37.2	12	34.3	10	33.3	66	39.5

จากตารางที่ 4.36 ช่วงปีที่เริ่มพบเห็นการระบาดมากที่สุดสำหรับเกย์ตอร์ในภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) อยู่ในช่วงตั้งแต่ 2550 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 39.5 เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบว่า จังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล คือ ปี พ.ศ. 2546 – 2550 คิดเป็นร้อยละ 37.2, 48.6 และ 36.7 ตามลำดับ รองลงมาพบการเริ่มระบาดของโรค raksha ในยางพาราช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป คิดเป็นร้อยละ 37.2, 34.3 และ 33.3 ตามลำดับ ส่วนจังหวัดระนองพบการเริ่มระบาดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมาหากที่สุด ร้อยละ 47.5 เกย์ตอร์ในจังหวัดตรังเป็นจังหวัดเดียวที่พบการเริ่มระบาดก่อนปี พ.ศ. 2530

5) จำนวนต้นยางพาราที่ถูกทำลายด้วยโรค raksha

การสำรวจยางพาราที่มีการระบาดของโรค raksha ในภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) ได้แก่ จังหวัดระนอง กระบี่ ตรัง และสตูล พบจำนวนต้นยางพาราที่ถูกทำลายด้วยโรค raksha ดังแสดงในตารางที่ 4.37

ตารางที่ 4.37 จำนวนต้นยางพาราที่ถูกทำลายด้วยโรครากรขาวในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)

หน่วย: ตันต่อแปลง

รายการ	ระนอง		กระปี		ตรัง		สตูล		รวม	
	จำนวน (n=59)	ร้อยละ	จำนวน (n=43)	ร้อยละ	จำนวน (n=35)	ร้อยละ	จำนวน (n=30)	ร้อยละ	จำนวน (n=167)	ร้อยละ
จำนวนต้นที่โดนทำลาย(ตันต่อแปลง)										
น้อยกว่าเท่ากับ 10	23	39.0	19	44.2	10	28.6	13	43.3	65	38.9
11 – 20	9	15.3	5	11.6	5	14.3	6	20.0	25	15.0
21 – 30	14	23.7	1	2.3	8	22.9	3	10.0	26	15.6
31 – 40	3	5.1	4	9.3	3	8.6	1	3.3	11	6.6
41 – 50	5	8.5	3	7.0	2	5.7	1	3.3	11	6.6
51 – 70	3	5.1	-	-	2	5.7	-	-	5	3.0
71 – 100	1	1.7	2	4.7	1	2.9	2	6.7	6	3.6
101 – 200	1	1.7	5	11.6	1	2.9	2	6.7	9	5.4
201 – 300	-	-	3	7.0	1	2.9	1	3.3	5	3.0
มากกว่า 300	-	-	1	2.3	2	5.7	1	3.3	4	2.4
จำนวนต้นเฉลี่ย	23.64		59.07		60.00		49.30		45.0	
จำนวนต้นต่ำสุด	1.00		2.00		4.00		1.00		1.0	
จำนวนต้นสูงสุด	115.00		350.00		500.00		350.00		500.0	
S.D.	22.54		85.85		108.44		83.65		77.1	

ตารางที่ 4.37 (ต่อ)

หน่วย: ดันต่อแปลง

รายการ	ระนอง		กรุงปี		ตรัง		สตูล		รวม	
	จำนวน (n=59)	ร้อยละ	จำนวน (n=43)	ร้อยละ	จำนวน (n=35)	ร้อยละ	จำนวน (n=30)	ร้อยละ	จำนวน (n=167)	ร้อยละ
ร้อยละของจำนวนต้นยางในแปลงทั้งหมด										
น้อยกว่าเท่ากับ 0.50	7	11.9	5	11.6	1	2.9	4	13.3	17	10.2
0.51 – 1.00	7	11.9	1	2.3	-	-	2	6.7	10	6.0
1.01 - 5.00	36	61.0	19	44.2	17	48.6	12	40.0	84	50.3
5.01 – 10.00	3	5.1	6	14.0	10	28.6	5	16.7	24	14.4
10.01 – 20.00	5	8.5	4	9.3	1	2.9	4	13.3	14	8.4
20.01 – 50.00	1	1.7	7	16.3	5	14.3	3	10.0	16	9.6
50.01 – 70.00	-	-	1	2.3	1	2.9	-	-	2	1.2
มากกว่า 70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละของจำนวนต้นเนลลี่	3.92		9.39		11.49		7.55		7.6	
ร้อยละของจำนวนต้นต้าสูด	0.07		0.19		0.08		0.08		0.1	
ร้อยละของจำนวนต้นสูงสุด	48.00		55.56		66.00		50.00		66.0	
S.D.	6.92		12.85		16.08		10.77		11.9	

จากตารางที่ 4.37 แสดงจำนวนต้นยางพาราในภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) ที่ถูกทำลายด้วยโรครากรากขาวเฉลี่ย 45.0 ต้นต่อแปลง เมื่อคิดเป็นร้อยละจากจำนวนต้นยางพาราทั้งหมด โดยเฉลี่ยแล้วคิดเป็นร้อยละ 7.6 เมื่อพิจารณารายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง grade ศรีสะเกษ และสตูลที่ถูกทำลายด้วยโรครากรากขาวเฉลี่ย 23.64, 59.07, 60.00 และ 49.30 ต้นต่อแปลง ตามลำดับ จำนวนต้นที่โดนทำลายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ต้น มากที่สุดในทุกจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 39.0, 44.2, 28.6 และ 43.3 ตามลำดับ และจำนวนต้นที่ถูกทำลายตั้งแต่ 100 ต้นขึ้นไป พบริจังหวัดgrade ศรีสะเกษ และสตูล เมื่อคิดเป็นร้อยละจากจำนวนต้นยางพาราทั้งหมดในจังหวัดระนอง grade ศรีสะเกษ และสตูล พบริจังหวัดที่ถูกทำลายเป็นร้อยละ 3.92, 9.39, 11.49 และ 7.55 ตามลำดับ ของจำนวนต้นยางพาราทั้งหมด ตามลำดับ จะเห็นว่าจังหวัดตรังมีอัตราส่วนของการถูกทำลายค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ

เมื่อพิจารณาระยะของการถูกทำลายในภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) ภาพรวม และรายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง grade ศรีสะเกษ และสตูล ดังตารางที่ 4.38 พบริจังหวัดที่ถูกทำลายในระยะโคงล้ม ไปแล้วเฉลี่ย 42.3, 21.0, 52.0, 57.0 และ 48.0 ต้น ตามลำดับ ส่วนระยะอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นระยะเริ่มทำลาย ใบเหลือง และใบร่วงต้นตาย เกยตกรยะสังเกตเห็น ได้น้อยกว่า

ตารางที่ 4.38 จำนวนต้นยางพาราเฉลี่ยที่ถูกทำลายตามระยะของการถูกทำลายในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)

หน่วย: ต้นต่อแปลง

ระยะของการถูกทำลาย	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	S.D.
ระนอง (n=59)				
เริ่มทำลาย	17.5	15.0	20.0	3.5
ใบเหลือง	4.0	1.0	20.0	4.0
ใบร่วงต้นตาย	6.5	1.0	30.0	6.8
โคงล้ม	21.0	1.0	110.0	21.4
รวม	23.6	1.0	115.0	22.5
grade ศรีสะเกษ (n=43)				
เริ่มทำลาย	-	-	-	-
ใบเหลือง	8.8	1.0	40.0	10.6
ใบร่วงต้นตาย	14.8	1.0	53.0	17.9
โคงล้ม	52.0	1.0	310.0	75.1
รวม	59.1	2.0	350.0	85.8
ตรัง (n=35)				
ใบเหลือง	4.5	1.0	20.0	5.3
ใบร่วงต้นตาย	7.4	3.0	17.0	4.8
โคงล้ม	57.0	1.0	500.0	107.4
รวม	60.0	4.0	500.0	108.4

ตารางที่ 4.38 (ต่อ)

ระบบของการถูกทำลาย	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	S.D.
สูง (n=30)				
เริ่มทำลาย	2.0	2.0	2.0	0.0
ใบเหลือง	3.9	1.0	20.0	4.6
ใบร่วงดันตาย	6.8	1.0	20.0	5.8
โคลนล้ม	48.0	1.0	337.0	82.4
รวม	49.3	1.0	350.0	83.6
ภาพรวมภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) (n=167)				
เริ่มทำลาย	12.3	2.0	20.0	9.3
ใบเหลือง	5.1	1.0	40.0	6.5
ใบร่วงดันตาย	8.3	1.0	53.0	10.0
โคลนล้ม	42.3	1.0	500.0	74.7
รวม	45.0	1.0	500.0	77.1

6) ระยะเวลาในการเข้าทำลาย และช่วงฤดูกาลที่มีการระบาดของโรคrunny สำหรับระยะเวลาหรือจำนวนวันในการเข้าทำลายตั้งแต่แรกเริ่มทำลายไปจนถึงระยะที่ต้นยางพาราโคลนล้ม ตลอดจนฤดูกาลที่คาดว่าจะเกิดการระบาดของโรคในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) ดังแสดงในตารางที่ 4.39

ตารางที่ 4.39 ระยะเวลาในการเข้าทำลายตั้งแต่แรกเริ่มทำลายไปจนถึงระยะที่ดันยางพาราโค่นล้ม และช่วงฤดูกาลที่มีการระบาดของโรครุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)

ประเด็น	หนอง		กระปี		ตรัง		สตูล		รวม	
	จำนวน (n=59)	ร้อยละ	จำนวน (n=43)	ร้อยละ	จำนวน (n=35)	ร้อยละ	จำนวน (n=30)	ร้อยละ	จำนวน (n=167)	ร้อยละ
ระยะเริ่มทำลาย ถึง ระยะใบเหลือง (วัน)										
ไม่ได้สังเกต/จำไม่ได้	12	20.3	19	44.2	8	22.9	8	26.7	47	28.1
ไม่เกิน 30 วัน	1	1.7	6	14.0	3	8.6	8	26.7	18	10.8
30 วัน	9	15.3	6	14.0	7	20.0	5	16.7	27	16.2
31 – 60 วัน	19	32.2	7	16.3	7	20.0	6	20.0	39	23.4
61 – 90 วัน	17	28.8	1	2.3	7	20.0	2	6.7	27	16.2
ตั้งแต่ 91 ขึ้นไป	1	1.7	4	9.3	3	8.6	1	3.3	9	5.4
จำนวนวันเฉลี่ย	64.9		60.2		73.2		53.9		63.8	
จำนวนวันต่ำสุด	20.0		15.0		7.0		15.0		7.0	
จำนวนวันสูงสุด	120.0		210.0		365.0		365.0		365.0	
S.D.	24.6		53.8		70.8		73.6		53.7	

ตารางที่ 4.39 (ต่อ)

ประเด็น	ระนอง		กรุงปี		ตรัง		สตูล		รวม	
	จำนวน (n=59)	ร้อยละ	จำนวน (n=43)	ร้อย%	จำนวน (n=35)	ร้อย%	จำนวน (n=30)	ร้อย%	จำนวน (n=167)	ร้อย%
ระยะเวลาเหลือง ถึง ในร่วงต้นตาย (วัน)										
ไม่ได้สังเกต/จำไม่ได้	13	22.0	11	25.6	4	11.4	10	33.3	38	22.8
ไม่เกิน 15 วัน	2	3.4	2	4.7	4	11.4	8	26.7	16	9.6
16 – 30 วัน	7	11.9	10	23.3	2	5.7	5	16.7	24	14.4
31 – 60 วัน	16	27.1	5	11.6	9	25.7	1	3.3	31	18.6
61 – 90 วัน	13	22.0	6	14.0	6	17.1	3	10.0	28	16.8
ตั้งแต่ 91 ขึ้นไป	8	13.6	9	20.9	10	28.6	3	10.0	30	18.0
จำนวนวันเฉลี่ย	80.8		79.1		85.1		49.5		76.6	
จำนวนวันต่ำสุด	1.0		15.0		14.0		15.0		1.0	
จำนวนวันสูงสุด	360.0		180.0		365.0		150.0		365.0	
S.D.	58.7		56.6		68.0		43.8		59.1	

ตารางที่ 4.39 (ต่อ)

ประเด็น	ระนอง		กรุงปี		ตรัง		สตูล		รวม	
	จำนวน (n=59)	ร้อยละ	จำนวน (n=43)	ร้อยละ	จำนวน (n=35)	ร้อยละ	จำนวน (n=30)	ร้อยละ	จำนวน (n=167)	ร้อยละ
ระยะเวลาเร่งด่วน (วัน)										
ไม่ได้สังเกต/จำไม่ได้	26	44.1	30	69.8	20	57.1	22	73.3	98	58.7
ไม่เกิน 15 วัน	1	1.7	-	-	1	2.9	1	3.3	3	1.8
16 - 30 วัน	1	1.7	4	9.3	-	-	1	3.3	6	3.6
31 – 60 วัน	9	15.3	1	2.3	1	2.9	-	-	11	6.6
61 – 90 วัน	4	6.8	3	7.0	3	8.6	3	10.0	13	7.8
ตั้งแต่ 91 ขึ้นไป	18	30.5	5	11.6	10	28.6	3	10.0	36	21.6
จำนวนวันเฉลี่ย	125.8		129.2		153.3		84.4		127.6	
จำนวนวันต่ำสุด	5.0		30.0		9.0		15.0		5.0	
จำนวนวันสูงสุด	365.0		360.0		365.0		120.0		365.0	
S.D.	73.5		115.8		101.0		40.8		86.9	
อุจفالที่ระบาดหนัก										
ไม่ได้สังเกต/จำไม่ได้	33	55.9	18	41.9	6	17.1	14	46.7	71	42.5
ร้อน	20	33.9	4	9.3	5	14.3	4	13.3	33	19.8
ฝน	6	10.2	21	48.8	21	60.0	12	40.0	60	35.9
ตลอดทั้งปี	-	-	-	-	3	8.6	-	-	3	1.8

จากตารางที่ 4.39 แสดงระยะเวลาหรือจำนวนวันในการเข้าทำลายของโรครากขาวสำหรับเกย์ตระกรในภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) โดยระยะแรกคือตั้งแต่แรกเริ่มทำลายถึงระยะใบเหลืองใช้เวลาเฉลี่ย 63.8 วัน เมื่อพิจารณารายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง ระยะนี้ ตรัง และสตูล โดยระยะแรกคือตั้งแต่แรกเริ่มทำลายถึงระยะใบเหลือง ใช้เวลาเฉลี่ย 64.9, 60.2, 73.2 และ 53.9 วัน ตามลำดับ เกย์ตระกรในจังหวัดระนอง ระยะนี้ และตรัง มีจำนวนวันอยู่ในช่วง 31 – 60 วัน หากที่สุดส่วนเกย์ตระกรในจังหวัดสตูล มีจำนวนวันวันอยู่ในช่วง ไม่เกิน 30 วัน หากที่สุด

ระยะเวลาหรือจำนวนวันที่ใบเหลืองจนถึงใบร่วงด้านตาย ในภาพรวมของเกย์ตระกรในภาคใต้ฝั่งตะวันตก ใช้เวลาเฉลี่ย 76.6 วัน สำหรับรายจังหวัดใช้เวลาเฉลี่ย 80.8, 79.1, 85.1 และ 49.5 วัน จำนวนวันแตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด กล่าวคือ เกย์ตระกรในจังหวัดระนอง มีจำนวนวันอยู่ในช่วง 31 – 60 วัน หากที่สุด เกย์ตระกรในจังหวัดยะลา มีจำนวนวันอยู่ในช่วง 16 - 30 วัน หากที่สุด เกย์ตระกรในจังหวัดตรัง มีจำนวนวันอยู่ในช่วง ตั้งแต่ 91 ขึ้นไป หากที่สุด ส่วนเกย์ตระกรในจังหวัดสตูล มีจำนวนวันอยู่ในช่วง ไม่เกิน 15 วัน หากที่สุด

ระยะเวลาหรือจำนวนวันที่ใบร่วงจนถึงโคลนล้ม ในภาพรวมของเกย์ตระกรในภาคใต้ฝั่งตะวันตก ใช้เวลาเฉลี่ย 127.6 วัน สำหรับรายจังหวัดใช้เวลาเฉลี่ย 125.8, 129.2, 153.3 และ 84.4 วัน จำนวนวันอยู่ในช่วงตั้งแต่ 91 ขึ้นไป หากที่สุด เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงดังกล่าวเกย์ตระกรในแต่ละจังหวัดกว่าครึ่งหนึ่ง ไม่ได้สังเกตหรือประมาณระยะเวลาดังกล่าวได้

สำหรับช่วงฤดูกาลที่มีการระบาดของโรครุนแรงนี้ ภาพรวมของเกย์ตระกรในภาคใต้ฝั่งตะวันตก และเกย์ตระกรในแต่ละจังหวัดเห็นว่าช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรครากขาวรุนแรง หากวันนี้จังหวัดระนอง ที่เห็นว่าการระบาดของโรครากขาวเกิดรุนแรงในช่วงฤดูร้อน

4.5 การจัดการโรคภัยไข้เจ็บ

4.5.1 การจัดการกับโรคภัยไข้เจ็บของครูผู้ป่วยทางพาราในพื้นที่ศึกษา

เกย์ตระกรในภาพรวมของพื้นที่ศึกษามีการจัดการกับโรคภัยไข้เจ็บ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.40

ตารางที่ 4.40 การจัดการโรคภัยไข้เจ็บของครูผู้ป่วยทางพาราในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา

รายการ	จำนวน (n=263)	ร้อยละ
การจัดการเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ		
ไม่มีการแก้ไข	191	72.6
มี	72	27.4
เหตุผลที่ไม่มีการแก้ไข*	(n=191)	
ไม่รู้วิธี	116	60.7
เพราะไม่มียารักษาป้องกัน	55	28.8
ตัดไม่ขาด	11	5.8
ไม่รู้สาเหตุของโรค	10	5.2
ลงทุนไม่ไหว	1	0.5
ทำไม่ไหว	1	0.5
วิธีการจัดการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ*	(n=72)	
การใช้สารเคมี	59	81.9
ใช้วิธีเขตกรรม	23	31.9

หมายเหตุ: * สามารถตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

การจัดการโรคภัยไข้เจ็บของครูผู้ป่วยทางพาราในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา ดังตารางที่ 4.40 มีรายละเอียดของการจัดการ ดังนี้

เกย์ตระกรผู้ป่วยทางพาราในภาพรวมของพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดการเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคภัยไข้เจ็บ ร้อยละ 72.6 ทั้งนี้ได้ให้เหตุผลที่ยังไม่มีการแก้ไข เป็นเพราะไม่รู้วิธีการแก้ไขปัญหาเป็นอันดับแรก ร้อยละ 60.7 รองลงมาเห็นว่ายังไม่มียา.rักษาป้องกัน ร้อยละ 28.8 นอกจากนี้ให้เหตุผลว่า ไม่รู้สาเหตุของโรค ทำไม่ไหว และการลงทุนที่มากจนเกินไป สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหา มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ได้มีการจัดการเพื่อป้องกันและ

แก้ปัญหาโรค rak�າວ ร้อยละ 27.4 โดยวิธีการจัดการเพื่อป้องกันหรือแก้ปัญหาโรค rak�າວนั้นส่วนใหญ่ใช้สารเคมี ร้อยละ 81.9 และใช้วิธีเขตกรรมเป็นบางส่วน ร้อยละ 31.9

4.5.2 การจัดการโรค rak�າວของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)

เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) มีการจัดการกับโรค rak�າວ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.41

ตารางที่ 4.41 การจัดการโรค rak�າວของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)

ประเด็น	ชุมพร		สุราษฎร์ธานี		นครศรีธรรมราช		สงขลา		รวม	
	จำนวน (n=30)	ร้อย ละ	จำนวน (n=29)	ร้อย ละ	จำนวน (n=45)	ร้อย ละ	จำนวน (n=26)	ร้อย ละ	จำนวน (n=130)	ร้อย ละ
การจัดการเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาโรค rak�າວ										
ไม่มีการแก้ไข	18	60.0	17	58.6	27	60.0	18	69.2	80	61.5
มี	12	40.0	12	41.4	18	40.0	8	30.8	50	38.5
เหตุผลที่ไม่มีการแก้ไข*	(n=18)		(n=17)		(n=27)		(n=18)		(n=80)	
เพราะไม่มียารักษาป้องกัน	11	61.1	8	47.1	4	14.8	7	38.9	30	37.5
ไม่รู้วิธี	6	33.3	9	52.9	23	85.2	11	61.1	49	61.3
ตัดไม้ขาก	2	11.1	-	-	-	-	-	-	2	2.5
ทำไม้ไห	-	-	-	-	1	3.7	-	-	1	1.3
ไม่รู้สาเหตุของโรค	-	-	-	-	-	-	1	5.6	1	1.3
วิธีการจัดการเพื่อป้องกันหรือแก้ปัญหาโรค rak�າວ*	(n=12)		(n=12)		(n=18)		(n=8)		(n=50)	
การใช้สารเคมี	10	83.3	8	66.7	14	77.8	8	100.0	40	80.0
ใช้วิธีเขตกรรม	5	41.7	4	33.3	8	44.4	1	12.1	18	36.0

หมายเหตุ: * สามารถตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

จากตารางที่ 4.41 เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) ภาพรวมและรายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลาเกินกว่าครึ่งขัง ไม่มีการ

จัดการเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคภัยไข้ดันร้ายแรง คิดเป็นร้อยละ 61.5, 60.0, 58.6, 60.0 และ 69.2 ตามลำดับ ทั้งนี้ได้ให้เหตุผลเหมือนกันสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา คือ ไม่รู้วิธีการแก้ไขปัญหา มากที่สุด ร้อยละ 52.9, 85.2 และ 61.1 ส่วนเกยตระกรในจังหวัดชุมพรเห็นว่าบังไม่มีภารกิจป้องกัน มากที่สุด ร้อยละ 61.1

สำหรับเกยตระกรที่ได้มีการจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคภัยไข้ดันร้ายแรง ใช้วิธีการจัดการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาโรคภัยไข้ดันร้ายแรงด้วยสารเคมี

4.5.3 การจัดการโรคภัยไข้ดันร้ายแรงของผู้ป่วยพาราfineที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)

เกยตระกรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) มีการจัดการกับโรคภัยไข้ดันร้ายแรง ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.42

ตารางที่ 4.42 การจัดการ โรคภัยไข้ดันร้ายแรงของผู้ป่วยพาราfineในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)

ประเด็น	ระนอง		กระบี่		ตรัง		สตูล		รวม	
	จำนวน (n=50)	ร้อย ละ	จำนวน (n=30)	ร้อย ละ	จำนวน (n=29)	ร้อย ละ	จำนวน (n=24)	ร้อย ละ	จำนวน (n=133)	ร้อย ละ
การจัดการเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหารอยโรคภัยไข้ดันร้ายแรง										
ไม่มีการแก้ไข	42	84.0	24	80.0	25	86.2	20	83.3	111	83.5
มี	8	16.0	6	20.0	4	13.8	4	16.7	22	16.5
เหตุผลที่ไม่มีการแก้ไข*	(n=42)		(n=24)		(n=25)		(n=20)		(n=111)	
ไม่รู้วิธี	24	57.1	11	45.8	19	76.0	13	65.0	67	60.4
เพราะไม่มีภารกิจป้องกัน	-	-	13	54.2	6	24.0	6	30.0	25	22.5
ตัดไม้ขาย	9	21.4	-	-	-	-	-	-	9	8.1
ไม่รู้สาเหตุของโรค	9	21.4	-	-	-	-	-	-	9	8.1
ลงทุนไม่ไหว	-	-	-	-	-	-	1	5.0	1	0.9
วิธีการจัดการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหารอยโรคภัยไข้ดันร้ายแรง*	(n=8)		(n=4)		(n=4)		(n=4)		(n=22)	
การใช้สารเคมี	8	100.0	4	66.7	3	75.0	4	100.0	19	86.4
ใช้เวทกรรม	1	12.5	2	33.3	1	25.0	1	25.0	5	22.7

หมายเหตุ: * สามารถตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

จากตารางที่ 4.42 เกณฑ์รกรผู้ป่วยพาราในพื้นที่ภาคใต้ฟังค์วันออก (อันดามัน) ภาพรวม และรายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง ระดับ ตรัง และสตูล ส่วนใหญ่ไม่มีการจัดการเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาโรคภัยช้า คิดเป็นร้อยละ 83.5, 84.0, 80.0, 86.2 และ 83.3 ตามลำดับ ทั้งนี้ได้ให้เหตุผลเหมือนกันสำหรับจังหวัดระนอง ตรัง และสตูล คือ ไม่รู้วิธีการแก้ไขปัญหา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.1, 76.0 และ 65.0 ตามลำดับ ส่วนเกณฑ์รกรในจังหวัดระดับที่เห็นว่าซึ่งไม่มีการรักษาป้องกันมากที่สุด ร้อยละ 54.2

สำหรับเกณฑ์รกรที่ได้มีการจัดการเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาโรคภัยช้า ส่วนใหญ่ใช้วิธีการจัดการเพื่อป้องกันหรือแก้ปัญหาโรคภัยช้าด้วยสารเคมี

4.6 ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่มีผลต่อการเกิดโรคและความรุนแรงของการเกิดโรค

การเข้าทำลายของเชื้อร้ายที่ก่อให้เกิดโรคภัยช้านั้นเกิดขึ้นได้ดังแต่ต้นยางอายุยังน้อย 1 ปี เป็นต้นไป (เสมอใจ ชั้นจิตต์, มปป.) โดยจะเข้าทำลายทั้งในยางที่สภาพการปลูกในพื้นที่เป็นครั้งแรก (ยางเปิดใหม่ หรือยางรุนแรง) และ ยางที่ปลูกในรุนที่ 2 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ว่า ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ เช่น ดิน โครงสร้างของดิน พื้นที่ราก ที่ลุ่มหรือพื้นที่ไหล่เขา ตลอดลักษณะทางภูมิอากาศ ภาวะฝนตกและฤดูกาล และพื้นที่ปลูกยางในจังหวัดต่างๆ คาดว่าจะมีผลต่อการเกิดโรคและความรุนแรงของการเกิดโรคได้เช่นกัน ซึ่งสามารถนำเสนอผลวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่มีผลต่อการเกิดโรคและความรุนแรงของการเกิดโรค ได้ดังนี้

4.6.1 ความสัมพันธ์ของลักษณะดินของพื้นที่ที่มีผลต่อการเกิดโรคและความรุนแรงของการเกิดโรค

จากการคาดการณ์ที่ว่าปัจจัยด้านลักษณะดินน่าจะส่งผลต่อการเกิดโรคและความรุนแรงของการเกิดโรคนั้น ในการศึกษารังนี้ พบว่า ลักษณะดินในสวนยางพารามี 4 ลักษณะ คือ ดินร่วนดินทราย ดินเหนียว และดินลูกรัง ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีผลต่อความรุนแรงของการเกิดโรค ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.43

ตารางที่ 4.43 ความสัมพันธ์ของลักษณะดินในส่วนย่างพาราที่มีผลต่อการเกิดโรคและความรุนแรงของการเกิดโรคراكษา

หน่วย: จำนวน (ร้อยละ)

ลักษณะดิน	ระดับการระบาด			
	รุนแรง	ปานกลาง	ไม่รุนแรง	รวม
ร่วน	114(71.3)	32(20.0)	14(8.8)	160(100.0)
ทราย	39(68.4)	11(19.3)	7(12.3)	57(100.0)
เหนียว	64(69.6)	12(13.0)	16(17.4)	92(100.0)
ลูกรัง	39(55.7)	17(24.3)	14(20.0)	70(100.0)

$$\chi^2=10.651, \infty < 0.10$$

จากตารางที่ 4.43 พบว่า ลักษณะดินในส่วนย่างพาราของเกษตรกรรมมีความสัมพันธ์หรือมีผลต่อการเกิดโรคและความรุนแรงของการเกิดโรค อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 ($\chi^2=10.651, \infty < 0.10$) โดยจะเห็นได้ว่า ส่วนย่างพาราที่มีลักษณะดินร่วน จะมีสัดส่วนของระดับความรุนแรงแตกต่างจากดินลักษณะอื่นๆ โดยเฉพาะดินลูกรังและดินทรายที่มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด

4.6.2 ความสัมพันธ์ของอายุย่างที่มีผลต่อการเกิดโรคและความรุนแรงของการเกิดโรค

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอายุย่างที่คาดว่าจะส่งผลต่อการเกิดโรคและความรุนแรงของการเกิดโรคนั้น ดังแสดงในตารางที่ 4.44

ตารางที่ 4.44 ความสัมพันธ์ของอายุย่างของเกษตรกรในพื้นที่ศึกษาที่มีผลต่อการเกิดโรคและความรุนแรงของการเกิดโรค

หน่วย: จำนวน (ร้อยละ)

อายุย่าง (ปี)	ระดับการระบาด			
	รุนแรง	ปานกลาง	ไม่รุนแรง	รวม
1 - 6	82(70.1)	16(13.7)	19(16.2)	117(100.0)
7 – 10	27(64.3)	9(21.4)	6(14.3)	42(100.0)
11 - 15	48(67.6)	19(26.8)	4(5.6)	71(100.0)
16 – 20	44(61.1)	17(23.6)	11(15.3)	72(100.0)
> 20	55(71.4)	11(14.3)	11(14.3)	77(100.0)

$$\chi^2=10.766, \infty > 0.10$$

จากตารางที่ 4.44 พบว่า อายุย่างของเกย์ตระกรในพื้นที่ศึกษาไม่มีความสัมพันธ์หรือมีผลต่อการเกิดโรคและความรุนแรงของการเกิดโรคراكขาวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($\chi^2=10.766, \infty > 0.10$) โดยจะเห็นได้ว่า ยังพาราในแต่ละช่วงอายุมีสัดส่วนของแต่ละระดับความรุนแรงเท่าเทียมกันในทุกช่วงอายุ กล่าวคือ การระบาดของโรคที่รุนแรงหรือไม่นั้น สามารถเกิดขึ้นได้กับยังพาราในทุกช่วงอายุ

4.6.3 ความสัมพันธ์ของรอบการผลิตยังพาราที่มีผลต่อการเกิดโรคและความรุนแรงของการเกิดโรค

การพิจารณารอบการผลิตยังพาราของเกย์ตระกรในพื้นที่ศึกษาที่มีผลต่อการเกิดโรคและความรุนแรงของการเกิดโรคหรือไม่นั้น ดังแสดงในตารางที่ 4.45

ตารางที่ 4.45 ความสัมพันธ์ของรอบการผลิตยังพาราของเกย์ตระกรในพื้นที่ศึกษาที่มีผลต่อการเกิดโรคและความรุนแรงของการเกิดโรค

หน่วย: จำนวน (ร้อยละ)

รอบการผลิต	ระดับการระบาด		
	รุนแรง	ปานกลาง/ไม่รุนแรง	รวม
รอบแรก	96(61.5)	60(38.5)	156(100.0)
รอบที่สอง	160(71.7)	63(28.3)	223(100.0)

$$\chi^2=4.365, \infty < 0.05$$

จากตารางที่ 4.45 พบว่า รอบการผลิตยังพาราของเกย์ตระกรในภาพรวมของพื้นที่ศึกษามีความสัมพันธ์หรือมีผลต่อการเกิดโรคและความรุนแรงของการเกิดโรคراكขาวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ($\chi^2=4.365, \infty < 0.05$) กล่าวคือ ยังพาราที่ผลิตในรอบการผลิตที่สองจะมีสัดส่วนของระดับการระบาดที่รุนแรงแตกต่างจากการผลิตในรอบแรกอย่างเห็นได้ชัด

4.7 ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคراكขาวในยังพารา ในพื้นที่ศึกษา

ในการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคراكขาวในยังพารา ทำการวิเคราะห์โดยใช้ฟังก์ชันการเข้าทำลาย เพื่อประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ ได้ดังนี้

4.7.1 ฟังก์ชันการเข้าทำลาย (Damage function)

โดยปกติแล้วการเข้าทำลายของโรคพืชจะเกี่ยวพันกับปัจจัยทางด้านสิริวิทยาของพืช สภาพแวดล้อมของพืช และปัจจัยอื่นๆ อีกมาก (เสมอใจ ชั่นจิตต์, มปป.) ในการศึกษารั้งนี้ได้สร้าง

แบบจำลอง หรือ พิมพ์ชั้นการทำลายของโรค rak�າในภาคใต้ของประเทศไทย โดยกำหนดตัวแปรตาม เป็นจำนวนต้นที่ถูกทำลายเท่าริงต่อไร่ ที่คำนวณจาก จำนวนต้นที่สังเกตเห็นการเข้าทำลายในแปลง คุณด้วย ความรุนแรงของการทำลาย หารด้วยจำนวนไร่ ซึ่งตัวแปรตามนี้ถูกกำหนดด้วยตัวแปรอิสระ ได้แก่ อายุของยางเป็นปีที่สังเกตเห็นการเข้าทำลาย รอบของการปลูก และจังหวัดที่ศึกษา ดังรายละเอียดที่ได้แสดงในบทที่ 3

พิมพ์ชั้นการทำลายในการวิจัยครั้งนี้ กำหนดให้เป็นรูปแบบจำลองเชิงเดียว (single equation) และ พฤติกรรมของข้อมูลกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ โดยใช้การทดสอบแบบ แออด (t-statistics) เป็นค่าที่ใช้ตัดสินใจระหว่างรูปแบบเส้นตรงหรือแบบลีอค-ลีอค (Nissapa, 1995) ซึ่งพบว่ารูปแบบลีอค-ลีอคให้ค่าประมาณการและค่าสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ได้มีการทดสอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับค่าความคลาดเคลื่อน ได้แก่ ปัญหาความคลาดเคลื่อนไม่คงที่ (heteroscedasticity) ด้วยวิธีการของไวท์ (White's heteroscedasticity) พนว่าไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นในแบบจำลอง และปัญหาสหสัมพันธ์อัตโนมัติ (autocorrelation หรือ serial correlation) ด้วยค่าสถิติเดอร์บิน-วัตสัน (Durbin-Watson statistics) พนว่ามีปัญหาสหสัมพันธ์อัตโนมัติลำดับที่ 1 จึงแก้ปัญหาด้วยวิธีการใช้ AR(1) หรือ First-order auto regressive model

จากตารางที่ 4.46 แสดงผลการวิเคราะห์พิมพ์ชั้นการทำลายของเรื่องราโรค rak�າในยาง ค่าประมาณการสัมประสิทธิ์ที่เป็นค่าคงที่ นั้นแสดงให้เห็นถึงจำนวนต้นยาง ประมาณ 1.68 ต้นต่อไร่ที่ถูกทำลายตามธรรมชาติ (จำนวนต้นยางที่ถูกทำลาย = $e^{0.52} = 1.68$) ตั้งแต่เริ่มปลูกจนอายุ 1 ปี โดยเป็นการปลูกยางรุนแรงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่ใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์ครั้งนี้

ค่าประมาณการสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระลีอคของอายุยางแสดงให้เห็นถึงอัตราการเข้าทำลายในรูปของ นั่นคือ ถ้าอายุยางเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางอายุเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 เมื่อกำหนดให้ตัวแปรอื่นๆ ในแบบจำลองมีค่าคงที่แล้ว จำนวนต้นที่ถูกทำลายจะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.21 ซึ่งเป็นอัตราที่คงที่ของห้องภาครได้ ไม่แปรผันตามรุนแรงของการปลูกยางและพื้นที่ในแต่ละจังหวัด

ตัวแปรหุ่นที่แสดงถึงรุนแรงของการปลูกยางนั้นซึ่งให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การปลูกยางในรุนที่ 2 เป็นต้นไปในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น จะทำให้การเข้าทำลายตามธรรมชาติ เพิ่มขึ้นจาก 1.68 ต้นต่อไร่ เป็น $e^{0.52+0.29} = 2.25$ ต้นต่อไร่

ตัวแปรหุ่นแสดงจังหวัดอื่นๆ อีก 7 จังหวัดที่ศึกษานั้น จังหวัดรอง สตูล และ ชุมพร มีจำนวนต้นยางที่ถูกทำลายตามธรรมชาติไม่ต่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนจังหวัดอื่นๆ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช และ สงขลา มีจำนวนต้นยางที่ถูกทำลายตามธรรมชาติต่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีจำนวนต้นที่ถูกทำลายสูงกว่า ดังนี้

- 1) จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนต้นยางที่ถูกทำลายตามธรรมชาติ = $e^{0.52+1.98} = 12.20$ ต้นต่อไร่

- 2) จังหวัดครัง จำนวนต้นยางที่ถูกทำลายตามธรรมชาติ = $e^{0.52+1.20} = 5.60$ ต้นต่อไร่
 3) จังหวัดกระปี้ จำนวนต้นยางที่ถูกทำลายตามธรรมชาติ = $e^{0.52+0.88} = 4.06$ ต้นต่อไร่
 4) จังหวัดสงขลา จำนวนต้นยางที่ถูกทำลายตามธรรมชาติ = $e^{0.52+0.87} = 4.02$ ต้นต่อไร่

จากแบบจำลองฟังก์ชันการเข้าทำลาย จะเห็นได้ว่า การเข้าทำลายในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวนต้นที่ถูกทำลายสูงกว่าจังหวัดอื่นๆ ที่ทำการศึกษามาก และจังหวัดที่มีการเข้าทำลายน้อยที่สุด คือ จังหวัดระนอง

คุณสมบัติทางสถิติของแบบจำลองฟังก์ชันการเข้าทำลายของเชื้อรากขาวในยาง พบว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมดที่ใส่ในแบบจำลองนี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของจำนวนต้นยางที่ถูกทำลายต่อไร่ได้ประมาณ ร้อยละ 29 ส่วนอีกร้อยละ 71 นั้นเป็นตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้นำเข้ามา ซึ่งอาจจะ เป็นตัวแปรทางกายภาพ ชีวภาพ และการจัดการสวน ของเกษตรกร ส่วนค่าสถิติเอฟ (F-statistics) นั้น แสดงว่าความมีนัยสำคัญทางสถิติของแบบจำลองที่สามารถนำไปใช้ในการทำนายตัวแปรตาม และค่าสถิติเดอร์บิน-วัตสัน แสดงให้เห็นว่าปัญหาสหสมพันธ์เชิงอัตโนมัตินี้ได้รับการแก้ไขแล้ว

ตารางที่ 4.46 ฟังก์ชันการเข้าทำลายของเชื้อรากขาวในยางพาราในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย

โดยลือของจำนวนต้นที่ถูกทำลายจริงเป็นตัวแปรตาม

ตัวแปร	ค่าประมาณการสัมประสิทธิ์	p-value
ค่าคงที่	0.52*	0.07
ลักษณะของอายุยาง (ปี)	0.21**	0.03
รุ่นของการปลูก	0.29*	0.07
จังหวัดกระปี้	0.88**	0.02
จังหวัดระนอง	-0.28 ^{ns}	0.41
จังหวัดครัง	1.20***	0.00
จังหวัดสตูล	0.14 ^{ns}	0.74
จังหวัดนครศรีธรรมราช	1.98***	0.00
จังหวัดสงขลา	0.87**	0.02
จังหวัดชุมพร	0.35 ^{ns}	0.36
R ²	0.29	
Adjusted R ²	0.27	
F-statistic	15.03***	0.00
Durbin-Watson statistic	2.06	
N	378	

หมายเหตุ: ^{ns} หมายถึง ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ * หมายถึง แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ $p < 0.10$

** หมายถึง แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ $p < 0.05$ *** หมายถึง แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ $p < 0.01$

จากฟังก์ชันการเข้าทำลาย (ดังแสดงในตารางที่ 4.46) สามารถนำมาใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยหายนทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคราขาวในยางพาราในแต่ละจังหวัดที่ทำการศึกษา และจำแนกตามรูปแบบการผลิตยางพารา ต่อไป

4.7.2 การประเมินความเสี่ยหายนทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคราขาวในยางพารา จังหวัดชุมพร (กรณีการผลิตในรูปแบบน้ำยางสด)

ผลการประเมินความเสี่ยหายนทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคราขาวในยางพาราของ จังหวัดชุมพร (กรณีการผลิตในรูปแบบน้ำยางสด) นั้น ได้สรุปร่วมและ ดังแสดงในตารางที่ 4.47 พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกโรคราขาวทำลายในรอบ 25 ปี ของเกษตรกรจังหวัดชุมพร ใน กรณีการผลิตรูปแบบน้ำยางสด มีค่าเท่ากับ 959,784.23 บาทต่อไร่ และเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ ละปีต่อไร่ พบว่า ในช่วงอายุยางปีแรกๆ มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าต่ำกว่ายางพาราอายุมาก โดยในปี แรกมีมูลค่าเท่ากับ 905,569.45 บาทต่อไร่ ในขณะที่ยางอายุ 25 ปี มีมูลค่าเท่ากับ 957,438.47 บาทต่อ ไร่ ทำให้ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายเฉลี่ยใน 25 ปีกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางใน แต่ละปี มีค่าที่ตรงข้ามกัน กล่าวคือ ในปีแรกนั้นมูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลต่างจะมีมาก ค่อยๆ น้อยลงในปีต่อมา และมีมูลค่าน้อยที่สุดในปีสุดท้ายหรือปีที่ 25 ซึ่งผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีที่ 25 มีค่าเท่ากับ 2,345.76 บาทต่อไร่ ในขณะที่ ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีแรกเท่ากับ 54,214.78 บาทต่อไร่

ตารางที่ 4.47 ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิต่อไร่เมื่อไม่ถูกทำลายและเมื่อถูกทำลายในอายุยังแต่ละปีของครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดชุมพร (กรณีการผลิตในรูปแบบน้ำยางสด)

รายการ		อายุยางที่สังเกตเห็นการถูกทำลาย (ปี)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายเฉลยในรอบ 25 ปี	959,784.23												
2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูกทำลายในอายุต่ำกว่าปีต่อต่อ 25 ปี ¹		905,569.45	907,323.39	909,190.66	911,127.57	913,115.48	915,143.86	917,205.92	919,296.89	921,413.23	923,552.21	925,711.64	927,889.74
3. ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับมูลค่าปัจจุบันสุทธิในอายุต่ำกว่าปี ²		54,214.78	52,460.84	50,593.58	48,656.66	46,668.75	44,640.37	42,578.32	40,487.34	38,371.00	36,232.02	34,072.59	31,894.49

หมายเหตุ : ¹ การคำนวณอยู่ในภาคผนวก ข

² คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายเฉลยในรอบ 25 ปี ลบด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูกทำลายในอายุต่ำกว่าปีต่อต่อ 25 ปี เช่น 959,784.23 - 905,569.45 = 54,214.78

ตารางที่ 4.47 (ต่อ)

รายการ	อายุยางที่สังเกตเห็นการถูกทำลาย (ปี)												
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายเฉลยในรอบ 25 ปี													
2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูกทำลายในอายุต่ำกว่าปีต่อต่อ 25 ปี ¹	930,085.03	932,296.24	934,522.31	936,762.29	939,015.37	941,280.82	943,557.99	945,846.32	948,145.27	950,454.37	952,773.20	955,101.35	957,438.47
3. ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับมูลค่าปัจจุบันสุทธิในอายุต่ำกว่าปี ²	29,699.20	27,487.99	25,261.92	23,021.94	20,768.86	18,503.41	16,226.24	13,937.91	11,638.96	9,329.86	7,011.03	4,682.88	2,345.76

หมายเหตุ : ¹ การคำนวณอยู่ในภาคผนวก ข

² คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายเฉลยในรอบ 25 ปี ลบด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูกทำลายในอายุต่ำกว่าปีต่อต่อ 25 ปี เช่น 959,784.23 - 905,569.45 = 54,214.78

4.7.3 การประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กรณีการผลิตในรูปแบบแผ่นดิน)

ประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพาราของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กรณีการผลิตในรูปแบบแผ่นดิน) ดังแสดงในตารางที่ 4.48 พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เมื่อไม่ถูกโรครากรขาวทำลายในรอบ 25 ปี ของเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในรูปแบบยางแผ่นดิน มีค่าเท่ากับ 1,493,050.76 บาทต่อไร่ และเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ละปี พบว่า ในช่วงอายุยางปีแรกๆ มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าต่ำกว่ายางพาราอายุมาก โดยในปีแรกมีมูลค่าเท่ากับ 1,433,854.49 บาทต่อไร่ ในขณะที่ยางอายุ 25 ปี มีมูลค่าเท่ากับ 1,490,489.47 บาทต่อไร่ ทำให้ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายเฉลี่ยใน 25 ปีกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในแต่ละปี มีค่าที่ตรงข้ามกัน กล่าวคือ ในปีแรกนั้นมูลค่าของผลต่างจะมีมาก ค่อยๆ น้อยลงในปีถัดมา และมีมูลค่าน้อยที่สุดในปีสุดท้ายหรือปีที่ 25 ซึ่งผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีแรกเท่ากับ 2,561.29 บาทต่อไร่ ในขณะที่ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีแรกเท่ากับ 59,196.27 บาทต่อไร่

4.7.4 การประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1) การประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวใน ยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราช (กรณีการผลิตในรูปแบบแผ่นดิน)

ประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพาราของจังหวัดนครศรีธรรมราช (กรณีการผลิตในรูปแบบแผ่นดิน) ดังแสดงในตารางที่ 4.49 พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายในรอบ 25 ปี ของเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ในรูปแบบยางแผ่นดิน มีค่าเท่ากับ 979,321.23 บาทต่อไร่ และเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ละปี พบว่า ในช่วงอายุยางปีแรกๆ มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าต่ำกว่ายางพาราอายุมาก โดยในปีแรกมีมูลค่าเท่ากับ 697,594.94 บาทต่อไร่ ในขณะที่ยางอายุ 25 ปี มีมูลค่าเท่ากับ 967,131.55 บาทต่อไร่ ทำให้ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายเฉลี่ยใน 25 ปีกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในแต่ละปี มีค่าที่ตรงข้ามกัน กล่าวคือ ในปีแรกนั้นมูลค่าของผลต่างจะมีมาก ค่อยๆ น้อยลงในปีถัดมา และมีมูลค่าน้อยที่สุดในปีสุดท้ายหรือปีที่ 25 ซึ่งผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีที่ 25 เท่ากับ 12,189.68 บาทต่อไร่ ในขณะที่ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีแรกเท่ากับ 281,726.29 บาทต่อไร่

ตารางที่ 4.48 ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิต่อไร่เมื่อไม่ถูกทำลายและเมื่อยกทำลายในอายุยังแต่ละปีของครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กรณีการผลิตยางแผ่นดิน)

รายการ		อายุของที่สังเกตเห็นการถูกทำลาย (ปี)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลาย เฉลี่ยในรอบ 25 ปี	1,493,050.76												
2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูก ทำลายในอายุแต่ละปีตลอด 25 ปี ¹		1,433,854.49	1,435,769.59	1,437,808.43	1,439,923.32	1,442,093.88	1,444,308.63	1,446,560.16	1,448,843.26	1,451,154.06	1,453,489.58	1,455,847.43	1,458,225.67
3. ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อ ไม่ถูกทำลายกับเมื่อยางถูกทำลายใน อายุแต่ละปี ²		59,196.27	57,281.17	55,242.34	53,127.45	50,956.88	48,742.13	46,490.60	44,207.50	41,896.70	39,561.18	37,203.33	34,825.10

หมายเหตุ : ¹ การคำนวณอยู่ในภาคผนวก ข

² คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายเฉลี่ยในรอบ 25 ปี ลบด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูกทำลายในอายุแต่ละปีตลอด 25 ปี

ตารางที่ 4.48 (ต่อ)

รายการ	อายุของที่สังเกตเห็นการถูกทำลาย (ปี)												
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลาย เฉลี่ยในรอบ 25 ปี													
2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูก ทำลายในอายุแต่ละปีตลอด 25 ปี ¹	1,460,622.66	1,463,037.06	1,465,467.66	1,467,913.47	1,470,373.57	1,472,847.17	1,475,333.59	1,477,832.17	1,480,342.36	1,482,863.63	1,485,395.52	1,487,937.60	1,490,489.47
3. ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อ ไม่ถูกทำลายกับเมื่อยางถูกทำลายใน อายุแต่ละปี ²	32,428.10	30,013.71	27,583.10	25,137.30	22,677.20	20,203.59	17,717.18	15,218.59	12,708.40	10,187.13	7,655.24	5,113.16	2,561.29

หมายเหตุ : ¹ การคำนวณอยู่ในภาคผนวก ข

² คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายเฉลี่ยในรอบ 25 ปี ลบด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูกทำลายในอายุแต่ละปีตลอด 25 ปี

ตารางที่ 4.49 ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิต่อไร่เมื่อไม่ถูกทำลายและเมื่อถูกทำลายในอายุยังแต่ละปีของครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดนนทรีธรรมราช (กรณีการผลิตยางแผ่นดิน)

รายการ		อายุยางที่สังเกตเห็นการถูกทำลาย (ปี)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลาย เฉลี่ยในรอบ 25 ปี	979,321.23												
2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูก ทำลายในอายุแต่ละปีตลอด 25 ปี ¹		697,594.94	706,709.28	716,412.48	726,477.64	736,807.76	747,348.21	758,063.66	768,929.36	779,926.90	791,042.07	802,263.52	813,581.99
3. ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อ ไม่ถูกทำลายกับเมื่อยางถูกทำลายใน อายุแต่ละปี ²		281,726.29	272,611.96	262,908.75	252,843.59	242,513.47	231,973.03	221,257.57	210,391.87	199,394.33	188,279.16	177,057.71	165,739.24

หมายเหตุ : ¹ การคำนวณอยู่ในภาคผนวก ข

² คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายเฉลี่ยในรอบ 25 ปี ลบด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูกทำลายในอายุแต่ละปีตลอด 25 ปี

ตารางที่ 4.49 (ต่อ)

รายการ	อายุยางที่สังเกตเห็นการถูกทำลาย (ปี)												
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลาย เฉลี่ยในรอบ 25 ปี													
2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูก ทำลายในอายุแต่ละปีตลอด 25 ปี ¹	824,989.77	836,480.32	848,048.04	859,688.07	871,396.16	883,168.53	895,001.84	906,893.08	918,839.53	930,838.76	942,888.50	954,986.73	967,131.55
3. ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อ ไม่ถูกทำลายกับเมื่อยางถูกทำลายใน อายุแต่ละปี ²	154,331.47	142,840.92	131,273.20	119,633.16	107,925.08	96,152.70	84,319.40	72,428.16	60,481.70	48,482.48	36,432.73	24,334.51	12,189.68

หมายเหตุ : ¹ การคำนวณอยู่ในภาคผนวก ข

² คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายเฉลี่ยในรอบ 25 ปี ลบด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูกทำลายในอายุแต่ละปีตลอด 25 ปี

**2) การประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพารา
จังหวัดนครศรีธรรมราช (กรณีการผลิตในรูปแบบน้ำยางสด)**

ประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพาราของจังหวัดนครศรีธรรมราช (กรณีการผลิตในรูปแบบน้ำยางสด) ดังแสดงในตารางที่ 4.50 พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายในรอบ 25 ปี ของเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ในรูปแบบน้ำยางสด มีค่าเท่ากับ 1,664,827.18 บาทต่อไร่ และเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ละปี พบว่า ในช่วงอายุยางปีแรกๆ มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าต่ำกว่ายางพาราอยุ่มาก โดยในปีแรกมีมูลค่าเท่ากับ 1,185,897.93 บาทต่อไร่ ในขณะที่ยางอายุ 25 ปี มีมูลค่าเท่ากับ 1,644,104.96 บาทต่อไร่ ทำให้ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายเฉลี่ยใน 25 ปีกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในแต่ละปี มีค่าที่ตรงข้ามกันกล่าวคือ ในปีแรกนั้นมูลค่าของผลต่างจะมีมาก ค่อยๆ น้อยลงในปีถัดมา และมีมูลค่าน้อยที่สุดในปีสุดท้ายหรือปีที่ 25 ซึ่งผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีที่ 25 เท่ากับ 20,722.23 บาทต่อไร่ ในขณะที่ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีแรกเท่ากับ 478,929.26 บาทต่อไร่

**4.7.5 การประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพารา
จังหวัดสงขลา (กรณีการผลิตในรูปแบบน้ำยางสด)**

ประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพาราของจังหวัดสงขลา (กรณีการผลิตในรูปแบบน้ำยางสด) ดังแสดงในตารางที่ 4.51 พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายในรอบ 25 ปี ของเกษตรกรจังหวัดสงขลา ซึ่งมีการผลิตในรูปแบบน้ำยางสด มีค่าเท่ากับ 1,536,860.47 บาทต่อไร่ และเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ละปี พบว่า ในช่วงอายุยางปีแรกๆ มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าต่ำกว่ายางพาราอยุ่มาก โดยในปีแรกมีมูลค่าเท่ากับ 1,391,721.92 บาทต่อไร่ ในขณะที่ยางอายุ 25 ปี มีมูลค่าเท่ากับ 1,530,580.64 บาทต่อไร่ ทำให้ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เมื่อไม่ถูกทำลายเฉลี่ยใน 25 ปีกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในแต่ละปี มีค่าที่ตรงข้ามกันกล่าวคือ ในปีแรกนั้นมูลค่าของผลต่างจะมีมาก ค่อยๆ น้อยลงในปีถัดมา และมีมูลค่าน้อยที่สุดในปีสุดท้ายหรือปีที่ 25 ซึ่งผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีที่ 25 เท่ากับ 6,279.83 บาทต่อไร่ ในขณะที่ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีแรกเท่ากับ 145,138.54 บาทต่อไร่

ตารางที่ 4.50 ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิต่อไร่เมื่อไม่ถูกทำลายและเมื่อถูกทำลายในอายุยังแต่ละปีของครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส (กรณีการผลิตน้ำยางสด)

รายการ		อายุยางที่สังเกตเห็นการถูกทำลาย (ปี)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลาย เฉลี่ยในรอบ 25 ปี	1,664,827.18												
2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูก ทำลายในอายุแต่ละปีตลอด 25 ปี ¹		1,185,897.93	1,201,392.12	1,217,887.39	1,234,997.96	1,252,558.97	1,270,477.52	1,288,693.59	1,307,165.06	1,325,860.68	1,344,756.24	1,363,832.49	1,383,073.67
3. ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อ ไม่ถูกทำลายกับเมื่อยางถูกทำลายใน อายุแต่ละปี ²		478,929.26	463,435.06	446,939.80	429,829.22	412,268.22	394,349.67	376,133.60	357,662.12	338,966.51	320,070.94	300,994.69	281,753.51

หมายเหตุ : ¹ การคำนวณอยู่ในภาคพนวก ข

² คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายแลบในรอบ 25 ปี ลบด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูกทำลายในอายุแต่ละปีตลอด 25 ปี

ตารางที่ 4.50 (ต่อ)

รายการ		อายุยางที่สังเกตเห็นการถูกทำลาย (ปี)												
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลาย เฉลี่ยในรอบ 25 ปี														
2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูก ทำลายในอายุแต่ละปี ¹	1,402,466.67	1,422,000.38	1,441,665.28	1,461,453.12	1,481,356.64	1,501,369.44	1,521,485.84	1,541,700.71	1,562,009.46	1,582,407.91	1,602,892.25	1,623,458.99	1,644,104.96	
3. ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อ ไม่ถูกทำลายกับเมื่อยางถูกทำลายใน อายุแต่ละปี ²	262,360.51	242,826.80	223,161.90	203,374.07	183,470.55	163,457.74	143,341.35	123,126.47	102,817.72	82,419.28	61,934.94	41,368.19	20,722.23	

หมายเหตุ : ¹ การคำนวณอยู่ในภาคพนวก ข

² คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายแลบในรอบ 25 ปี ลบด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูกทำลายในอายุแต่ละปีตลอด 25 ปี

ตารางที่ 4.51 ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิต่อไปเมื่อไม่ถูกทำลายและเมื่อถูกทำลายในอายุยังแต่ละปีของครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดสงขลา (กรณีการผลิตน้ำยางสด)

รายการ		อายุของที่สังเกตเห็นการถูกทำลาย (ปี)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลาย เลขในรอบ 25 ปี ¹	1,536,860.47												
2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อย่างถูกทำลายในอายุแต่ละปี ²		1,391,721.92	1,396,417.41	1,401,416.26	1,406,601.59	1,411,923.42	1,417,353.60	1,422,873.94	1,428,471.68	1,434,137.35	1,439,863.61	1,445,644.63	1,451,475.63
3. ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อย่างถูกทำลายในอายุแต่ละปี ²		145,138.54	140,443.06	135,444.20	130,258.88	124,937.05	119,506.87	113,986.53	108,388.78	102,723.12	96,996.85	91,215.83	85,384.83

หมายเหตุ : ¹ การคำนวณอยู่ในภาคผนวก ข

² คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายเลขในรอบ 25 ปี ลบด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูกทำลายในอายุแต่ละปี² ตลอด 25 ปี

ตารางที่ 4.51 (ต่อ)

รายการ		อายุของที่สังเกตเห็นการถูกทำลาย (ปี)												
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลาย เลขในรอบ 25 ปี														
2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อย่างถูกทำลายในอายุแต่ละปี ²	1,457,352.64	1,463,272.29	1,469,231.70	1,475,228.37	1,481,260.09	1,487,324.93	1,493,421.16	1,499,547.24	1,505,701.76	1,511,883.47	1,518,091.21	1,524,323.92	1,530,580.64	
3. ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อยางถูกทำลายในอายุแต่ละปี ²	79,507.82	73,588.17	67,628.76	61,632.10	55,600.38	49,535.54	43,439.30	37,313.23	31,158.70	24,976.99	18,769.26	12,536.55	6,279.83	

หมายเหตุ : ¹ การคำนวณอยู่ในภาคผนวก ข

² คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายเลขในรอบ 25 ปี ลบด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูกทำลายในอายุแต่ละปี² ตลอด 25 ปี

4.7.6 การประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพารา จังหวัดระนอง (กรณีการผลิตในรูปแบบแผ่นดิน)

ประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพาราของจังหวัดระนอง (กรณีการผลิตในรูปแบบแผ่นดิน) ดังแสดงในตารางที่ 4.52 พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายในรอบ 25 ปี ของเกษตรกรจังหวัดระนอง ซึ่งศึกษาระบบการผลิตในรูปแบบแผ่นดิน มีค่าเท่ากับ 821,014.66 บาทต่อไร่ และเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ละปี พบว่า ในช่วงอายุยางปีแรกๆ มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าต่ำกว่ายางพาราอยุ่มาก โดยในปีแรกมีมูลค่าเท่ากับ 796,412.07 บาทต่อไร่ ในขณะที่ยางอายุ 25 ปี มีมูลค่าเท่ากับ 819,950.16 บาทต่อไร่ ทำให้ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เมื่อไม่ถูกทำลายและใน 25 ปีกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในแต่ละปี มีค่าที่ตรงข้ามกัน กล่าวคือ ในปีแรกนี้มูลค่าของผลต่างจะมีมาก ค่อยๆ น้อยลงในปีถัดมา และมีมูลค่าน้อยที่สุดในปีสุดท้ายหรือปีที่ 25 ซึ่งผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีที่ 25 เท่ากับ 1,064.50 บาทต่อไร่ ในขณะที่ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีแรกเท่ากับ 24,602.59 บาทต่อไร่

4.7.7 การประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพารา จังหวัดกระนี่

1) การประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวใน ยางพารา จังหวัดกระนี่ (กรณีการผลิตในรูปแบบแผ่นดิน)

ประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพาราของจังหวัดกระนี่ (กรณีการผลิตในรูปแบบแผ่นดิน) ดังแสดงในตารางที่ 4.53 พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายในรอบ 25 ปี ของเกษตรกรจังหวัดกระนี่ ซึ่งศึกษาระบบการผลิตในรูปแบบแผ่นดิน มีค่าเท่ากับ 931,333.72 บาทต่อไร่ และเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ละปี พบว่า ในช่วงอายุยางปีแรกๆ มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าต่ำกว่ายางพาราอยุ่มาก โดยในปีแรกมีมูลค่าเท่ากับ 842,318.42 บาทต่อไร่ ในขณะที่ยางอายุ 25 ปี มีมูลค่าเท่ากับ 927,482.22 บาทต่อไร่ ทำให้ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายและใน 25 ปีกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในแต่ละปี มีค่าที่ตรงข้ามกัน กล่าวคือ ในปีแรกนี้มูลค่าของผลต่างจะมีมาก ค่อยๆ น้อยลงในปีถัดมา และมีมูลค่าน้อยที่สุดในปีสุดท้ายหรือปีที่ 25 ซึ่งผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีที่ 25 เท่ากับ 3,851.50 บาทต่อไร่ ในขณะที่ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีแรกเท่ากับ 89,015.30 บาทต่อไร่

ตารางที่ 4.52 ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิต่อไร่เมื่อไม่มีภูกทำลายและเมื่อมีภูกทำลายในอายุยังแต่ละปีของครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดระนอง (กรณีการผลิตยางแผ่นดิน)

รายการ		อายุยางที่สังเกตเห็นการภูกทำลาย (ปี)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่มีภูกทำลาย เลขในรอบ 25 ปี ¹	821,014.66												
2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูกทำลายในอายุแต่ละปี ²	796,412.07	797,208.00	798,055.37	798,934.34	799,836.44	800,756.92	801,692.68	802,641.56	803,601.95	804,572.62	805,552.56	806,540.98	
3. ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่มีภูกทำลายกับเมื่อยางถูกทำลายในอายุแต่ละปี ²	24,602.59	23,806.66	22,959.29	22,080.32	21,178.21	20,257.74	19,321.98	18,373.10	17,412.71	16,442.04	15,462.09	14,473.68	

หมายเหตุ : ¹ การคำนวณอยู่ในภาคผนวก ข

² คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่มีภูกทำลายเลขในรอบ 25 ปี ลบด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูกทำลายในอายุแต่ละปีต่อ 25 ปี

ตารางที่ 4.52 (ต่อ)

รายการ	อายุยางที่สังเกตเห็นการภูกทำลาย (ปี)												
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่มีภูกทำลาย เลขในรอบ 25 ปี													
2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูกทำลายในอายุแต่ละปี ²	807,537.20	808,540.65	809,550.83	810,567.33	811,589.78	812,617.84	813,651.22	814,689.65	815,732.91	816,780.78	817,833.06	818,889.58	819,950.16
3. ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่มีภูกทำลายกับเมื่อยางถูกทำลายในอายุแต่ละปี ²	13,477.46	12,474.01	11,463.82	10,447.32	9,424.88	8,396.82	7,363.44	6,325.01	5,281.75	4,233.88	3,181.60	2,125.08	1,064.50

หมายเหตุ : ¹ การคำนวณอยู่ในภาคผนวก ข

² คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่มีภูกทำลายเลขในรอบ 25 ปี ลบด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูกทำลายในอายุแต่ละปีต่อ 25 ปี

ตารางที่ 4.53 ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิต่อไร่เมื่อไม่มีภูกทำลายและเมื่อมีภูกทำลายในอายุยางแต่ละปีของครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดกระนี่ (กรณีการผลิตยางแผ่นดิน)

รายการ		อายุยางที่สังเกตเห็นการภูกทำลาย (ปี)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่มีภูกทำลาย เลขในรอบ 25 ปี ¹	931,333.72												
2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูกทำลายในอายุแต่ละปี ²		842,318.42	845,198.22	848,264.09	851,444.31	854,708.25	858,038.65	861,424.35	864,857.51	868,332.34	871,844.33	875,389.90	878,966.13
3. ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่มีภูกทำลายกับเมื่อยางถูกทำลายใน อายุแต่ละปี ²		89,015.30	86,135.50	83,069.63	79,889.41	76,625.47	73,295.07	69,909.37	66,476.21	63,001.38	59,489.39	55,943.82	52,367.59

หมายเหตุ : ¹ การคำนวณอยู่ในภาคผนวก ข

² คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่มีภูกทำลายเลขในรอบ 25 ปี ลบด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูกทำลายในอายุแต่ละปี² ตลอด 25 ปี

ตารางที่ 4.53 (ต่อ)

รายการ	อายุยางที่สังเกตเห็นการภูกทำลาย (ปี)												
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่มีภูกทำลาย เลขในรอบ 25 ปี													
2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูกทำลายในอายุแต่ละปี ²	882,570.57	886,201.17	889,856.15	893,533.98	897,233.31	900,952.95	904,691.85	908,449.05	912,223.70	916,015.01	919,822.30	923,644.90	927,482.22
3. ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่มีภูกทำลายกับเมื่อยางถูกทำลายใน อายุแต่ละปี ²	48,763.15	45,132.55	41,477.57	37,799.74	34,100.41	30,380.77	26,641.87	22,884.67	19,110.02	15,318.71	11,511.42	7,688.82	3,851.50

หมายเหตุ : ¹ การคำนวณอยู่ในภาคผนวก ข

² คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่มีภูกทำลายเลขในรอบ 25 ปี ลบด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูกทำลายในอายุแต่ละปี² ตลอด 25 ปี

2) การประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพารา จังหวัดกระนี่ (กรณีการผลิตในรูปเศษยาง)

ประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพารา ของจังหวัดกระนี่ (กรณีการผลิตในรูปเศษยาง) ดังแสดงในตารางที่ 4.54 พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เมื่อไม่ถูกทำลายในรอบ 25 ปี ของเกษตรกรจังหวัดกระนี่ ซึ่งศึกษากรณีการผลิตในรูปเศษยาง มีค่า เท่ากับ 1,122,654.12 บาทต่อไร่ และเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ละปี พบว่า ในช่วงอายุยางปีแรกๆ มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าต่ำกว่ายางพาราอยุ่มาก โดยในปีแรกมีมูลค่าเท่ากับ 1,015,352.75 บาทต่อไร่ ในขณะที่ยางอายุ 25 ปี มีมูลค่าเท่ากับ 1,118,011.43 บาทต่อไร่ ทำให้ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เมื่อไม่ถูกทำลายและใน 25 ปีกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในแต่ละปี มีค่าที่ตรงข้ามกัน กล่าวคือ ในปี แรกนี้มูลค่าของผลต่างจะมีมาก ค่อยๆ น้อยลงในปีถัดมา และมีมูลค่าน้อยที่สุดในปีสุดท้ายหรือปีที่ 25 ซึ่งผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีที่ 25 เท่ากับ 4,642.70 บาทต่อไร่ ในขณะที่ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีแรกเท่ากับ 107,301.38 บาทต่อไร่

4.7.8 การประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพารา จังหวัดตรัง

1) การประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพารา จังหวัดตรัง (กรณีการผลิตในรูปยางแผ่นดิบ)

ประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพารา ของจังหวัดตรัง (กรณีการผลิตในรูปยางแผ่นดิบ) ดังแสดงในตารางที่ 4.55 พบว่า มูลค่าปัจจุบัน สุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายในรอบ 25 ปี ของเกษตรกรจังหวัดตรัง ซึ่งศึกษากรณีการผลิตในรูปยางแผ่น ดิบ มีค่าเท่ากับ 1,190,308.50 บาทต่อไร่ และเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ละปี พบว่า ในช่วงอายุยาง ปีแรกๆ มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าต่ำกว่ายางพาราอยุ่มาก โดยในปีแรกมีมูลค่าเท่ากับ 1,033,641.08 บาทต่อไร่ ในขณะที่ยางอายุ 25 ปี มีมูลค่าเท่ากับ 1,183,529.84 บาทต่อไร่ ทำให้ผลต่างของมูลค่า ปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายและใน 25 ปีกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในแต่ละปี มีค่าที่ตรงข้ามกัน กล่าวคือ ในปีแรกนี้มูลค่าของผลต่างจะมีมาก ค่อยๆ น้อยลงในปีถัดมา และมีมูลค่าน้อยที่สุดในปี สุดท้ายหรือปีที่ 25 ซึ่งผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีที่ 25 เท่ากับ 6,778.66 บาทต่อไร่ ในขณะที่ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อ ถูกทำลายในอายุยางในปีแรกเท่ากับ 156,667.41 บาทต่อไร่

ตารางที่ 4.54 ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิต่อไปเมื่อไม่ถูกทำลายและเมื่อถูกทำลายในอายุยังแต่ละปีของครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดกระนี่ (กรณีการผลิตเศษขาง)

รายการ		อายุของที่สังเกตเห็นการถูกทำลาย (ปี)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลาย เลขในรอบ 25 ปี ¹	1,122,654.12												
2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อของถูกทำลายในอายุแต่ละปีตลอด 25 ปี ¹		1,015,352.75	1,018,824.13	1,022,519.80	1,026,353.33	1,030,287.77	1,034,302.32	1,038,383.53	1,042,521.96	1,046,710.61	1,050,944.05	1,055,217.97	1,059,528.85
3. ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อของถูกทำลายในอายุแต่ละปี ²		107,301.38	103,829.99	100,134.32	96,300.79	92,366.35	88,351.80	84,270.59	80,132.16	75,943.52	71,710.07	67,436.15	63,125.27

หมายเหตุ : ¹ การคำนวณในภาคผนวก ข

² คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายเลขในรอบ 25 ปี ลบด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อของถูกทำลายในอายุแต่ละปีตลอด 25 ปี

ตารางที่ 4.54 (ต่อ)

รายการ	อายุของที่สังเกตเห็นการถูกทำลาย (ปี)												
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลาย เลขในรอบ 25 ปี													
2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อของถูกทำลายในอายุแต่ละปีตลอด 25 ปี ¹	1,063,873.74	1,068,250.16	1,072,655.97	1,077,089.32	1,081,548.59	1,086,032.35	1,090,539.31	1,095,068.34	1,099,618.40	1,104,188.55	1,108,777.95	1,113,385.82	1,118,011.43
3. ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อของถูกทำลายในอายุแต่ละปี ²	58,780.38	54,403.96	49,998.15	45,564.80	41,105.53	36,621.78	32,114.81	27,585.79	23,035.73	18,465.57	13,876.17	9,268.31	4,642.70

หมายเหตุ : ¹ การคำนวณอยู่ในภาคผนวก ข

² คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายเลขในรอบ 25 ปี ลบด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อของถูกทำลายในอายุแต่ละปีตลอด 25 ปี

ตารางที่ 4.55 ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิต่อไร่เมื่อไม่ถูกทำลายและเมื่อถูกทำลายในอายุยังแต่ละปีของครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดตรัง (กรณีการผลิตยางแผ่นดิน)

รายการ		อายุของที่สังเกตเห็นการถูกทำลาย (ปี)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลาย เลขในรอบ 25 ปี ¹	1,190,308.50												
2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อของถูกทำลายในอายุแต่ละปี ²		1,033,641.08	1,038,709.55	1,044,105.48	1,049,702.69	1,055,447.25	1,061,308.77	1,067,267.62	1,073,310.01	1,079,425.72	1,085,606.84	1,091,847.07	1,098,141.24
3. ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อของถูกทำลายในอายุแต่ละปี ²		156,667.41	151,598.95	146,203.02	140,605.80	134,861.24	128,999.72	123,040.88	116,998.49	110,882.78	104,701.66	98,461.43	92,167.25

หมายเหตุ : ¹ การคำนวณอยู่ในภาคผนวก ข

² จำนวนจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายเลขในรอบ 25 ปี ลบด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อของถูกทำลายในอายุแต่ละปี² ตลอด 25 ปี

ตารางที่ 4.55 (ต่อ)

รายการ	อายุของที่สังเกตเห็นการถูกทำลาย (ปี)												
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลาย เลขในรอบ 25 ปี													
2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อของถูกทำลายในอายุแต่ละปี ²	1,104,485.08	1,110,874.95	1,117,307.74	1,123,780.74	1,130,291.58	1,136,838.17	1,143,418.65	1,150,031.35	1,156,674.75	1,163,347.49	1,170,048.33	1,176,776.13	1,183,529.84
3. ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อของถูกทำลายในอายุแต่ละปี ²	85,823.41	79,433.54	73,000.76	66,527.76	60,016.91	53,470.32	46,889.84	40,277.15	33,633.75	26,961.01	20,260.17	13,532.37	6,778.66

หมายเหตุ : ¹ การคำนวณอยู่ในภาคผนวก ข

² จำนวนจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายเลขในรอบ 25 ปี ลบด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อของถูกทำลายในอายุแต่ละปี² ตลอด 25 ปี

2) การประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคภูษะในยางพารา จังหวัดตรัง (กรณีการผลิตในรูปน้ำยางสด)

ประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคภูษะในยางพารา ของจังหวัดตรัง (กรณีการผลิตในรูปน้ำยางสด) ดังแสดงในตารางที่ 4.56 พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เมื่อไม่ถูกทำลายในรอบ 25 ปี ของเกษตรกรจังหวัดตรัง ซึ่งศึกษากรณีการผลิตในรูปน้ำยางสด มีค่าเท่ากับ 1,060,346.16 บาทต่อไร่ และเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ละปี พบว่า ในช่วงอายุยางปีแรกๆ มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าต่ำกว่ายางพาราอายุมาก โดยในปีแรกมีมูลค่าเท่ากับ 920,784.29 บาทต่อไร่ ในขณะที่ยางอายุ 25 ปี มีมูลค่าเท่ากับ 1,054,307.63 บาทต่อไร่ ทำให้ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เมื่อไม่ถูกทำลายและใน 25 ปีกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในแต่ละปี มีค่าที่ตรงข้ามกัน กล่าวคือ ในปี แรกนี้มูลค่าของผลต่างจะมีมาก ค่อยๆ น้อยลงในปีต่อมา และมีมูลค่าน้อยที่สุดในปีสุดท้ายหรือปีที่ 25 ซึ่งผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในปีที่ 25 เท่ากับ 6,038.54 บาทต่อไร่ ในขณะที่ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีแรกเท่ากับ 139,561.88 บาทต่อไร่

4.7.9 การประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคภูษะในยางพารา จังหวัดสตูล (กรณีการผลิตในรูปน้ำยางสด)

ประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคภูษะในยางพาราของจังหวัดสตูล (กรณีการผลิตในรูปน้ำยางสด) ดังแสดงในตารางที่ 4.57 พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายในรอบ 25 ปี ของเกษตรกรจังหวัดสตูล ซึ่งศึกษากรณีการผลิตในรูปน้ำยางสด มีค่าเท่ากับ 815,451.96 บาทต่อไร่ และเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ละปี พบว่า ในช่วงอายุยางปีแรกๆ มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าต่ำกว่ายางพาราอายุมาก โดยในปีแรกมีมูลค่าเท่ากับ 778,374.47 บาทต่อไร่ ในขณะที่ยางอายุ 25 ปี มีมูลค่าเท่ากับ 813,847.70 บาทต่อไร่ ทำให้ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เมื่อไม่ถูกทำลายและใน 25 ปีกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในแต่ละปี มีค่าที่ตรงข้ามกัน กล่าวคือ ในปีแรกนี้มูลค่าของผลต่างจะมีมาก ค่อยๆ น้อยลงในปีต่อมา และมีมูลค่าน้อยที่สุดในปีสุดท้ายหรือปีที่ 25 ซึ่งผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในปีที่ 25 เท่ากับ 1,604.26 บาทต่อไร่ ในขณะที่ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีแรกเท่ากับ 37,077.49 บาทต่อไร่

ตารางที่ 4.56 ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิต่อไปเมื่อไม่ถูกทำลายและเมื่อถูกทำลายในอายุยังแต่ละปีของครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดตรัง (กรณีการผลิตน้ำยางสด)

รายการ	อายุยังที่สังเกตเห็นการถูกทำลาย (ปี)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลาย เลขในรอบ 25 ปี ¹	1,060,346.16												
2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูกทำลายในอายุแต่ละปีตลอด 25 ปี ¹		920,784.29	925,299.36	930,106.14	935,092.23	940,209.58	945,431.11	950,739.35	956,122.01	961,569.98	967,076.23	972,635.12	978,242.08
3. ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อยางถูกทำลายในอายุแต่ละปี ²		139,561.88	135,046.81	130,240.02	125,253.94	120,136.59	114,915.05	109,606.82	104,224.16	98,776.18	93,269.94	87,711.04	82,104.09

หมายเหตุ : ¹ การคำนวณอยู่ในภาคผนวก ข

² คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายเลขในรอบ 25 ปี ลบด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูกทำลายในอายุแต่ละปีตลอด 25 ปี

ตารางที่ 4.56 (ต่อ)

รายการ	อายุยังที่สังเกตเห็นการถูกทำลาย (ปี)												
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลาย เลขในรอบ 25 ปี													
2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูกทำลายในอายุแต่ละปีตลอด 25 ปี ¹	983,893.27	989,585.47	995,315.90	1,001,082.16	1,006,882.12	1,012,713.93	1,018,575.93	1,024,466.62	1,030,384.67	1,036,328.86	1,042,298.08	1,048,291.31	1,054,307.63
3. ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อยางถูกทำลายในอายุแต่ละปี ²	76,452.89	70,760.69	65,030.26	59,264.01	53,464.04	47,632.23	41,770.23	35,879.54	29,961.49	24,017.30	18,048.09	12,054.85	6,038.54

หมายเหตุ : ¹ การคำนวณอยู่ในภาคผนวก ข

² คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายเลขในรอบ 25 ปี ลบด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูกทำลายในอายุแต่ละปีตลอด 25 ปี

ตารางที่ 4.57 ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิต่อไร่เมื่อไม่ถูกทำลายและเมื่อถูกทำลายในอายุยังแต่ละปีของครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดสตูล (กรณีการผลิตน้ำยางสด)

รายการ	อายุยังที่สังเกตเห็นการถูกทำลาย (ปี)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลาย เลขในรอบ 25 ปี ¹	815,451.96												
2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูกทำลายในอายุแต่ละปีตลอด 25 ปี ¹		778,374.47	779,573.99	780,851.01	782,175.67	783,535.20	784,922.41	786,332.65	787,762.66	789,210.03	790,672.88	792,149.71	793,639.32
3. ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อยางถูกทำลายในอายุแต่ละปี ²		37,077.49	35,877.97	34,600.95	33,276.29	31,916.76	30,529.55	29,119.31	27,689.30	26,241.93	24,779.08	23,302.25	21,812.64

หมายเหตุ : ¹ การคำนวณอยู่ในภาคผนวก ข

² คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายเลขในรอบ 25 ปี ลบด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูกทำลายในอายุแต่ละปีตลอด 25 ปี

ตารางที่ 4.57 (ต่อ)

รายการ	อายุยังที่สังเกตเห็นการถูกทำลาย (ปี)												
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลาย เลขในรอบ 25 ปี													
2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูกทำลายในอายุแต่ละปีตลอด 25 ปี ¹	795,140.67	796,652.92	798,175.33	799,707.25	801,248.13	802,797.48	804,354.84	805,919.82	807,492.07	809,071.27	810,657.11	812,249.34	813,847.70
3. ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อยางถูกทำลายในอายุแต่ละปี ²	20,311.29	18,799.04	17,276.63	15,744.71	14,203.83	12,654.48	11,097.12	9,532.14	7,959.89	6,380.69	4,794.85	3,202.62	1,604.26

หมายเหตุ : ¹ การคำนวณอยู่ในภาคผนวก ข

² คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายเลขในรอบ 25 ปี ลบด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อยางถูกทำลายในอายุแต่ละปีตลอด 25 ปี

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

ในบทนี้เป็นการสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะต่างๆ จากการวิจัย ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยต่อเนื่องต่อไป

5.1 สรุปผลการวิจัย

ในการวิจัยเรื่อง การประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรคภัยไข้ในยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เฉพาะของการวิจัย เพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคมของเกษตรชาวสวนยางที่ประสบปัญหาการระบาดของโรคภัยไข้ ตลอดจนการแพร่ระบาดของโรคภัยไข้ในยางพารา และความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคภัยไข้ในยางพารา ทำการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ จำแนกเป็นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ จังหวัดระนอง ยะลา ตรัง และสตูล ทำการวิเคราะห์ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคมของเกษตรชาวสวนยางที่ประสบปัญหาการระบาดของโรคภัยไข้ ตลอดจนการแพร่ระบาดและความเสียหายทางเศรษฐกิจ จากโรคภัยไข้ในยางพารา โดยอาศัยการเก็บพิจัด เพื่อกำหนดร่วมแผนที่พื้นที่ที่มีการระบาดของโรคภัยไข้ในยางพารา สำหรับการวิเคราะห์เพื่อประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในระดับฟาร์ม ภายใต้สถานการณ์การเข้าทำลายของโรคในแต่ละปี ตลอดจนข้อมูลเบื้องต้นที่เอื้ออำนวยต่อการวิเคราะห์

การวิเคราะห์ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโรคภัยไข้ในยางพาราระดับฟาร์มนี้ เมื่อไม่ปรากฏกรอบจำนวนประชากรของผู้เสียหายจากโรคภัยไข้ในยางพาราจากสถิติของทางการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นในการสุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนจากประชากร ใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงเฉพาะเกษตรที่ประสบปัญหาโรคภัยไข้ในยางพาราที่สังเกตเห็นได้เท่านั้น ในเบื้องต้นของการเลือกตัวอย่างนี้ ได้ทำการสอบถามเจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางในแต่ละพื้นที่ของทุกจังหวัด เกี่ยวกับพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการระบาดของโรค เมื่อได้ตัวอย่างเริ่มแรกแล้ว จึงใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่เพื่อการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง 2 แบบ ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลในเชิงลึกด้านต้นทุนการผลิต เพื่อใช้ในการวิเคราะห์กระแสต้นทุน (cash flow of costs) กระแสผลตอบแทน (cash flow of benefits) และมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ที่นำไปสู่การสร้างพังก์ชันการเข้าทำลายและการประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจของการระบาดของโรคภัยไข้ในระดับครัวเรือนเกษตรกร โดยการคำนวณมูลค่าปัจจุบัน

สุทธิของการผลิตยางพาราเมื่อถูกทำลาย และไม่ถูกทำลายด้วยโรครากร้าว และมีการจำลองสถานการณ์การเข้าทำลายในแต่ละปีตลอดอายุของที่กำหนดไว้ที่ 25 ปี เพื่อนำไปสู่การคำนวณความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรครากร้าวในระดับครัวเรือน จำแนกตามรูปแบบการผลิตต่อไป
ผลการวิจัย สามารถสรุปตามประเด็นสำคัญได้ดังนี้

5.1.1 ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ศึกษา (ภาคใต้ 8 จังหวัด)

ลักษณะทางเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดต่างๆ ทั้งในภาพรวมทั้ง 8 จังหวัดและแยกเป็นจังหวัดในภาคใต้ฟังตะวันออก และภาคใต้ฟังตะวันตก ดังนี้

1) ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในภาพรวม

ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคมของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่ได้รับความเสียหายจากโรครากร้าว มีอายุเฉลี่ย 49.7 ปี มีอายุอยู่ในช่วง 41 – 50 ปี มากที่สุด ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีอาชีพหลักทำสวนยางพารา มากที่สุด

2) ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราพื้นที่ภาคใต้ฟังตะวันออก (อ่าวไทย)

สำหรับพื้นที่ภาคใต้ฟังตะวันออก ได้ทำการสำรวจการระบาดในจังหวัดชุมพร สรายภูรานี นครศรีธรรมราช และสงขลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา มีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 48.4 - 53.6 ปี มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักทำสวนยางพารา

3) ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราพื้นที่ภาคใต้ฟังตะวันตก (อันดามัน)

พื้นที่ภาคใต้ฟังตะวันตก ทำการสำรวจการระบาดในจังหวัดระนอง กระเบน ตรัง และสตูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา มีอายุเฉลี่ยใกล้เคียงกัน ระหว่าง 46.2 - 48.7 ปี มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักทำสวนยางพารา

5.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับยางพารา และการผลิต

1) ข้อมูลเกี่ยวกับยางพารา และการผลิตยางพาราในภาพรวม

1.1) ขนาดเนื้อที่ปลูกยางพารา

เนื้อที่ปลูกยางพาราของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา รวม 8 จังหวัดในภาคใต้เฉลี่ย 23.4 ไร่ เนื้อที่ปลูกยางพาราอยู่ในช่วง 11 – 20 ไร่ มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีพื้นที่ยางพาราเฉลี่ย 1.8 แปลง

1.2) ลักษณะการผลิตยางพารา

การปลูกยางพาราของเกษตรกร ในพื้นที่ 1 ไร่นั้น จะมีจำนวนต้นยางพาราเฉลี่ย 72.4 ต้น rog ผลิตยางพารานี้ เป็นการผลิตใน rog ที่ 2 มากที่สุด พันธุ์ยางที่เกษตรกรนำมาปลูก ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ RRIM 600 รองลงมาเป็นยางพันธุ์ BPM 24 เกษตรกรผู้ปลูกยางส่วนใหญ่ได้รับส่งกระห์การทำการทำสวนยาง

พื้นที่ป่าเดื่อมโตรน เป็นพื้นที่ก่อนที่เกษตรกรทำการปลูกยางพารามากที่สุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ และเป็นพื้นที่ป่ายางหรือพื้นที่ยางพาราพันธุ์พื้นเมือง ตามลำดับ เกษตรกรส่วนใหญ่มีการผลิตยางพาราเป็นระบบการปลูกยางอย่างเดียว มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ใช้ระบบการปลูกยางกับพืช เช่น และการปลูกยางแบบผสมผสาน กรณีที่ปลูกกับพืช เช่นนี้ พบว่า สะเดาเทียม เป็นชนิดพืช เช่นที่ปลูกมากที่สุด รองลงมาเป็นมังคุด นอกจากนี้เป็นพืชชนิดต่างๆ ได้แก่ ลองกอง กล้วย สะตอ จำปาทอง ผัก ปาล์มน้ำมัน สับปะรด กระฉินเทพา เครียนทอง มะละกอ มะลอก กาน妃 ต้นตะบู และทุเรียน

1.3) ระบบการผลิตยางพารา และการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงระบบการทำสวนยางพาราของเกษตรกรก่อนที่จะมีการผลิตในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต เมื่อเกิดภาวะของโรคระบาด โดยเฉพาะโรครากรขาว เกษตรกรส่วนใหญ่ เห็นว่าสาเหตุดังกล่าวไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต และเกษตรกรส่วนใหญ่ คิดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตในอนาคต

2) ข้อมูลเกี่ยวกับยางพารา และการผลิตยางพาราพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)

2.1) ขนาดเนื้อที่ปลูกยางพาราของเกษตรกรพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)

กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกยางจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา มีขนาดเนื้อที่ปลูกยางพาราเฉลี่ย 29.7, 38.2, 19.9 และ 29.5 ไร่ ตามลำดับ เนื้อที่ปลูกยางอยู่ในช่วง 11 – 20 ไร่ มากที่สุด ส่วนจำนวนแปลงยางพารานี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดชุมพร

สุรายภูร์ธานี นครศรีธรรมราช และส่งขลา มีพื้นที่ยางพาราเฉลี่ย 1.6, 2.1, 2.2 และ 2.2 แปลง ตามลำดับ ๑

2.2) ลักษณะการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)

การปลูกยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) ในพื้นที่ ๑ ไร่ นั้นปลูกยางพาราได้เฉลี่ย 69.8, 70.3, 74.9 และ 71.8 ตัน สำหรับเกษตรกรจังหวัดชุมพร สุรายภูร์ธานี นครศรีธรรมราช และส่งขลา ตามลำดับ จำนวนต้นยางพาราต่อไร่ นั้น พบว่า เกษตรกรใน จังหวัดชุมพร สุรายภูร์ธานี และส่งขลา มีการปลูกในจำนวน 70 – 72 ต้นต่อไร่ มากที่สุด ส่วน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการปลูกในจำนวนตั้งแต่ 76 ต้นต่อไร่ ขึ้นไป มากที่สุด

รอบการผลิตยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดชุมพร มีการผลิตยางพารารอบแรก และรอบที่ ๒ ใกล้เคียงกัน เกษตรกรในจังหวัดสุรายภูร์ธานี มีการผลิตยางพารารอบสองมากกว่ารอบแรกในสัดส่วนไม่มากนัก ส่วนเกษตรกรในนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่ มีการผลิตยางพารารอบแรก และเกษตรกรในจังหวัดส่งขลา ส่วนใหญ่มีการผลิตยางพารารอบที่ ๒

ยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดชุมพร สุรายภูร์ธานี นครศรีธรรมราช และ ส่งขลา มีอายุเฉลี่ย 16.7, 12.3, 12.8 และ 15.1 ปี ตามลำดับ อายุยางพาราของเกษตรกรในจังหวัด ชุมพรอยู่ในช่วง 16 – 20 ปี มากที่สุด ส่วนอายุยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดสุรายภูร์ธานี นครศรีธรรมราช และส่งขลา อยู่ในช่วง 7 – 15 ปี มากที่สุด

สำหรับประเดิมพันธุ์ยางพาราที่เกษตรกรในแต่ละจังหวัดใช้ปลูกนั้น ส่วนใหญ่ เกษตรกรทุกจังหวัดนิยมปลูกพันธุ์ RRIM 600 ซึ่งเป็นพันธุ์ส่งเสริมของกรมวิชาเกษตร มีเพียงส่วน น้อยที่ใช้พันธุ์ยางอื่นๆ เกษตรกรในแต่ละจังหวัดมากกว่าครึ่ง มีการขอรับทุนสงเคราะห์การทำสวน ยาง

การใช้พื้นที่ก่อนจะปลูกยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดชุมพร เป็นป่าเสื่อมโตรม มากที่สุด พื้นที่ส่วนยางของเกษตรกรในจังหวัดสุรายภูร์ธานี เป็นป่าไม้ มากที่สุด การใช้พื้นที่ก่อน จะปลูกยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช และส่งขลา เป็นพื้นที่ป่ายางหรือยางพารา พันธุ์พื้นเมือง มากที่สุด เหมือนกัน

ระบบการผลิตยางพาราของเกษตรกรในแต่ละจังหวัด ส่วนใหญ่ เป็นระบบการปลูก ยางอย่างเดียว และมีการผลิตในระบบการปลูกยางกับพืชแซม โดยที่เห็นเด่นชัดในจังหวัด นครศรีธรรมราช และชุมพร ซึ่งพืชแซมที่เกษตรกรทั้งสองจังหวัดปลูกแซมนั้น มีลักษณะแตกต่างกัน ตามพื้นที่ กล่าวคือ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช นิยมปลูกไม้ผล เช่น มังคุด ลองกอง ไม้ยืนต้น เช่น สะเดาเทียน สะตอ เป็นพืชแซมในสวนยางพารา ส่วนในจังหวัดชุมพร นิยมปลูกพืชล้มลุก เช่น มะละกอ กล้วย เป็นต้น

2.3) ระบบการผลิตยางพารา และการเปลี่ยนแปลง

เกษตรกรส่วนใหญ่ของทุกจังหวัดไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำสวนยางพารา และมีความคิดเห็นว่า โภครากขาวไม่ได้เป็นปัจจัยส่งผลต่อการเปลี่ยนระบบการทำสวนยางพารา ส่วนใหญ่เกษตรกรในแต่ละจังหวัดเห็นว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำสวนยาง มีเพียงจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีความเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงใกล้เคียงกันระหว่างการเปลี่ยนแปลง และ ไม่เปลี่ยนระบบการผลิตยาง ซึ่งระบบการผลิตที่คิดจะเปลี่ยนนั้นจะมีการเปลี่ยนไปเป็นระบบผสมผสาน สำหรับจังหวัดชุมพร และนครศรีธรรมราช หากมีการเปลี่ยนแปลง เกษตรกรจะปลูกพืชอื่นแทน ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน

3) ข้อมูลเกี่ยวกับยางพารา และการผลิตยางพาราพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)

3.1) ขนาดเนื้อที่ปลูกยางพาราและการผลิตยางพาราพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)

เกษตรกรในจังหวัดระนอง ระดับ ตรัง และสตูลมีเนื้อที่ปลูกยางพาราเฉลี่ย 25.2, 14.2, 14.7 และ 16.4 ไร่ ตามลำดับ เกษตรกรในจังหวัดระนอง ระดับ ตรัง และสตูลมีจำนวนแปลงยางพาราเฉลี่ย 1.5, 1.7, 1.6 และ 1.5 แปลง ตามลำดับ

(3.2) ลักษณะการผลิตยางพาราของเกษตรกรภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)

ยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดระนอง ระดับ ตรัง และสตูล มีจำนวนต้นต่อไร่เฉลี่ย 71.1, 73.3, 73.4 และ 74.0 ต้น ตามลำดับ จำนวนต้นต่อไร่ของเกษตรกรจังหวัดระนอง ระดับ ตรัง และสตูลส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 70 – 72 ต้น ส่วนเกษตรกรจังหวัดตรังมีจำนวนต้นต่อไร่อยู่ในช่วง 73 – 75 ต้น มากที่สุด รอบการผลิตยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดระนอง ตรัง และสตูลเป็นรอบการผลิตรอบแรกมากที่สุด มีเฉพาะเกษตรกรในจังหวัดระดับ ตรัง เป็นรอบการผลิตรอบที่ 2 มากที่สุด

ยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดระนอง ระดับ ตรัง และสตูล มีอายุเฉลี่ย 10.7, 12.5, 14.5 และ 13.9 ปี ตามลำดับ โดยเกษตรกรจังหวัดระนอง ระดับ มียางพาราที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 ปี มากที่สุด ส่วนเกษตรกรจังหวัดตรัง และสตูลมียางพาราที่มีอายุในช่วง 7 – 15 ปี มากที่สุด

เกษตรกรในจังหวัดระดับ ตรัง และสตูล ส่วนใหญ่ปลูกยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ส่วนเกษตรกรในจังหวัดระนองเลือกปลูกยางในหลากหลายพันธุ์กว่าพื้นที่อื่น โดยกว่าครึ่งหนึ่งของเกษตรกรปลูกยางพาราพันธุ์ BPM 24 นอกจากนั้นยังพบพันธุ์ยางที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์ GT1 พันธุ์ PB 235 พันธุ์ 251 เป็นต้น เกษตรกรในแต่ละจังหวัดมากกว่าครึ่งขอรับการสังเคราะห์สวนยางยกเว้นเกษตรกรในจังหวัดตรังที่มากกว่าครึ่งไม่รับการสังเคราะห์สวนยาง

ลักษณะการใช้พื้นที่เดิมก่อนปลูกยางของเกษตรกรในจังหวัดระนอง แตกต่างจากเกษตรกรจังหวัดอื่น กล่าวคือ ส่วนใหญ่พื้นที่สวนยางพาราเคยเป็นป่าเสื่อมโทรม ในขณะที่เกษตรกรในจังหวัดระบุว่า ตรัง และสตูลนั้น พื้นที่สวนยางพาราเคยเป็นป่าไม้ ป่าเสื่อมโทรม และป่ายาง/ยางพาราพันธุ์พื้นเมืองมาก่อน และระบบการผลิตยางพาราของเกษตรกรในแต่ละจังหวัดนั้นพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการผลิตระบบการปลูกยางอย่างเดียว สำหรับการผลิตในระบบการปลูกยางกับพืชแพร์ พบในพื้นที่จังหวัดจะมากที่สุด ซึ่งพืชแพร์ที่ปลูกมากเป็นทั้งพืชยืนต้น ได้แก่ สะเดา เทียน ปาล์มน้ำมัน และพืชล้มลุก ได้แก่ สับปะรด เป็นต้น

3.3) ระบบการผลิตยางพารา และการเปลี่ยนแปลง

เกษตรกรทั้งหมดของทุกจังหวัด ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำสวนยางพารา และมีความเห็นว่า โภครากขาวไม่ได้เป็นปัจจัยส่งผลต่อการเปลี่ยนระบบการทำสวนยางพารา และในอนาคตจะไม่เปลี่ยนระบบการทำสวนยางพารา

5.1.3 เศรษฐกิจการผลิตยางพาราของเกษตรกรในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา (ภาคใต้ 8 จังหวัด)

1) การผลิต

1.1) การผลิตยางพาราของเกษตรกรในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา

การผลิตยางพาราของเกษตรกร ส่วนใหญ่เป็นยางพาราที่ให้ผลผลิตแล้ว โดยมีจำนวนวันกรีดยางใน 1 ปีเฉลี่ย 132.7 วัน จำนวนวันกรีดยางอยู่ในช่วง 111 – 120 วัน มากที่สุด ส่วนใหญ่ใช้ต้นยางชำถุง เป็นวัสดุปลูกยางพารา สำหรับเกษตรกรที่ยางพาราให้ผลผลิตแล้ว ส่วนใหญ่ไม่มีการใช้สารเร่งน้ำยาง ราคายางเคลื่อนที่เกษตรกรได้รับเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมาเท่ากับ 49.1 บาทต่อกิโลกรัม ราคากลางในช่วง 41 – 50 บาทต่อกิโลกรัม มากที่สุด ในการกรีดยางของเกษตรกรนั้น พบว่า กว่าครึ่งหนึ่งของเกษตรกรที่กรีดด้วยตัวเอง และที่เหลือเป็นการจ้างกรีด โดยระบบการจ้างกรีดนี้มีการแบ่งสรรผลประโยชน์แบบร้อยละ 60:40 ระหว่างเจ้าของสวนและผู้กรีด มากที่สุด รองลงมาใช้ระบบร้อยละ 50:50 นอกจากการแบ่งผลประโยชน์เป็นสัดส่วนแล้วนั้น ยังมีรูปแบบการจ้างโดยการให้ค่าจ้างตามน้ำหนักยางพารา เช่น ให้ค่าจ้างกิโลกรัมละ 13 – 20 บาท นอกจากนั้นยังมีการจ้างเป็นรายวันอีกด้วย สำหรับรูปแบบผลผลิตยางพารานั้น มีการผลิต 3 รูปแบบการผลิต นั่นคือ ผลผลิตในรูปแบบน้ำยางสด รูปแบบยางแผ่นดิน และรูปแบบเศษยาง

1.2) การผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)

ยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ส่วนใหญ่ให้ผลผลิตแล้ว จำนวนวันกรีดยางใน 1 ปีเฉลี่ย 136.5, 137.2, 134.6 และ 133.0 วัน ตามลำดับ ช่วงวันกรีดในแต่ละจังหวัด พบว่า มีจำนวนวันกรีดอยู่ในช่วง 111 – 120 วัน มากที่สุด เกษตรกรใน

จังหวัดชุมพร สุรายภูร์ธานี และนครศรีธรรมราชมีจำนวนวันกรีดตั้งแต่ 151 วันขึ้นไป มากเป็นลำดับรองลงมา ในขณะที่เกยตอร์ในจังหวัดสงขลา มีจำนวนวันกรีดอยู่ในช่วง 141 – 150 วัน เป็นอันดับรองลงมา

สำหรับวัสดุปลูกที่เกยตอร์แต่ละจังหวัดใช้น้ำ พนบว่า เกยตอร์ในจังหวัดชุมพร และสงขلامีการใช้ต้นยางชำกรุงมากที่สุด ใกล้เคียงกัน ส่วนเกยตอร์ในจังหวัดสุรายภูร์ธานี และนครศรีธรรมราช มีการใช้วัสดุปลูกที่หลากหลาย แต่ยังคงใช้ต้นยางชำกรุง มากที่สุด เช่นกัน

เกยตอร์ในจังหวัดชุมพรกว่าครึ่งมีการใช้สารเร่งน้ำยา ใบในขณะที่เกยตอร์ในจังหวัดอื่นๆ ไม่ใช้สารเร่งน้ำยา

ราคายางเฉลี่ยที่เกยตอร์ในจังหวัดชุมพร สุรายภูร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ได้รับเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมาเท่ากับ 48.8, 49.2, 50.4 และ 44.6 บาทต่อ กิโลกรัม ตามลำดับ ราคายู่ในช่วง 41 – 50 บาทต่อ กิโลกรัม มากที่สุด สำหรับทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดสงขลาที่ราคาอยู่ในช่วง 30 – 40 บาทต่อ กิโลกรัม มากที่สุด ใน การกรีดยางของเกยตอร์แต่ละจังหวัดนั้น พนบว่า กว่าครึ่งหนึ่งของเกยตอร์ แต่ละจังหวัดกรีดด้วยตัวเอง และที่เหลือเป็นการจ้างกรีด โดยระบบการจ้างกรีดของจังหวัดชุมพร และสุรายภูร์ธานีนั้นมีการแบ่งสรรผลประโยชน์แบบร้อยละ 60:40 ระหว่างเจ้าของสวนและผู้กรีด มากที่สุด เกยตอร์จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นมีการแบ่งสรรผลประโยชน์แบบ 50:50 มากที่สุด ส่วนเกยตอร์ จังหวัดสงขلامีการแบ่งสรรผลประโยชน์แบบ 55:45 มากที่สุด

สำหรับรูปแบบผลผลิตยางพาราของเกยตอร์แต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกันในบาง จังหวัด กล่าวคือ จังหวัดชุมพร สุรายภูร์ธานี เกยตอร์ส่วนใหญ่ขายผลผลิตในรูปแบบยางแผ่นดิน เกยตอร์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชขายผลผลิตในรูปแบบยางแผ่นดินและเศษยาง ในสัดส่วนใกล้เคียง กัน ส่วนเกยตอร์ในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ขายผลผลิตในรูปแบบน้ำยาสต๊อก

1.3) การผลิตยางพาราของเกยตอร์ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)

ยางพาราของเกยตอร์ในจังหวัดระนอง กระเบน ตรัง และสตูล ส่วนใหญ่ให้ผลผลิต แล้ว จำนวนวันกรีดยางใน 1 ปีเฉลี่ย 111.4, 133.9, 141.4 และ 142.6 วัน ตามลำดับ จำนวนวันกรีดใน จังหวัดระนอง มีจำนวนวันกรีดอยู่ในช่วง 90 – 110 วัน มากที่สุด จังหวัดกระเบน มีจำนวนวันกรีดอยู่ ในช่วง 111 – 120 วัน มากที่สุด เกยตอร์ในจังหวัดตรังมีจำนวนวันกรีดอยู่ในช่วง 141 – 150 วัน มากที่สุด สำหรับเกยตอร์ในจังหวัดสตูลมีจำนวนวันกรีดตั้งแต่ 151 วันขึ้นไป มากที่สุด

สำหรับวัสดุปลูกที่เกยตอร์แต่ละจังหวัดใช้ในการปั๊บยางพารานั้นมีลักษณะ คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มีการใช้วัสดุการปั๊บโดยใช้ต้นยางชำกรุงมากที่สุด ไม่นิยมใช้สารเร่งน้ำยา โดย ให้เหตุผลสำคัญ คือ อายุยางยังน้อย กลัวจะเป็นอันตรายต่อต้นยาง เป็นต้น

ราคายางเคลือบเที่ยงตระกรในจังหวัดระนอง ประจำปี ตรัง และสตูลได้รับเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมาเท่ากับ 46.5, 51.8, 49.3 และ 53.7 บาทต่อกิโลกรัม ตามลำดับ ราคากลางในช่วง 41 – 50 บาทต่อกิโลกรัม มากที่สุด สำหรับจังหวัดประจำปี และตรัง ส่วนจังหวัดประจำปี และสงขลา มีราคากลางในช่วง 30 – 40 บาทต่อกิโลกรัม มากที่สุด ส่วนใหญ่เกยตระกรแต่ละจังหวัดครึ่งยางด้วยตัวเอง ยกเว้นจังหวัดระนองที่ส่วนใหญ่จ้างกรีด และระบบการแบ่งผลประโยชน์ของจังหวัดคงคล่องไว้ด้วยตนเอง กล่าวคือ เกยตระกรจะใช้วิธีการให้ค่าจ้างตามน้ำหนักของผลผลิต ส่วนเกยตระกร ในจังหวัดประจำปี และตรังนั้น มีการแบ่งผลประโยชน์แบบร้อยละ 50:50 ระหว่างเจ้าของสวนและผู้กรีด มากที่สุด ส่วนเกยตระกร จังหวัดสตูลมีการแบ่งสรรผลประโยชน์แบบ 60:40 มากที่สุด

สำหรับรูปแบบผลผลิตยางพาราของเกยตระกรแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกันในบางจังหวัด กล่าวคือ จังหวัดตรังและสตูล เกยตระกรส่วนใหญ่มีผลผลิตในรูปแบบน้ำยางสด เกยตระกรในจังหวัดประจำปี มีผลผลิตในรูปแบบยางแผ่นดินและเศษยางในสัดส่วนใกล้เคียงกัน ส่วนเกยตระกรในจังหวัดประจำปี มีผลผลิตในรูปแบบน้ำยางสดและเศษยาง ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน

2) ผลผลิตและรายได้

ผลผลิตและรายได้จากยางพาราของเกยตระกร โดยจำแนกตามพื้นที่ในการรวมของพื้นที่ศึกษา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี้

2.1) ผลผลิตและรายได้ของเกยตระกรผู้ปลูกยางพาราในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา

ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 215.8 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตอยู่ในช่วง 151 - 225 กิโลกรัมต่อไร่ มากที่สุด เกยตระกร ได้รับรายได้เฉลี่ย 15,155.8 บาทต่อไร่ รายได้อยู่ในช่วง 10,001 – 15,000 บาทต่อไร่ มากที่สุด

2.2) ผลผลิตและรายได้ของเกยตระกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)

เกยตระกร ในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ได้รับผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 203.0, 228.8, 209.5 และ 210.9 กิโลกรัม ผลผลิตอยู่ในช่วง 151 - 225 กิโลกรัมต่อไร่ มากที่สุด เกยตระกร ในแต่ละจังหวัด ได้รับรายได้จากยางพาราเฉลี่ย 15,926.5, 16,387.3, 15,116.5 และ 17,476.2 บาทต่อไร่ รายได้อยู่ในช่วง 10,001 – 15,000 บาทต่อไร่ มากที่สุด สำหรับเกยตระกร ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ส่วนเกยตระกร ในจังหวัดชุมพรนั้น มีรายได้อยู่ในช่วง 15,001 – 20,000 บาทต่อไร่ มากที่สุด

2.3) ผลผลิตและรายได้ของเกยตระกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)

เกย์ตกรในจังหวัดระนอง ประจำปี ตรัง และสตูลได้รับผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 222.7, 216.2, 225.9 และ 212.9 กิโลกรัม ผลผลิตอยู่ในช่วง 151 - 225 กิโลกรัมต่อไร่ มากที่สุด เกย์ตกร ในแต่ละจังหวัดได้รับรายได้จากการขายเฉลี่ย 12,492.6, 12,323.3, 17,040.0 และ 15,858.6 บาทต่อ ไร่ รายได้ของเกย์ตกรในจังหวัดระนองอยู่ในช่วง 10,001 – 15,000 บาทต่อไร่ มากที่สุด ส่วน เกย์ตกรจังหวัดประจำปี ส่วนเกย์ตกรในจังหวัดตรัง และสตูลนั้น มีรายได้อยู่ในช่วง 15,001 – 20,000 บาทต่อไร่ มากที่สุด

5.1.4 การระบาดของโรคภากษา

1) การแพร่ระบาดของโรคภากษาในยางพาราในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา (ภาคใต้ 8 จังหวัด)

การสำรวจการแพร่ระบาดของโรคภากษาในยางพารา สำหรับพื้นที่ศึกษาในภาพรวม โดยใช้เครื่องมือระบุตำแหน่งบนพื้นผิวโลก (GPS) กำหนดพิกัดของพื้นที่สำรวจที่ได้รับแพร่ระบาดของ โรคภากษา เพื่อนำเสนอให้เห็นผ่านแผนที่แสดงการแพร่ระบาดของโรคในภาพรวมและราย จังหวัดที่ทำการสำรวจ และพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของการแพร่ระบาดของโรคกับลักษณะดิน จากการซ่อนหันกับฐานข้อมูลลักษณะดิน ซึ่งจำแนกโดยกรมพัฒนาที่ดิน พบรการระบาดของโรค ภากษาในภาพรวมของพื้นที่ที่ทำการศึกษา มีความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกัน สามารถสรุปพื้นที่ที่ มีการระบาดในแต่ละระดับ ดังนี้

1.1) พื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง ได้แก่ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว ตำบลทุ่ง คาวัด อำเภอละเอแม จังหวัดชุมพร ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบูรี จังหวัดระนอง ตำบลประสงค์ ตำบล คลองพา อำเภอท่าชัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลดอนตะโภ อำเภอท่าศาลา ตำบลหนองสงส์ อำเภอ พรหมคีรี ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง ตำบลท่าดี อำเภอสถานที่ ตำบลนาเรหง อำเภอโนนพิดา จังหวัด ประจำปี ตำบลไม้ฝ่า อำเภอสีเกา ตำบลช่อง อำเภอโน(po) จังหวัดตรัง ตำบลโคงม่วง อำเภอคลอง หอยโ่ง จังหวัดสงขลา ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

1.2) พื้นที่ที่มีการระบาดระดับปานกลาง ได้แก่ ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดประจำปี ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลบ่อพิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง ตำบลชุมโภ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ตำบลสำนักแรด ตำบลป่าดังเบชาร์ ตำบล ทุ่งหม้อ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

1.3) พื้นที่ที่มีการระบาดน้อย ได้แก่ ตำบลปากاشัย อำเภอเหนือคลอง ตำบล หัวยน้ำขาว อำเภอคลองหออม จังหวัดประจำปี ตำบลปากนลุย ตำบลคลองไทร อำเภอท่าจາ ตำบล สมอทอง ตำบลกันธุลี อำเภอท่าชัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลไทยบูรี อำเภอท่าศาลา ตำบล

นาสาร อำเภอพระพรม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลปากคลอง อ่าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลพะตง ตำบลบ้านพรุ อ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตำบลปากน้ำ ตำบลน้ำผุด อ่าเภอละงู ตำบลพิมาน อ่าเภอเมือง ตำบลลังประจัน อ่าเภอควนโコン จังหวัดสตูล ตำบลน้ำจีด ตำบลปากจัน ตำบลมะมุ ตำบลลำเดียง อ่าเภอกรุงบุรี จังหวัดระนอง

ในการศึกษาการแพร่ระบาดของโรครากวัวในยางพารานี้ โดยมีการประเมินปัจจัยที่คาดว่าจะอื้อต่อการแพร่ระบาด ในแต่ละประเด็นสำคัญ ดังนี้

พื้นที่ยางพารามีลักษณะดินประกอบด้วยดิน粘土 และดินทราย ตามลำดับ สำหรับพันธุ์ยางพาราที่พบว่าเป็นโรครากวัวมากที่สุด คือ พันธุ์ RRIM 600 รองลงมาคือ พันธุ์ BPM 24 โรครากวัวทำลายยางพาราในรอบการผลิตที่สองมากที่สุด โดยช่วงปีที่เริ่มพบเห็นการระบาดมากที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2546 – 2550 รองลงมาพัฒนาระบบที่เพิ่มมากขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป การระบาดในแปลงมีลักษณะขึ้นๆ ลงๆ คาดว่าเกิด เพราะปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง แต่จะเห็นแนวโน้มจำนวนแปลงที่พบเห็นการระบาดเพิ่มมากขึ้นในปีหลังๆ

จำนวนต้นยางพาราที่ถูกทำลายด้วยโรครากวัวเฉลี่ย 70.54 ต้นต่อแปลง โดยเฉลี่ยแล้วต้นยางที่ถูกทำลายด้วยโรครากวัวคิดเป็นร้อยละ 10.62 ของจำนวนต้นยางพาราทั้งหมด และพบว่าอยู่ในช่วงร้อยละ 1.01 - 5.00 ของจำนวนทั้งหมด หากที่สุด เมื่อพิจารณาจำนวนต้นยางพาราเฉลี่ยที่ถูกทำลายตามระยะของการถูกทำลาย พบว่า ส่วนใหญ่จะพบในระยะโคนกลมไปแล้วเฉลี่ย 69.4 ต้นต่อแปลง ส่วนระยะอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นระยะเริ่มทำลาย ใบเหลือง และใบร่วงต้นตาย เกษตรกรจะสังเกตเห็นได้ชัดเจน

ระยะเวลาในการเข้าทำลายตั้งแต่แรกเริ่มทำลายไปจนถึงระยะที่ต้นยางพาราโค่นล้ม ตลอดจนถูกกาลด้วยคาดว่าจะเกิดการระบาดของโรคนี้ โดยระยะแรกคือตั้งแต่แรกเริ่มทำลายถึงระยะใบเหลือง ใช้เวลาเฉลี่ย 59.9 วันหรือประมาณ 2 เดือน ใช้เวลาอยู่ในช่วง 31 – 60 วัน หากที่สุด ระยะเวลาที่ใบเหลืองจนถึงใบร่วงต้นตาย ใช้เวลาเฉลี่ย 76.0 วันหรือประมาณ 2 เดือนครึ่ง ใช้เวลาอยู่ในช่วง 31 – 60 วัน หากที่สุด ระยะเวลาที่ใบร่วงจนถึงโค่นล้ม ใช้เวลาเฉลี่ย 125.9 วันหรือประมาณ 4 เดือน ใช้เวลาอยู่ในช่วงตั้งแต่ 91 ชั่วโมงไป มากที่สุด หากนำจำนวนวันเฉลี่ยจากที่เกษตรกรสังเกตเห็นในระยะเริ่มทำลาย จนใบเหลือง จนถึงระยะใบร่วง และโค่นล้ม พบว่า ใช้เวลาทั้งสิ้น 262 วัน หรือประมาณ 8-9 เดือน ถือเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน สำหรับช่วงฤดูกาลที่มีการระบาดของโรครุนแรงนี้ เกษตรกรเห็นว่าช่วงฤดูกาลเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรครากวัวรุนแรง มากที่สุด

2) การแพร่ระบาดของโรครากวัวในยางพารา ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)

ในการศึกษาการแพร่ระบาดของโรคจากขาวในยางพารา ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) โดยมีการประเมินปัจจัยที่จะเอื้อต่อการแพร่ระบาด ดังนี้

ลักษณะดินในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) ที่พบการระบาดของโรคจากขาว ซึ่งแต่ละพื้นที่มีลักษณะดินที่แตกต่างกัน กล่าวคือ พื้นที่สวนยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ยางพารามีลักษณะดินประเภทดินร่วนมากที่สุด จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่ยางพารามีลักษณะดินประเภทดินเหนียวมากที่สุด สำหรับพื้นที่สวนยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ยางพารามีลักษณะดินประเภทดินเหนียว และดินร่วน ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน สำหรับพื้นที่ยางพาราในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลาที่พบว่าเป็นโรคจากขาวมากที่สุด คือ พื้นที่ RIM 600 รองลงมาคือ พื้นที่ BPM 24 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี ส่วนพื้นที่ที่พบเป็นโรคมากอันดับรองลงมาของจังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา คือ พื้นที่ 251 และพื้นที่ PB 235 ตามลำดับ รอบการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีนั้น โรคจากขาวเข้าทำลายยางพาราในรอบการผลิตแรกมากที่สุด ส่วนพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา พบการเข้าทำลายของโรคในรอบสองของการผลิตมากที่สุด

ช่วงปีที่เริ่มพบเห็นการระบาดมากที่สุดสำหรับเกษตรกรในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา คือ ปี พ.ศ. 2546 – 2550 รองลงมาพบการเริ่มระบาดของโรคจากขาวในยางพาราช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป เกษตรกรในจังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่พบการเริ่มระบาดก่อนปี พ.ศ. 2535

จำนวนต้นยางพาราในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลาที่ถูกทำลาย ด้วยโรคจากขาวเฉลี่ย 55.30, 72.59, 126.61 และ 73.60 ต้นต่อแปลง ช่วงของจำนวนต้นที่โดนทำลายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ต้น มากรีดในจังหวัด ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา ยกเว้นจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจำนวนต้นที่โดนทำลายอยู่ในช่วง 11 – 20 ต้น มากรีด และจำนวนต้นที่ถูกทำลายตั้งแต่ 100 ต้นขึ้นไป พบริบูรณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช มากรีด เมื่อคิดเป็นร้อยละจากจำนวนต้นยางพาราทั้งหมด พบริบูรณ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอัตราส่วนของการถูกทำลายมากกว่าเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ เมื่อพิจารณา率ยะของ การถูกทำลายในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา พบริบูรณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่ว่าจะเป็นระยะเริ่มทำลาย ในเหลือง และในร่องต้นตาย เกษตรกรจะสังเกตเห็นได้น้อยกว่า

ระยะเวลาในการเข้าทำลายสำหรับเกษตรกรในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา โดยระยะแรกคือตั้งแต่แรกเริ่มทำลายถึงระยะในเหลือง ใช้เวลาเฉลี่ย

47.3, 72.1, 49.9 และ 69.9 วัน ตามลำดับ อよู่ในช่วง 31 – 60 วัน มากที่สุด ระยะเวลาที่ใบเหลืองจนถึงใบร่วงต้นตาย ใช้เวลาเฉลี่ย 95.2, 58.2, 71.2 และ 86.7 วัน กระจายอยู่ในช่วง 31 – 60 วัน มากที่สุด ยกเว้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีการกระจายของจำนวนวันอよู่ในช่วง 16 - 30 วัน มากที่สุด ระยะเวลาที่ใบร่วงจนถึงโคลนล้ม ใช้เวลาเฉลี่ย 163.5, 108.2, 124.6 และ 86.6 วัน กระจายอยู่ในช่วง ตั้งแต่ 91 ขึ้นไป มากที่สุด เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงดังกล่าวเกษตรกรในแต่ละจังหวัดกว่าครึ่งหนึ่งไม่ได้สังเกตหรือประมาณระยะเวลาดังกล่าวได้

สำหรับช่วงฤดูกาลที่มีการระบบของโรครุนแรงนั้น เกษตรกรในแต่ละจังหวัดเห็นว่าช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่มีการระบบของโรครากขาวรุนแรงมากที่สุด รองลงมาคือช่วงฤดูร้อน ยกเว้นจังหวัดชุมพร ที่เห็นว่ามีการระบบตลอดทั้งปีในอันดับรองลงมา และเป็นที่น่าสังเกตว่าเกษตรกรในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.2 ไม่ได้มีการสังเกตเห็นการระบบที่รุนแรงในช่วงฤดูใดเลย

3) การแพร่ระบาดของโรครากขาวในยางพารา ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)

ในการศึกษาการแพร่ระบาดของโรครากขาวในยางพารา ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) โดยมีการประเมินปัจจัยที่คาดว่าจะเอื้อต่อการแพร่ระบาด ดังนี้

ลักษณะดินในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) ที่พบการระบบของโรครากขาว ซึ่งแต่ละพื้นที่มีลักษณะดินที่แตกต่างกัน กล่าวคือ พื้นที่สวนยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดระนองเป็นพื้นที่ยางพารามีลักษณะดินประเภทดินลูกรังมากที่สุด จังหวัดยะลา ตรังและสตูลเป็นพื้นที่ยางพารามีลักษณะดินประเภทดินร่วนมากที่สุด

พันธุ์ยางพาราในพื้นที่จังหวัดยะลา ตรัง และสตูล ที่พบว่าเป็นโรครากขาวมากที่สุด คือพันธุ์ RRIM 600 ส่วนจังหวัดระนอง พันธุ์ยางพาราที่พบว่าเป็นโรครากขาวมากที่สุด คือ พันธุ์ BPM 24 รอบการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดระนองและยะลา นั้น โรครากขาวเข้าทำลายยางพาราในรอบการผลิตที่สองมากที่สุด ส่วนพื้นที่จังหวัดตรัง และสตูล พบการเข้าทำลายของโรคในรอบการผลิตแรก มากที่สุด

ช่วงปีที่เริ่มพบเห็นการระบบมากที่สุดสำหรับเกษตรกรในจังหวัดยะลา ตรัง และสตูล คือ ปี พ.ศ. 2546 – 2550 ส่วนจังหวัดระนองพบการเริ่มระบบตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมามากที่สุด เกษตรกรในจังหวัดตรังเป็นจังหวัดเดียวที่พัฒนาระบบท่อนปี พ.ศ. 2530

จำนวนต้นยางพาราในจังหวัดระนอง ระยะ ตรัง และสตูลที่ถูกทำลายด้วยโรครากขาวเฉลี่ย 23.64, 59.07, 60.00 และ 49.30 ต้นต่อแปลง จำนวนต้นที่โดนทำลายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ต้นมากที่สุดในทุกจังหวัด และจำนวนต้นที่ถูกทำลายตั้งแต่ 100 ต้นขึ้นไป พบในจังหวัดยะลา ตรัง และสตูล เมื่อคิดเป็นร้อยละจากจำนวนต้นยางพาราทั้งหมดในจังหวัดระนอง ระยะ ตรัง และสตูล พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วคิดเป็นร้อยละ 3.92, 9.39, 11.49 และ 7.55 ตามลำดับ ของจำนวนต้นยางพารา

ทั้งหมด ตามลำดับ จะเห็นว่าจังหวัดตั้งมืออัตราส่วนของการถูกทำลายค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ เมื่อพิจารณาจะของ การถูกทำลายในจังหวัดระนอง ระยะนี้ ตั้ง และสูง พบร่วมกับส่วนใหญ่จะพบในระยะโคลนล้มไปแล้วเฉลี่ย 21.0, 52.0, 57.0 และ 48.0 ตัน ตามลำดับ ส่วนระยะอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นระยะเริ่มทำลาย ใบเหลือง และในร่วงต้นตาย เกษตรกรรมสังเกตเห็นได้น้อยกว่า

ระยะเวลาหรือจำนวนวันในการเข้าทำลายสำหรับเกษตรกรในจังหวัดระนอง ระยะนี้ ตั้ง และสูง โดยระยะแรกคือตั้งแต่แรกเริ่มทำลายถึงระยะใบเหลือง ใช้เวลาเฉลี่ย 64.9, 60.2, 73.2 และ 53.9 วัน ตามลำดับ เกษตรกรในจังหวัดระนอง ระยะนี้ และตั้ง มีจำนวนวันอยู่ในช่วง 31 – 60 วัน มากที่สุด ส่วนเกษตรกรในจังหวัดสูง มีจำนวนวันอยู่ในช่วง ไม่เกิน 30 วัน มากที่สุด

ระยะเวลาหรือจำนวนวันที่ใบเหลืองถึงในร่วงต้นตาย ใช้เวลาเฉลี่ย 80.8, 79.1, 85.1 และ 49.5 วัน จำนวนวันแตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด กล่าวคือ เกษตรกรในจังหวัดระนอง มีจำนวนวันอยู่ในช่วง 31 – 60 วัน มากที่สุด เกษตรกรในจังหวัดระยะนี้ มีจำนวนวันอยู่ในช่วง 16 - 30 วัน มากที่สุด เกษตรกรในจังหวัดตั้ง มีจำนวนวันอยู่ในช่วง ตั้งแต่ 91 ขึ้นไป มากที่สุด ส่วนเกษตรกรในจังหวัดสูง มีจำนวนวันอยู่ในช่วง ไม่เกิน 15 วัน มากที่สุด

ระยะเวลาหรือจำนวนวันที่ในร่วงจนถึงโคลนล้ม ใช้เวลาเฉลี่ย 125.8, 129.2, 153.3 และ 84.4 วัน จำนวนวันอยู่ในช่วงตั้งแต่ 91 ขึ้นไป มากที่สุด เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงดังกล่าวเกษตรกรในแต่ละจังหวัดกว่าครึ่งหนึ่ง ไม่ได้สังเกตหรือประมาณระยะเวลาดังกล่าวได้

สำหรับช่วงฤดูกาลที่มีการระบาดของโรครุนแรงนั้น เกษตรกรในแต่ละจังหวัดเห็นว่าช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรครากขาวรุนแรง มากที่สุด ยกเว้นจังหวัดระนอง ที่เห็นว่าการระบาดของโรครากขาวเกิดรุนแรงในช่วงฤดูร้อน

5.1.5 การจัดการโรครากขาว

1) การจัดการกับโรครากขาวของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ศึกษา (ภาคใต้ 8 จังหวัด) เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในภาพรวมของพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดการเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาโรครากขาว ทั้งนี้ได้ให้เหตุผลที่ยังไม่มีการแก้ไข เป็นพระ ไม่รู้วิธีการแก้ไขปัญหาปืนอันดับแรก รองลงมาเห็นว่ายังไม่มียารักษาป้องกัน มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ได้มีการจัดการเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาโรครากขาว โดยวิธีการจัดการเพื่อป้องกันหรือแก้ปัญหารากขาวนั้นส่วนใหญ่ใช้สารเคมี และใช้วิธีเบตกรมเป็นบางส่วน

2) การจัดการกับโรครากขาวของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)

เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา เกินกว่าครึ่งยังไม่มีการจัดการเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาโรครากขาว ทั้งนี้ได้ให้เหตุผล

เหมือนกันสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา คือ ไม่รู้วิธีการแก้ไขปัญหา ส่วนเกยตระกรในจังหวัดชุมพรเห็นว่าซึ่งไม่มีyarakyaป้องกัน สำหรับเกยตระกรที่ได้มีการจัดการเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาโรคภัยไข้ด้วยการจัดการเพื่อป้องกันหรือแก้ปัญหาโรคภัยไข้ด้วยสารเคมี

3) การจัดการกับโรคภัยไข้ด้วยการจัดการเพื่อป้องกันหรือแก้ปัญหาโรคภัยไข้ด้วยสารเคมี

เกยตระกรผู้ป่วยพาราในพื้นที่จังหวัดระนอง กระบี่ ตรัง และสตูล ส่วนใหญ่ไม่มีการจัดการเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาโรคภัยไข้ด้วยการจัดการเพื่อป้องกันหรือแก้ปัญหาโรคภัยไข้ด้วยสารเคมี ทั้งนี้ได้ให้เหตุผลเหมือนกันสำหรับจังหวัดระนอง ตรัง และสตูล คือ ไม่รู้วิธีการแก้ไขปัญหา ส่วนเกยตระกรในจังหวัดกระบี่เห็นว่าซึ่งไม่มีyarakyaป้องกัน สำหรับเกยตระกรที่ได้มีการจัดการเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาโรคภัยไข้ด้วยการจัดการเพื่อป้องกันหรือแก้ปัญหาโรคภัยไข้ด้วยสารเคมี

5.1.6 ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่มีผลต่อการเกิดโรคและความรุนแรงของการเกิดโรค

ลักษณะดินในสวนยางพารา และรอบการผลิตของเกยตระกรมีความสัมพันธ์หรือมีผลต่อการเกิดโรคและความรุนแรงของการเกิดโรค อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 และ 0.05 ตามลำดับ โดยสวนยางพาราที่มีลักษณะดินร่วน จะมีสัดส่วนของระดับความรุนแรงแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากดินลักษณะอื่นๆ เช่น ดินลูกรังและดินทราย และยางพาราที่ผลิตในรอบการผลิตที่สองจะมีสัดส่วนของระดับการระบาดที่รุนแรงแตกต่างจากการผลิตในรอบแรกอย่างเห็นได้ชัด

สำหรับอายุยางพารา พบร่วมกับความสัมพันธ์หรือมีผลต่อการเกิดโรคและความรุนแรงของ การเกิดโรคภัยไข้ด้วยการจัดการเพื่อป้องกันในทุกช่วงอายุ กล่าวคือ การระบาดของโรคที่รุนแรงหรือไม่นั้น สามารถเกิดขึ้นได้กับยางพาราในทุกช่วงอายุ

5.1.7 ประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคภัยไข้ด้วยยางพารา ในพื้นที่ศึกษา (ภาคใต้ 8 จังหวัด)

ในการประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคภัยไข้ด้วยยางพารา ทำการวิเคราะห์โดยใช้ฟังก์ชันการเข้าทำลาย เพื่อประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจ สามารถนำมาใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคภัยไข้ด้วยยางพาราในแต่ละจังหวัดที่ทำการศึกษา และจำแนกตามรูปแบบการผลิตยางพารา

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างจำนวนต้นที่ถูกทำลายและอายุของยาง ตลอดจนลักษณะทางกายภาพ สภาพการปลูก และพื้นที่ปลูกยาง หรือ ฟังก์ชันการทำลาย จะทำให้

สามารถทำการเข้าทำลายที่สามารถสังเกตได้ในแต่ละอายุของยาง โดยการประมาณการฟังก์ชันการทำลายข้างต้น ที่เป็นฟังก์ชันเชิงเดี่ยว และใช้วิธีการกำลังสองน้อยที่สุดแบบธรรมด้า หรือ Ordinary Least Squares Methods รวมทั้งการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐมิติทั้งหลาย ซึ่งฟังก์ชันการเข้าทำลายนี้ ได้นำมาประยุกต์ใช้เพื่อจำลองสถานการณ์การเข้าทำลายในแต่ละปี ร่วมกับการคำนวณหา มูลค่าปัจจุบันสุทธิจากการแสต้นทุนและผลตอบแทนในแต่ละสถานการณ์ ผลจากการวิเคราะห์ สามารถสรุปได้ดังนี้

1) การประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพารา จังหวัดชุมพร (กรณีการผลิตในรูปแบบน้ำยางสด)

ผลการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพาราของ จังหวัดชุมพร (กรณีการผลิตในรูปแบบน้ำยางสด) นั้น พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกโรครากรขาว ทำลายในรอบ 25 ปี ของเกษตรกรจังหวัดชุมพร ในกรณีการผลิตรูปแบบน้ำยางสด มีค่าเท่ากับ 959,784.23 บาทต่อไร่ และเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ละปีต่อไร่ พบว่า ในช่วงอายุยางปีแรกๆ มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าต่ำกว่ายางพาราอายุมาก โดยในปีแรกมีมูลค่าเท่ากับ 905,569.45 บาทต่อไร่ ในขณะที่ยางอายุ 25 ปี มีมูลค่าเท่ากับ 957,438.47 บาทต่อไร่ ทำให้ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เมื่อไม่ถูกทำลายแล้วใน 25 ปีกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในแต่ละปี มีค่าที่ตรงข้ามกัน กล่าวคือ ในปี แรกนั้นมูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลต่างจะมีมาก ค่อยๆ น้อยลงในปีถัดมา และมีมูลค่าน้อยที่สุดในปี สุดท้ายหรือปีที่ 25 ซึ่งผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางใน ปีที่ 25 มีค่าเท่ากับ 2,345.76 บาทต่อไร่ ในขณะที่ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับ เมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีแรกเท่ากับ 54,214.78 บาทต่อไร่

2) การประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กรณีการผลิตในรูปยางแผ่นดิบ)

ผลการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพาราของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กรณีการผลิตในรูปยางแผ่นดิบ) พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกโรครากร ขาวทำลายในรอบ 25 ปี ของเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในรูปแบบยางแผ่นดิบ มีค่าเท่ากับ 1,493,050.76 บาทต่อไร่ และเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ละปี พบว่า ในช่วงอายุยางปีแรกๆ มูลค่า ปัจจุบันสุทธิมีค่าต่ำกว่ายางพาราอายุมาก โดยในปีแรกมีมูลค่าเท่ากับ 1,433,854.49 บาทต่อไร่ ในขณะที่ยางอายุ 25 ปี มีมูลค่าเท่ากับ 1,490,489.47 บาทต่อไร่ ทำให้ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เมื่อไม่ถูกทำลายแล้วใน 25 ปีกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในแต่ละปี มีค่าที่ตรงข้ามกัน กล่าวคือ ในปี แรกนั้นมูลค่าของผลต่างจะมีมาก ค่อยๆ น้อยลงในปีถัดมา และมีมูลค่าน้อยที่สุดในปีสุดท้ายหรือปีที่ 25 ซึ่งผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีที่ 25 เท่ากับ

2,561.29 บาทต่อไร่ ในขณะที่ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีแรกเท่ากับ 59,196.27 บาทต่อไร่

3) การประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราช

3.1) การประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราช (กรณีการผลิตในรูปปียางแผ่นดิน)

ผลการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพาราของจังหวัดนครศรีธรรมราช (กรณีการผลิตในรูปปียางแผ่นดิน) พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เมื่อไม่ถูกทำลายในรอบ 25 ปี ของเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ในรูปแบบยางแผ่นดิน มีค่าเท่ากับ 979,321.23 บาทต่อไร่ และเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ละปี พบว่า ในช่วงอายุยางปีแรกๆ มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าต่ำกว่ายางพาราอายุมาก โดยในปีแรกมีมูลค่าเท่ากับ 697,594.94 บาทต่อไร่ ในขณะที่ยางอายุ 25 ปี มีมูลค่าเท่ากับ 967,131.55 บาทต่อไร่ ทำให้ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เมื่อไม่ถูกทำลายเลยใน 25 ปีกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในแต่ละปี มีค่าที่ตรงข้ามกัน กล่าวคือ ในปีแรกนี้มูลค่าของผลต่างจะมีมาก ค่อยๆ น้อยลงในปีถัดมา และมีมูลค่าน้อยที่สุดในปีสุดท้ายหรือปีที่ 25 ซึ่งผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีที่ 25 เท่ากับ 12,189.68 บาทต่อไร่ ในขณะที่ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีแรกเท่ากับ 281,726.29 บาทต่อไร่

3.2) การประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราช (กรณีการผลิตในรูปปียางสด)

ผลการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพาราของจังหวัดนครศรีธรรมราช (กรณีการผลิตในรูปปียางสด) ดังแสดงในตารางที่ 4.50 พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายในรอบ 25 ปี ของเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ในรูปปียางสด มีค่าเท่ากับ 1,664,827.18 บาทต่อไร่ และเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ละปี พบว่า ในช่วงอายุยางปีแรกๆ มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าต่ำกว่ายางพาราอายุมาก โดยในปีแรกมีมูลค่าเท่ากับ 1,185,897.93 บาทต่อไร่ ในขณะที่ยางอายุ 25 ปี มีมูลค่าเท่ากับ 1,644,104.96 บาทต่อไร่ ทำให้ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายเลยใน 25 ปีกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในแต่ละปี มีค่าที่ตรงข้ามกัน กล่าวคือ ในปีแรกนี้มูลค่าของผลต่างจะมีมาก ค่อยๆ น้อยลงในปีถัดมา และมีมูลค่าน้อยที่สุดในปีสุดท้ายหรือปีที่ 25 ซึ่งผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีที่ 25 เท่ากับ 20,722.23 บาทต่อไร่ ในขณะที่ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีแรกเท่ากับ 478,929.26 บาทต่อไร่

(4) การประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคракษาในยางพารา จังหวัดสงขลา (กรณีการผลิตในรูปแบบสัด)

ผลการประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรค rak ษาในยางพาราของ จังหวัดสงขลา (กรณีการผลิตในรูปแบบสัด) พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายในรอบ 25 ปี ของเกษตรกรจังหวัดสงขลา ซึ่งมีการผลิตในรูปแบบสัด มีค่าเท่ากับ 1,536,860.47 บาทต่อไร่ และเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ละปี พบว่า ในช่วงอายุยางปีแรกๆ มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าต่ำกว่า ยางพาราอายุมาก โดยในปีแรกมีมูลค่าเท่ากับ 1,391,721.92 บาทต่อไร่ ในขณะที่ยางอายุ 25 ปี มี มูลค่าเท่ากับ 1,530,580.64 บาทต่อไร่ ทำให้ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายเหลือใน 25 ปีกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในแต่ละปี มีค่าที่ตรงข้ามกัน กล่าวคือ ในปีแรกนี้มูลค่าของผลต่างจะ มีมาก ค่อยๆ น้อยลงในปีต่อมา และมีมูลค่าน้อยที่สุดในปีสุดท้ายหรือปีที่ 25 ซึ่งผลต่างของมูลค่า ปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีที่ 25 เท่ากับ 6,279.83 บาทต่อไร่ ในขณะที่ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีแรกเท่ากับ 145,138.54 บาทต่อไร่

(5) การประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรค rak ษาในยางพารา จังหวัดระนอง (กรณีการผลิตในรูปแบบแผ่นดิน)

ผลการประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรค rak ษาในยางพาราของ จังหวัดระนอง (กรณีการผลิตในรูปแบบแผ่นดิน) พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายในรอบ 25 ปี ของเกษตรกรจังหวัดระนอง ซึ่งศึกษาระบบที่มีการผลิตในรูปแบบแผ่นดิน มีค่าเท่ากับ 821,014.66 บาทต่อไร่ และเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ละปี พบว่า ในช่วงอายุยางปีแรกๆ มูลค่าปัจจุบันสุทธิมี ค่าต่ำกว่า ยางพาราอายุมาก โดยในปีแรกมีมูลค่าเท่ากับ 796,412.07 บาทต่อไร่ ในขณะที่ยางอายุ 25 ปี มีมูลค่าเท่ากับ 819,950.16 บาทต่อไร่ ทำให้ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายเหลือใน 25 ปีกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในแต่ละปี มีค่าที่ตรงข้ามกัน กล่าวคือ ในปีแรกนี้มูลค่าของ ผลต่างจะมีมาก ค่อยๆ น้อยลงในปีต่อมา และมีมูลค่าน้อยที่สุดในปีสุดท้ายหรือปีที่ 25 ซึ่งผลต่าง ของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีที่ 25 เท่ากับ 1,064.50 บาท ต่อไร่ ในขณะที่ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีแรก เท่ากับ 24,602.59 บาทต่อไร่

(6) การประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรค rak ษาในยางพารา จังหวัด กระนอง

6.1) การประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรค rak ษาใน ยางพารา จังหวัดกระนอง (กรณีการผลิตในรูปแบบแผ่นดิน)

ผลการประเมินความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพาราของจังหวัดกระนี่ (กรณีการผลิตในรูปปีงบประมาณ) พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายในรอบ 25 ปี ของเกษตรกรจังหวัดกระนี่ ซึ่งศึกษากรณีการผลิตในรูปปีงบประมาณ พบว่า มีค่าเท่ากับ 931,333.72 บาทต่อไร่ และเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ละปี พบร่วมกับ 927,482.22 บาทต่อไร่ ทำให้ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เมื่อไม่ถูกทำลายเฉลี่ยใน 25 ปี กับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในแต่ละปี มีค่าที่ต่างข้ามกัน กล่าวคือ ในปีแรกนี้มูลค่าของผลต่างจะมีมาก คือ น้อยลงในปีถัดมา และมีมูลค่าน้อยที่สุดในปีสุดท้ายหรือปีที่ 25 ซึ่งผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีที่ 25 เท่ากับ 3,851.50 บาทต่อไร่ ในขณะที่ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีแรกเท่ากับ 89,015.30 บาทต่อไร่

6.2) การประเมินความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพารา จังหวัดกระนี่ (กรณีการผลิตในรูปเศษยาง)

ผลการประเมินความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพาราของจังหวัดกระนี่ (กรณีการผลิตในรูปเศษยาง) พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลาย ในรอบ 25 ปี ของเกษตรกรจังหวัดกระนี่ ซึ่งศึกษากรณีการผลิตในรูปเศษยาง มีค่าเท่ากับ 1,122,654.12 บาทต่อไร่ และเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ละปี พบร่วมกับ 927,482.22 บาทต่อไร่ ทำให้ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เมื่อไม่ถูกทำลายเฉลี่ยใน 25 ปี กับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในแต่ละปี มีค่าที่ต่างข้ามกัน กล่าวคือ ในปีแรกนี้มูลค่าของผลต่างจะมีมาก คือ น้อยลงในปีถัดมา และมีมูลค่าน้อยที่สุดในปีสุดท้ายหรือปีที่ 25 ซึ่งผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีที่ 25 เท่ากับ 4,642.70 บาทต่อไร่ ในขณะที่ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีแรกเท่ากับ 107,301.38 บาทต่อไร่

7) การประเมินความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพารา จังหวัดตรัง

7.1) การประเมินความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพารา จังหวัดตรัง (กรณีการผลิตในรูปปีงบประมาณ)

ผลการประเมินความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพาราของจังหวัดตรัง (กรณีการผลิตในรูปปีงบประมาณ) พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูก

ทำลายในรอบ 25 ปี ของเกยตกรัจหัวดตรัง ซึ่งศึกษารณิการผลิตในรูปแบบแผ่นดิน มีค่าเท่ากับ 1,190,308.50 บาทต่อไร่ และเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ละปี พบว่า ในช่วงอายุยางปีแรกๆ มูลค่า ปัจจุบันสุทธิมีค่าต่ำกว่ายางพาราอยุ่มาก โดยในปีแรกมีมูลค่าเท่ากับ 1,033,641.08 บาทต่อไร่ ในขณะที่ยางอายุ 25 ปี มีมูลค่าเท่ากับ 1,183,529.84 บาทต่อไร่ ทำให้ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เมื่อไม่ถูกทำลายเฉลี่ยใน 25 ปีกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในแต่ละปี มีค่าที่ตรงข้ามกัน กล่าวคือ ในปีแรกนี้มูลค่าของผลต่างจะมีมาก ก่อให้เกิดความเสียหายในปีต่อมา และมีมูลค่าน้อยที่สุดในปีสุดท้ายหรือปีที่ 25 ซึ่งผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีที่ 25 เท่ากับ 6,778.66 บาทต่อไร่ ในขณะที่ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีแรกเท่ากับ 156,667.41 บาทต่อไร่

7.2) การประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพารา จังหวัดตรัง (กรณีการผลิตในรูปแบบสด)

ผลการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพาราของจังหวัดตรัง (กรณีการผลิตในรูปแบบสด) พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายในรอบ 25 ปี ของเกยตกรัจหัวดตรัง ซึ่งศึกษารณิการผลิตในรูปแบบสด มีค่าเท่ากับ 1,060,346.16 บาทต่อไร่ และเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ละปี พบว่า ในช่วงอายุยางปีแรกๆ มูลค่า ปัจจุบันสุทธิมีค่าต่ำกว่ายางพาราอยุ่มาก โดยในปีแรกมีมูลค่าเท่ากับ 920,784.29 บาทต่อไร่ ในขณะที่ยางอายุ 25 ปี มีมูลค่าเท่ากับ 1,054,307.63 บาทต่อไร่ ทำให้ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เมื่อไม่ถูกทำลายเฉลี่ยใน 25 ปีกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในแต่ละปี มีค่าที่ตรงข้ามกัน กล่าวคือ ในปีแรกนี้มูลค่าของผลต่างจะมีมาก ก่อให้เกิดความเสียหายในปีต่อมา และมีมูลค่าน้อยที่สุดในปีสุดท้ายหรือปีที่ 25 ซึ่งผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีที่ 25 เท่ากับ 6,038.54 บาทต่อไร่ ในขณะที่ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยางในปีแรกเท่ากับ 139,561.88 บาทต่อไร่

8) การประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพารา จังหวัดสตูล (กรณีการผลิตในรูปแบบสด)

ผลการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากรขาวในยางพาราของจังหวัดสตูล (กรณีการผลิตในรูปแบบสด) พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายในรอบ 25 ปี ของเกยตกรัจหัวดสตูล ซึ่งศึกษารณิการผลิตในรูปแบบสด มีค่าเท่ากับ 815,451.96 บาทต่อไร่ และเมื่อถูกทำลายในอายุยางแต่ละปี พบว่า ในช่วงอายุยางปีแรกๆ มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าต่ำกว่ายางพาราอยุ่มาก โดยในปีแรกมีมูลค่าเท่ากับ 778,374.47 บาทต่อไร่ ในขณะที่ยางอายุ 25 ปี มีมูลค่าเท่ากับ 813,847.70 บาทต่อไร่ ทำให้ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อไม่ถูกทำลายเฉลี่ยใน 25 ปีกับ

เมื่อถูกทำลายในอายุยังไม่แต่ละปี มีค่าที่ต้องห้ามกัน ก่อตัวคือ ในปีแรกนั้นมูลค่าของผลต่างจะมีมาก ค่อยๆ น้อยลงในปีถัดมา และมีมูลค่าน้อยที่สุดในปีสุดท้ายหรือปีที่ 25 ซึ่งผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสูงที่เมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยังไม่ถึง 25 เท่ากับ 1,604.26 บาทต่อไร่ ในขณะที่ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันสูงที่เมื่อไม่ถูกทำลายกับเมื่อถูกทำลายในอายุยังไม่ถึง 37,077.49 บาทต่อไร่

5.2 ข้อเสนอแนะ

ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประมวลผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้

5.2.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

ผลจากการวิจัยที่สำคัญที่สุด คือ การสร้างความตระหนักให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่วิจัย หรือพื้นที่ข้างเคียง ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจทั่วไป ให้ทราบถึงผลกระทบทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นกับรายได้ของ ครัวเรือนเกษตรกร และสามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง ได้ หากการเข้าทำลายของโรครากราขานั้นไม่ได้รับการคุ้มครอง เอาใจใส่ และหาแนวทางในการแก้ไขให้ทันท่วงที

ภายใต้สภาพปัจจุบันของการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย และขอบเขตการวิจัยที่ได้ระบุไว้แล้วนั้น ข้อเสนอแนะบางประการที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อการแก้ปัญหา นั้น สามารถเสนอไว้เป็นเบื้องต้น ดังนี้

1) การสร้างองค์ความรู้เบื้องต้นให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ซึ่งผลจากการวิจัย พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดการเพื่อการป้องกัน ควบคุม หรือแก้ไขปัญหาจากโรครากรา ทั้งนี้เป็นเพราะเกษตรกรไม่มีความรู้เรื่องโรค ไม่มีความรู้ในการป้องกัน ควบคุม หรือแก้ไขปัญหา จากโรครากรา ดังนั้น การให้ความรู้ในเบื้องต้นแก่เกษตรกรเพื่อเป็นการป้องกัน ติดตาม และเฝ้าระวังการเข้าระบาดของโรค โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ซึ่งมีลักษณะภัยภาพที่อื้อต่อการระบาด จึงเป็นประเด็นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน การสร้างองค์ความรู้เหล่านี้สามารถกระทำได้ผ่านหน่วยงาน และองค์กรในท้องถิ่นที่มีอยู่ แต่อาจจะต้องมีการสร้างความร่วมมือในแนวนอนให้เกิดขึ้น

2) จากการประเมินความเสี่ยงหาย ซึ่งประเมินให้เห็นเป็นมูลค่าทางการเงินและเศรษฐกิจที่ เกษตรกรระดับครัวเรือนมีความเสี่ยงที่จะเสี่ยงหายได้ หากไม่มีการจัดการที่ถูกต้อง เหมาะสม และมี ประสิทธิภาพ ซึ่งในสภาพปัจจุบันการแก้ไขปัญหาการทำลายของเชื้อรากางขานนั้น ยังไม่มี วิธีการจัดการที่เด็ดขาด ดังนั้น หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยยาง มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ จำเป็นต้องหาวิธีการจัดการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากการจัดการด้วยสารเคมี ซึ่งมีจุดอ่อนคือ ราคาสูง และการจัดการใส่สารเคมีทั่วทั้งรากในดินนั้น อาจจะไม่คุ้มกับผลลัพท์ที่ได้ ฉะนั้นการใช้วิธีการเขตกรรมก่อนการปลูก เช่นการรื้อตอเก่าออกให้หมดรวมทั้งรากแล้วทำการปลูกทิ้ง และการขุดเช่าร่องระหว่างต้นที่เป็นโรคและไม่เป็นโรคออกจากกันเพื่อมิให้รากสัมผัสแพร่เชื้อกันได้ หรืออาจนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การปลูกพืชแบบผสมผสานหรือแบบป้ายางในสมัยก่อนมาบูรณาการ อาจเป็นการบรรเทาหรือแก้ปัญหา ที่มีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง

(3) การสำรวจพื้นที่ระบบของโรคนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่หรือแต่ละจังหวัด ควรมีการติดตามสำรวจเป็นระยะๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการระบาด เช่น ฤดูฝน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

5.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกัน และอยู่ร่วมกับโรครากรขาวอย่างเป็นมิตร

จากการพบปะพูดคุยกับเกษตรกรและนักวิชาการในวงการยางพาราและที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการสังเกตุโรคในแปลงปลูกจริง และผลจากการนำเสนอผลงานความก้าวหน้าของงานวิจัยกับนักวิชาการและคณาจารย์ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะเพื่อป้องกัน และอยู่ร่วมกับโรครากรขาวอย่างเป็นมิตร หรือการให้มีความเสียหายทั้งทางกายภาพและทางเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด ดังนี้

1) การเกิดโรครากรขาวในยาง พบร่วมกับความรุนแรงในรอบการปลูกรอบหลังๆ มากกว่าการปลูกรอบแรก (การปลูกในปีเดียวใหม่) ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะการปลูกรอบแรกนั้น เชื้อร้ายโรครากขาวตามธรรมชาติมีอยู่จำนวนน้อยกว่า จึงแสดงอาการของโรคไม่ชัดเจนจนเห็นผลกระทบได้

2) การเกิดโรครากรขาวมักจะพบในพื้นที่ที่มีความชื้นชื้นสูง ซึ่งหมายความว่าการเจริญเติบโตของเชื้อรากขาว ดังนั้นการปลูกยางในสภาพดังกล่าวควรจะมีการจัดการมากขึ้น

3) ควรมีการปลูกยางผสมผสานกับพืชชนิดอื่นๆ ที่มีใช้พืชอาศัยของเชื้อร้ายโรครากรขาว เกษตรกรท่านหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ทดลองปลูกพืชร่วมยาง เช่นผักเหลียง ตะเกียง และสามารถสังเกตเห็นได้ว่าการระบบของโรครากรขาวมีน้อยกว่าในแปลงที่ปลูกยางอย่างเดียว

4) ใน การเตรียมดินปลูกยางนั้น ควรไถนาตอยางเก่าและรากยางออกจนหมดและทำการปลูกทิ้ง พร้อมทั้งทำการตากดินให้แสงแดดพอเชื้อร้ายมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ก่อนลงมือทำการปลูก

5) จากการสังเกตุพบว่า โรค rak ขาวระบาดรุนแรงในยางพันธุ์ RRIM 600 มากกว่ายางพันธุ์พื้นเมือง และพันธุ์อื่นๆ จึงควรปลูกยางที่ต้านตอบเป็นยางพันธุ์พื้นเมืองที่สามารถพิสูจน์ได้ หรือปลูกยางหลายพันธุ์เปล่งเดียวกันเพื่อกระจายความเสี่ยง

6) เมื่อสังเกตเหตุการระบาดแก่ต้นยาง ทำการบุคคลร่องลึกถึงระดับรากเพื่อล้อมรอบ แยกต้นยางออกจากต้นอื่นๆ ที่อยู่รอบๆ เพื่อป้องกันการระบาดจาก根部ราก

5.2.3 ข้อเสนอแนะเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย

งานวิจัยในครั้งนี้เป็นการจุดประกายความจำเป็นของงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงสวัสดิการของเกษตรกรและของสังคมในภาพรวมที่จะสูญเสียไป ถ้าการเข้าทำลายของโรครากร้าวไม่สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที่ ซึ่งผลจากการวิจัยในครั้งนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงการสูญเสียที่เกิดขึ้นในเชิงเศรษฐกิจและสามารถนำไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและวงการวิชาการต่อไป โดยเฉพาะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1) เผยแพร่ความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเรื่อง “การประเมินความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจของโรครากร้าวในภาคใต้ของประเทศไทย”

2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกรมวิชาการเกษตรในประเด็นความความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจของโรครากร้าว ทั้งที่เกิดขึ้นต่อครัวเรือนเกษตรกร ต่อกฎหมาย และต่อประเทศชาติ ถ้าหากการดำเนินการแก้ไขไม่ได้มีการให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วน

3) เผยแพร่ความทางวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร หรือนิตยสารที่เข้าถึงเกษตรกรได้อย่างกว้างขวาง เช่น เคหะการเกษตร หรือวารสารทางการเกษตร อื่นๆ

4) นำเสนอทบทวนทางวิทยาศาสตร์ เช่น สถานีวิทยุ นก. สถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ อื่นๆ เพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรได้ทราบนักและรับรู้ถึงความเสี่ยหายทางเศรษฐกิจของโรครากร้าว ที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าไม่มีการป้องกันอย่างทันท่วงที่

5) นำเสนอรายการทางวิทยุและโทรทัศน์ สื่ออินเตอร์เน็ต และสื่อสื่อสื่อเลือกสรรอนิภส์ อื่นๆ ที่ดำเนินการโดยนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานการใช้สื่อเพื่อการส่งเสริมเกษตร และนักศึกษาซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ได้มีความตระหนักรู้และเตรียมพร้อมเพื่อการป้องกัน

6) จัดทำแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ผลงานและสร้างความตระหนักรู้ในสื่อทั้งทางการเงิน ต่อครัวเรือนเกษตรกร และทางเศรษฐกิจต่อสังคมและประเทศไทย โดยจัดทำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การส่งเสริมฯ การทำสวนยาง สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และ องค์การบริหารส่วนตำบล

- 7) เข้าร่วมในการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการถกเถียงในวงกว้างขึ้นตลอดทั้งให้มีการกำหนดประเด็นใหม่และต่อเนื่องจากผลงานวิจัยครั้งนี้
- 8) ข้อมูลที่ได้สามารถพัฒนาเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิจัยของนักศึกษาหรือนักวิจัย ในประเด็นที่สามารถขยายในเชิงนโยบายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแก้ไขปัญหาโรคภัยไข้ดูดี
- 9) เกษตรกรชาวสวนยางในภาคส่วนอื่นๆ ของประเทศ สามารถเดินทางมาศึกษาดูงานเพื่อดำเนินการป้องกันการระบาดของโรคภัยไข้ดูดีของตนเอง

เอกสารอ้างอิง

- กรวิท ดำรงไทย. 2545. ผลเสียหายทางเศรษฐกิจของไม้สักอายุ 30 ปี จากหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักในสวนป่าหัวใหญ่ อำเภอ จังหวัดลำปาง. เอกสารผลงานวิชาการ. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลผลิตป่าไม้ กรมป่าไม้.
- จตุรภิท จันทร์พิทักษ์. 2548. การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุน-ผลตอบแทนทางการเงินและการเศรษฐศาสตร์ระหว่างการทำสวนยางพารากับสวนไม้ยางพาราในจังหวัดสงขลา. สารนิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- นัตรศิริ ปะเพมลสิทธิ์. 2544. บทความสอดคล้อง. เมษายน-กุมภาพันธ์ 2544. (Online) Available: <http://www.watpon.com>. เข้าถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2554.
- บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เคลินิวส์. 2550. “ระวัง !! โรค rakha ในยางพารา”. หนังสือพิมพ์เคลินิวส์. ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2550.
- พชรินทร์ ศรีวารินทร์. 2545. ต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบของสวนยางขนาดเล็ก. ในการประชุมวิชาการยางพารา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2545 วันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2545 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ณ โรงเรมหนองคายแกรนด์ อ.เมือง จ.หนองคาย. 334-397. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยยาง.
- พงษ์เทพ ใจไชยกล. 2535. การศึกษาพืชอาศัยเชื้อรากของยางพารา. สาขา: ศูนย์วิจัยยางสงขลา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
- วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร. 2548. ค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจเมื่อเกิดการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย. เอกสารทางวิชาการ. กรุงเทพฯ: สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ.
- สถาบันทรัพยากรชัยฝั่ง. 2544. การจัดการพื้นที่ชุมชนนำของประเทศไทย. สาขา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 2544. การประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนส่งเสริมการทำการทำสวนยาง. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนส่งเสริมการทำการทำสวนยาง.
- สถาบันวิจัยยาง. 2549. โรคและศัตรูของพาราที่สำคัญในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

สถาบันวิจัยยาง 2553. ข้อมูลวิชาการยางพารา. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

สมพร อิศวราตนนท์. 2540. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: หลักและทฤษฎี. กรุงเทพฯ: KU/RPRM คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง. 2550. โครงการขาวในยางพารา. www.rubberthai.com/newspaper/late_news/2550/May50/29-05-01.htm เข้าถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2551

สุธี อินทรสกุล และบุญอาจ กฤณทรัพย์. 2531. ค่าใช้จ่ายในการทำสวนยาง. เอกสารวิชาการทำสวนยางในท้องถิ่นที่แห้งแล้ง. นบเชิงเทรา: ศูนย์วิจัยยางนบเชิงเทรา สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.

เสนอใจ ชั้นจิตต์. 2544. โครงการขาวของยางพารา. เอกสารเผยแพร่. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่.

อุยทธ์ นิสสภा. 2547. เศรษฐมิติเบื้องต้น. เอกสารประกอบคำสอน ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

darmán. ใจสุจิตร. 2541. โครงการขาว [*Rigidoporus lignosus* (Klotzsch) Imaz.] ของยางพารา และแนวทางการควบคุมโดยชีววิธี. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

อุไร จันทรประทิน. 2540. โครงการขาว รากแดง และรากสีน้ำตาลของยางพารา. วารสารกสิกร 70(3): 245-250.

Chee, K.H. 1990. Present status of rubber diseases and their control. **Rev. Plant Pathol.** 69: 423-430.

De Liyanage, A.S. 1977. Economics of white root disease control. **Bull. Rubber Res. Inst. Sri Lanka** 12: 51-57.

Gohet, E., Tran Van, C., Louanchi, M., and Despreaux, D. 1991. New developments in chemical control of white root disease of *Hevea brasiliensis* in Africa. **Crop Prot.** 10: 234-238.

Gaynor, P.E. and R.C. Kirkpatrick. 1994. **Introduction to Time-series Modeling and Forecasting in Business and Economics.** Singapore: McGraw-Hill.

Gujarati, D.N. and D.C. Porter. 2010. **Essentials of Econometrics.** Singapore: McGraw-Hill International Edition.

ເອກສາຣ໌ອ້າງອີງ (ຕໍ່ອ)

- Griffiths, W.E., R.C. hill and G.C. Lim. 2009. **Using Eviews for Principles of Econometrics.** New Jersey: John Willey & Sons.
- Nandris, D., Nicole, M. and Geiger, J.P. 1987. Root Rot Diseases. **Plant Disease.** 71(4): 298 – 305.
- Nandris, D., Nicole, M. and Geiger, J.P. 1988. Root-rot disease of the rubber tree in the Ivory Coast. 1. Severity, dynamics and characterization of epidemics. **Can. J. For. Res.** 18: 1248-1254.
- Nissapa, A. 1992. Planning for Agriculture Development in the Outer Lake of Songkhla Lake of Southern Thailand. Ph.D. Thesis University of New England. Armidale, Australia.
- Doran, H.E. and Guise, J.W.B 1984. **Single Equation Methods in Econometrics: Applied Regression Analysis.** Teaching Monograph Series3, University of New England, Armidale, Australia.
- Koutsoyiannis, K. 1983. **Theory of Econometrics**, second edition, Macmillan Press, Hong Kong.
- Ranjan, R. 2004. Economic Impacts of link Hibiscus Mealybug in Florida and the United States. Paper presented at The Annual International Agriculture Trade and Policy Center Conference December 7-8, 2004, at University of Florida.

ภาคผนวก ก

1. รายการเก็บพิกัดความที่ขึ้น พื้นที่ที่มีการระบุขาดของโครงการฯ

ลำดับที่	พื้นที่			พิกัด	
	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	X	Y
1	คลองโสตด	ท่าชนะ	สุราษฎร์ธานี	0498674	1057845
2	วังใหม่	เมือง	ชุมพร	0509591	1164656
3	กป.ร.	กระบุรี	ระนอง	0490644	1169399
4	พระโต๊ะ	พระโต๊ะ	ชุมพร	0487094	1092932
5	หน้าคุน	หลังสวน	ชุมพร	0506188	1088228
6	ทุ่งค่าวัด	ละแม	ชุมพร	0501276	1072969
7	พรหมโลก	พรหมคีรี	นครศรีธรรมราช	0592834	0938437
8	ลานสกา	ลานสกา	นครศรีธรรมราช	0588014	0916752
9	ปลายพะยะ	ปลายพะยะ	กระนี่	0489481	0948785
10	ช่อง	นาโยง	ตรัง	0584429	0830479
11	นาท่ามได้	เมือง	ตรัง	0562797	0847307
12	ย่านตาขาว	ย่านตาขาว	ตรัง	0575612	0820210
13	ควนกาหลง	ควนกาหลง	สตูล	0611614	0757423
14	นำผุด	ละงู	สตูล	0593456	0770989
15	ละงู	ละงู	สตูล	0593539	0756472
16	ท่าจิ้ว	เมือง	นครศรีธรรมราช	0592817	0937602
17	กำแพงเพชร	เมือง	นครศรีธรรมราช	0593261	0928464

2. แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

การประเมินความเสี่ยงจากโรคราษฎรของยางพาราในภาคใต้

ข้อมูลพิจัดดาวเทียม

พิกัด X= _____
Y= _____

ส่วนที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกร

ชื่อ姓名สกุลผู้ดูแลแบบสอบถาม _____ เมมอร์

โทรศัพท์ _____

หมู่บ้าน _____ ตำบล _____ อำเภอ _____

จังหวัด _____

อายุ _____ ปี จบการศึกษา _____ อาชีวภาพหลัก _____ อาชีพ _____

รอง _____

ส่วนที่ 2: ข้อมูลเกี่ยวกับยางพารา และการระบาดของโรคราษฎร

1. ขนาดเนื้อที่ปลูกยางพาราทั้งหมด _____ ไร่ จำนวน _____ แปลง

แปลง ที่	ขนาดเนื้อ ที่ (ไร่)	ร่องการ ผลิต ยางพารา	อายุ ยางพารา	พันธุ์ ยาง	ขอ สงเคราะห์ หรือไม่	ลักษณะการใช้พื้นที่ เดิมก่อนปลูกยาง	ประสบปัญหาโรค ราษฎรหรือไม่ (ระบุ จำนวนต้น)

2. ระบบการทำสวนยางพาราในปัจจุบันคืออะไร

() ระบบการปลูกยางอย่างเดียว (mono-crop)

() ระบบการปลูกยางกับพืชแซม (intercrop) (ระบุ) _____

() ระบบการปลูกยางแบบผสมผสาน (ระบุ) _____

3. เคยเปลี่ยนแปลงระบบการทำสวนยางพาราหรือไม่

() เคย () ไม่เคย

4. โครงการข่าวเป็นปัจจัยส่งผลต่อการเปลี่ยนระบบการทำสวนยางพารา

() ใช่ () ไม่ใช่ (ระบุ) _____

5. ในอนาคตจะเปลี่ยนระบบการทำสวนยางพาราหรือไม่

() เปลี่ยน () ไม่เปลี่ยน

โปรดให้ข้อมูลตามรายการในตารางข้างล่างนี้

ระบบการทำสวนยางพาราอะไรที่คิดจะเปลี่ยนไป ใช้ในอนาคต	เมื่อไหร่จะเริ่มเปลี่ยน (ระบุปี)	เหตุผลอะไรถึงจะเปลี่ยนระบบการทำสวน ยางพาราในอนาคต
() ระบบการปลูกยางอย่างเดียว		
() ระบบการปลูกยางกับพืชแซม (ระบุ)		
.....		
() ระบบการปลูกยางแบบผสมผสาน (ระบุ)		
.....		
() ปลูกพืชอื่นแทน เช่น ปาล์มน้ำมัน		
() อื่นๆ		

6. การระบาดของโรคราข้าว (จากพื้นที่ข้างพาราข้างต้น)

6.1 แปลงที่ _____

ลักษณะดิน _____

จำนวนต้นที่โคนทำลาย _____ (ต้น) กิตเป็น _____ % ของจำนวนทั้งหมด

เริ่มระบาดเมื่อใด (ระบุปี) _____

อัตราการระบาด _____ (ต้น/ปี)

ปีแรก _____ (ต้น/ปี)

ปีที่ 2-3 _____ (ต้น/ปี)

ปีที่ 4-ปัจจุบัน _____ (ต้น/ปี)

ช่วงที่ระบาดหนัก _____

การแก้ปัญหาในเบื้องต้น _____

หมายเหตุ การแก้ปัญหาในเบื้องต้น เช่น การใช้สารเคมี/การเบตกรรม

6.2 แปลงที่ _____

ลักษณะดิน _____

จำนวนต้นที่โคนทำลาย _____ (ต้น) คิดเป็น _____ % ของจำนวนทั้งหมด
เริ่มระบบเมื่อใด (ระบุปี) _____

อัตราการระบาด _____ (ต้น/ปี)

ปีแรก _____ (ต้น/ปี)

ปีที่ 2-3 _____ (ต้น/ปี)

ปีที่ 4-ปัจจุบัน _____ (ต้น/ปี)

ช่วงที่ระบาดหนัก _____

การแก้ปัญหาในเบื้องต้น _____

หมายเหตุ การแก้ปัญหาในเบื้องต้น เช่น การใช้สารเคมี/การเขตกรรม

6.3 แปลงที่ _____

ลักษณะดิน _____

จำนวนต้นที่โคนทำลาย _____ (ต้น) คิดเป็น _____ % ของจำนวนทั้งหมด

เริ่มระบบเมื่อใด (ระบุปี) _____

อัตราการระบาด _____ (ต้น/ปี)

ปีแรก _____ (ต้น/ปี)

ปีที่ 2-3 _____ (ต้น/ปี)

ปีที่ 4-ปัจจุบัน _____ (ต้น/ปี)

ช่วงที่ระบาดหนัก _____

การแก้ปัญหาในเบื้องต้น _____

หมายเหตุ การแก้ปัญหาในเบื้องต้น เช่น การใช้สารเคมี/การเขตกรรม

ส่วนที่ 3: การผลิต ต้นทุนและรายได้

1. การผลิต

1.1) จำนวนวันกรีดยางใน 1 ปี _____ วัน/ปี

1.2) วัสดุปุ่มูก () ต้นต่อหาง () ติดตาในแปลง () ต้นยางข้ามหาง

1.3) ท่านใช้สารเร่งน้ำยางหรือไม่ () ใช่ (ระบุ) _____ () ไม่ใช่ (เหตุผล) _____

1.4) ราคายางที่ได้รับเมื่อ 5 ปีที่แล้ว _____ บาท/กก.

1.5) ระบบการแบ่งสรรผลประโยชน์เมื่อมีการข้างแรงงานกรีดยาง

() 60: 40 () 55: 45 () 50: 50 () อื่นๆ (ระบุ) _____

1.6) รูปแบบผลผลิตที่ขาย

() ยางแผ่น

() นำเข้า

() อื่นๆ (ระบุ) _____

2. ผลผลิตและรายได้

รายการ	พื้นที่ (ไร่)	ผลผลิต (กก./ ไร่)	ราคา (บาท/ กก.)	รายได้ (บาท/ ปี)
แปลงที่				

3. ต้นทุนการผลิตยางพารา

รายการ	ระบุหน่วย	จำนวน (หน่วย/ ไร่/ ปี)	ราคាត่อ หน่วย	มูลค่า (บาท/ ไร่/ ปี)
ต้นทุนก่อนให้ผลผลิต (ปีที่ 1)				
พันธุ์ยาง	ตัน			
ปุ๋ยเคมี	กก.			
น้ำยอินทรีย์	กก.			
สารเคมีกำจัดวัชพืช	มล. หรือ กรัม			
แรงงานสำหรับปรับพื้นที่ปลูก (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
แรงงานในการบุคคลุน (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
แรงงานในการปลูก (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
แรงงานในการปลูกซ้อม (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
แรงงานในการใส่ปุ๋ย (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
แรงงานในการกำจัดวัชพืช (พ่นสารเคมี/ตัดหญ้า) (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
อื่น (ระบุ)				
ต้นทุนก่อนให้ผลผลิต (ปีที่ 2)				
ปุ๋ยเคมี	กก.			
น้ำยอินทรีย์	กก.			

สารเคมีกำจัดวัชพืช	มล. หรือ กรัม			
แรงงานสำหรับปรับพื้นที่ปลูก (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
แรงงานในการขุดหลุม (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
แรงงานในการปลูก (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
แรงงานในการปลูกซ่อม (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
แรงงานในการไถปุ๋ย (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
แรงงานในการกำจัดวัชพืช (พ่นสารเคมี/ตัดหญ้า) (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
อื่น (ระบุ)				
ต้นทุนก่อนให้ผลผลิต (ปีที่ 3)				
ปุ๋ยเคมี	กก.			
ปุ๋ยอินทรีย์	กก.			
สารเคมีกำจัดวัชพืช	มล. หรือ กรัม			
แรงงานสำหรับปรับพื้นที่ปลูก (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
แรงงานในการขุดหลุม (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
แรงงานในการปลูก (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
แรงงานในการปลูกซ่อม (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
แรงงานในการไถปุ๋ย (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
แรงงานในการกำจัดวัชพืช (พ่นสารเคมี/ตัดหญ้า) (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
อื่น (ระบุ)				
ต้นทุนก่อนให้ผลผลิต (ปีที่ 4)				
ปุ๋ยเคมี	กก.			
ปุ๋ยอินทรีย์	กก.			
สารเคมีกำจัดวัชพืช	มล. หรือ กรัม			
แรงงานสำหรับปรับพื้นที่ปลูก (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
แรงงานในการขุดหลุม (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
แรงงานในการปลูก (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
แรงงานในการปลูกซ่อม (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
แรงงานในการไถปุ๋ย (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
แรงงานในการกำจัดวัชพืช (พ่นสารเคมี/ตัดหญ้า) (จ้าง/ทำเอง)	วัน			

หญ้า) (จ้าง/ทำเอง)				
อื่น (ระบุ)				
ต้นทูนก่อนให้ผลผลิต (ปีที่ 5)				
ปุ๋ยเคมี	กก.			
ปุ๋ยอินทรีย์	กก.			
สารเคมีกำจัดวัชพืช	มล. หรือ กรัม			
แรงงานสำหรับปรับพื้นที่ปลูก (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
แรงงานในการบุคคลุ่ม (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
แรงงานในการปลูก (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
แรงงานในการปลูกซ้อม (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
แรงงานในการใส่ปุ๋ย (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
แรงงานในการกำจัดวัชพืช (พ่นสารเคมี/ตัดหญ้า) (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
อื่น (ระบุ)				
ต้นทูนก่อนให้ผลผลิต (ปีที่ 6)				
ปุ๋ยเคมี	กก.			
ปุ๋ยอินทรีย์	กก.			
สารเคมีกำจัดวัชพืช	มล. หรือ กรัม			
แรงงานสำหรับปรับพื้นที่ปลูก (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
แรงงานในการบุคคลุ่ม (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
แรงงานในการปลูก (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
แรงงานในการปลูกซ้อม (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
แรงงานในการใส่ปุ๋ย (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
แรงงานในการกำจัดวัชพืช (พ่นสารเคมี/ตัดหญ้า) (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
อื่น (ระบุ)				
ระยะให้ผลผลิต (ปีที่ 7-25)				
ปุ๋ยเคมี	กก.			
ปุ๋ยอินทรีย์	กก.			
สารเคมีกำจัดวัชพืช	มล. หรือ กรัม			
นำมัน				

ถ่านหิน หรือ แบตเตอรี่				
กรดนำส้ม (ทำเน่น)				
แรงงานในการกวาด (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
แรงงานในการใส่ปุ๋ย (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
แรงงานในการกำจัดวัชพืช (พ่นสารเคมี/ตัดหญ้า) (จ้าง/ทำเอง)	วัน			
อื่น (ระบุ)				

4. การจัดการโรคภัย

4.1 เปอร์เซ็นต์ผลผลิตยางพาราที่สูญเสียจากการทำลายของโรค _____ %

4.2 โปรดให้ข้อมูลการใช้สารเคมีกำจัดโรคในตารางข้างล่างนี้

ประเภทของสารเคมี	การใช้สารเคมี						
	มล.,กรัม/ไร่	ราคา/หน่วย	ค่าแรง		ความถี่ในการใช้	แนวโน้มการใช้สารเคมี	ระดับความเหมาะสม
			ทำเอง	จ้าง			

หมายเหตุ 1. ระดับความเหมาะสม () เหมาะสม () มากเกินไป () ไม่เพียงพอ () ไม่รู้

2. แนวโน้มการใช้สารเคมี () เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว () เพิ่มขึ้น () ไม่เปลี่ยนแปลง () ลดลง

4.3 หากไม่ปลูกยางพาราในพื้นที่ดังกล่าว คิดว่าควรจะปลูกพืชชนิดใดได้บ้าง _____

ประมาณการรายได้ที่ควรจะได้รับจากการปลูกพืชดังกล่าว _____ บาท

5. ข้อเสนอแนะที่มีต่อโรค rakha ในยางพารา

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปป้ายang แผ่นดิน จังหวัดกระนี ปีที่ 1 -12

รายการ /ปีที่	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
ภาษีบำรุงท้องที่	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ต้นทุน													
ต้นทุนช่วงยางไม้ให้ผลผลิต													
ค่าปรับเพิ่มที่ (ค่าໄก เม้าปูน)	762.50												
วางแผน	133.88												
บุคลลุม	249.90												
ไส้ปูยรองกัน	133.63												
ค่าพันธุ์ยาง	960.50												
ค่านรงงานปลูก	143.65												
การปลูกซ่อน		224.31											
การตัดแต่ง		157.25	157.25	157.25									
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)		113.75	288.75	288.75									
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)		0.00	78.75	78.75	450.00	450.00	450.00						
ค่าปูยบำรุงดืนยาง (เคมี)		692.30	923.07	980.76	212.50	312.60	278.21						
ค่าปูยบำรุงดืนยาง (อินทรีย์)		1,615.38	1,615.38	0.00	346.84								
ค่านรงงานใส่ปูย		196.35	196.35	196.35	10.20	10.20	10.20						
ต้นทุนช่วงยางให้ผลผลิต													
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)													
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)								450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
ค่าปูยบำรุงดืนยาง (เคมี)								278.21	278.21	278.21	278.21	278.21	278.21
ค่าปูยบำรุงดืนยาง (อินทรีย์)													
ค่านรงงานใส่ปูย								10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปป้ายangแผ่นดิน จังหวัดกระนี่ ปีที่ 1 -12 (ต่อ)

รายการ / ปีที่	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
ต้นทุนในการเก็บ กรณ และการ ทำแผ่น													
คงเหลียงแบบเดอร์รี่													
มีค่าเดียง													
หินลับมีด													
ค่าซ่อมลับมีด													
อุปกรณ์การเก็บน้ำย่าง													
ถ้วยรองน้ำย่าง							162.50						
ช้อนย่าง							26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	
ถังเก็บน้ำย่าง													
ไม้กวาดย่าง													
อุปกรณ์ในการทำย่าง													
ถังรวมน้ำย่าง							16.25						
ตะเกียงย่าง							140.00						
ตะแกรงรองย่าง							7.50				7.50		
ตะแกรงรองน้ำย่าง							3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	
ขากวีดย่าง							1,937.50						
โรงเรือน							1,482.00						
น้ำกรด(90 ลิตร)							140.63	140.63	140.63	140.63	140.63	140.63	
ไม้ตากย่าง							1.56			1.56		1.56	
ค่าแรงงานที่คือ							1,857.35	1,857.35	3,951.81	3,951.81	4,440.24	4,440.24	

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปป้ายang แผ่นดิน จังหวัดกระนี่ ปีที่ 1 -12 (ต่อ)

รายการ / ปีที่	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
ต้นทุนรวม	2,384.05	2,999.34	3,259.55	1,701.86	1,019.54	772.80	738.41	6,513.45	2,766.14	4,862.16	4,860.60	5,358.09	5,349.03
discount rate	1.00	0.94	0.88	0.83	0.78	0.73	0.69	0.65	0.61	0.57	0.54	0.51	0.48
ต้นทุนรวมหลังปรับค่าตามเวลา	2,384.05	2,819.46	2,880.30	1,413.66	796.09	567.24	509.49	4,224.65	1,686.53	2,786.69	2,618.72	2,713.62	2,546.57
ผลตอบแทน													
เงินอุดหนุนจากกองทุน													
ลงเคราะห์	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00						
ยางแผ่นดิน								3,714.70	3,714.70	7,903.63	7,903.63	8,880.48	8,880.48
ไม้ยางพารา													
ผลตอบแทนรวม	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	3,714.70	3,714.70	7,903.63	7,903.63	8,880.48	8,880.48
discount rate	1.00	0.94	0.88	0.83	0.78	0.73	0.69	0.65	0.61	0.57	0.54	0.51	0.48
ผลตอบแทนรวมหลังปรับค่า													
ตามเวลา	1,833.00	1,723.07	1,619.73	1,522.59	1,431.27	1,345.43	1,264.74	2,409.37	2,264.88	4,529.88	4,258.20	4,497.56	4,227.82
ผลตอบแทนสูตรมิตรละปี	-551.05	-1,096.39	-1,260.57	108.93	635.18	778.19	755.25	-1,815.28	578.35	1,743.18	1,639.48	1,783.93	1,681.26

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปป้ายang แผ่นดิน จังหวัดกรุงศรีฯ ปีที่ 13 -25

รายการ / ปีที่	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00
ภาษีบำรุงท้องที่	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ทันทูน													
ต้นทุนช่วงยางไม้ไผ่ผลิต													
ค่าปรับพื้นที่ (ค่าໄไอ เผาปรน)													
วางแผน													
บุคลลุม													
ไส่ปูย์รองกัน													
ค่าพันธุ์ยาง													
ค่าแรงงานปลูก													
การปลูกซ่อม													
การตัดแต่ง													
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)													
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)													
ค่าปูย์บำรุงดินยาง (เคมี)													
ค่าปูย์บำรุงดินยาง (อินทรีช)													
ค่าแรงงานไส่ปูย													
ต้นทุนช่วงยางไม้ไผ่ผลิต													
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)													
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
ค่าปูย์บำรุงดินยาง (เคมี)	278.21	278.21	278.21	278.21	278.21	278.21	278.21	278.21	278.21	278.21	278.21	278.21	278.21
ค่าปูย์บำรุงดินยาง (อินทรีช)													
ค่าแรงงานไส่ปูย	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปป้ายangแผ่นดิน จังหวัดกระนี ปีที่ 13 -25 (ต่อ)

รายการ / ปีที่	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00
ต้นทุนในการเก็บ กรณี และการ ท่านผ่อน													
คงเดิมแบบเดอร์รี่													
มีค่าดีดกลาง													
หินลับมีด													
ค่าจ้างลับมีด													
ค่าไฟชาร์จหม้อแปลง													
อุปกรณ์การเก็บน้ำยาang													
ถัวรองน้ำยาang					146.25								
ช้อนยาang	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
ถังเก็บน้ำยาang													
ไม้คาดยาang													
อุปกรณ์ในการทำยาang													
ถังรวมน้ำยาang			16.25								6.09		
คงเหลือยาang					126.00								
คงเหลือยาang			7.50				7.50				5.63		
ลวดกรองน้ำยาang	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75
ขักรีดยาang										516.70			
โรงเรือน													
น้ำกรด(90 ลิตร)	140.63	140.63	140.63	140.63	140.63	140.63	140.63	140.63	140.63	140.63	140.63	140.63	140.63
ไม้ตากยาang	1.56		1.56		1.56		1.56		1.56		1.56		1.56
ค่าแรงงานที่กู้ด	4,440.24	4,440.24	4,440.24	4,995.27	4,995.27	4,995.27	4,995.27	4,995.27	4,440.24	4,440.24	4,440.24	4,440.24	4,440.24

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนยังพารา ในรูปป้ายang แผ่นดิน จังหวัดกรุงศรีฯ ปีที่ 13 -25 (ต่อ)

รายการ / ปีที่	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00
ต้นทุนรวม	5,350.59	5,349.03	5,374.34	5,904.06	6,177.87	5,904.06	5,913.12	5,904.06	5,350.59	5,865.73	5,362.31	5,349.03	5,350.59
discount rate	0.45	0.42	0.40	0.37	0.35	0.33	0.31	0.29	0.27	0.26	0.24	0.23	0.21
ต้นทุนรวมหลังปรับค่าตามเวลา	2,394.54	2,250.27	2,125.32	2,194.78	2,158.83	1,939.41	1,825.90	1,713.76	1,459.96	1,504.53	1,292.92	1,212.37	1,139.99
ผลตอบแทน													
เงินอุดหนุนจากกองทุน สังเคราะห์													
ยางเพ่นดิน	8,880.48	8,880.48	8,880.48	9,990.54	9,990.54	9,990.54	9,990.54	9,990.54	8,880.48	8,880.48	8,880.48	8,880.48	8,880.48
ไม้ยางพารา													80,000.00
ผลตอบแทนรวม	8,880.48	8,880.48	8,880.48	9,990.54	9,990.54	9,990.54	9,990.54	9,990.54	8,880.48	8,880.48	8,880.48	8,880.48	88,880.48
discount rate	0.45	0.42	0.40	0.37	0.35	0.33	0.31	0.29	0.27	0.26	0.24	0.23	0.21
ผลตอบแทนรวมหลังปรับค่า ตามเวลา	3,974.26	3,735.91	3,511.86	3,713.89	3,491.16	3,281.78	3,084.96	2,899.94	2,423.13	2,277.81	2,141.20	2,012.78	18,936.81
ผลตอบแทนสุทธิแต่ละปี	1,579.73	1,485.64	1,386.53	1,519.11	1,332.32	1,342.36	1,259.06	1,186.18	963.17	773.27	848.28	800.41	17,796.81

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปเศษย่าง จังหวัดกระนี่ ปีที่ 1 - 12

รายการ / ปีที่	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
ภาษีบำรุงท้องที่	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ต้นทุน													
ต้นทุนช่วงยางไม้ไผ่ผลิต													
ค่าปรับเพิ่มที่ (ค่าໄโล เพาปรน)	700.00												
วางแผน	425.00												
บุคลลุม	425.00												
ไส้ปุ๋ยรองกัน	105.00												
ค่าพันธุ์ยาง	525.00												
ค่าแรงงานปลูก	59.50												
การปลูกซ่อม		355.00	355.00	355.00									
การตัดแต่ง		170.00	170.00	170.00									
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)		102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00						
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)													
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (เคมี)		420.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00						
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (อินทรีย์)													
ค่าแรงงานไส้ปุ๋ย		107.10	107.10	107.10	107.10	107.10	107.10						
ต้นทุนช่วงยางไม้ไผ่ผลิต													
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)								102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)													
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (เคมี)								396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (อินทรีย์)													
ค่าแรงงานไส้ปุ๋ย								107.10	107.10	107.10	107.10	107.10	107.10

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปเศษย่าง จังหวัดกระนี่ ปีที่ 1 – 12 (ต่อ)

รายการ / ปีที่	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
ต้นทุนในการเก็บ กรณี และการทำ แม่น													
ตະເກີຍແບບເດອຣີ								15.00					15.00
ມືດກົດຍາງ								18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70
ຫິນລັບມືດ								2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
ຄ່າວ້າງລັບມືດ								170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00
ຄ່າໄຟທີ່ຈໍານວັນແບດ								196.80	196.80	196.80	196.80	196.80	196.80
ອຸປະກິດການເກີບນ້າຍາງ													
ຄ້ວາຮອງນ້າຍາງ								375.00					
ໜ້ອນຍາງ								30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
ຄັງກຶນນ້າຍາງ								1.30			1.30		
ໄມ້ຕາດຍາງ								2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
ອຸປະກິດໃນການທໍາຍາງ													
ຄັງຮວມນ້າຍາງ								8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
ຕະກອງຍາງ													
ຕະແກຮງຮອງຍາງ													
ລວດກອງນ້າຍາງ													
ຈັກກົດຍາງ													
ໂຮງເວັນ													
ນໍ້າກຽດ(90 ຄິຕຣ)													
ໄມ້ຕາດຍາງ													
ຄ່າແຮງງານທີ່ກົດ								1,867.53	1,867.53	3,524.00	3,524.00	3,960.00	3,960.00

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปเศษย่าง จังหวัดกระนี่ ปีที่ 1 – 12 (ต่อ)

รายการ / ปีที่	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
ต้นทุนรวม	2,239.50	1,154.10	1,130.10	1,130.10	605.10	605.10	605.10	3,291.43	2,900.13	4,556.60	4,557.90	4,992.60	5,007.60
discount rate	1.00	0.94	0.88	0.83	0.78	0.73	0.69	0.65	0.61	0.57	0.54	0.51	0.48
ต้นทุนรวมหลังปรับค่าตามเวลา	2,239.50	1,084.88	998.61	938.72	472.48	444.15	417.51	2,134.84	1,768.23	2,611.57	2,455.64	2,528.52	2,384.02
ผลตอบแทน													
เงินอุดหนุนจากกองทุน สังเคราะห์	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00						
เศษย่าง								3,735.06	3,735.06	7,048.00	7,048.00	7,920.00	7,920.00
ไม้ขางพารา													
ผลตอบแทนรวม	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	3,735.06	3,735.06	7,048.00	7,048.00	7,920.00	7,920.00
discount rate	1.00	0.94	0.88	0.83	0.78	0.73	0.69	0.65	0.61	0.57	0.54	0.51	0.48
ผลตอบแทนรวมหลังปรับค่าตาม เวลา	1,833.00	1,723.07	1,619.73	1,522.59	1,431.27	1,345.43	1,264.74	2,422.58	2,277.29	4,039.49	3,797.22	4,011.12	3,770.56
ผลตอบแทนสุทธิแต่ละปี	-406.50	638.18	621.12	583.87	958.79	901.29	847.23	287.74	509.06	1,427.92	1,341.58	1,482.59	1,386.54

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปเศษย่าง จังหวัดกระนี่ ปีที่ 13 - 25

รายการ / ปีที่	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00
ภาษีบำรุงท้องที่	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
หันทุน													
ต้นทุนช่วงยางไม้ไผ่ผลิต													
ค่าปรับเพิ่มที่ (ค่าໄใจ เพาปรน)													
วางแผน													
บุคลลุน													
ไส้ปุ๋ยรองกัน													
ค่าพันธุ์ยาง													
ค่าแรงงานปลูก													
การปลูกซ่อม													
การตัดแต่ง													
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)													
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)													
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (เคมี)													
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (อินทรีย์)													
ค่าแรงงานไส้ปุ๋ย													
ต้นทุนช่วงยางไม้ไผ่ผลิต													
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)													
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (เคมี)	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (อินทรีย์)													
ค่าแรงงานไส้ปุ๋ย	107.10	107.10	107.10	107.10	107.10	107.10	107.10	107.10	107.10	107.10	107.10	107.10	107.10

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปเศษย่าง จังหวัดกระนี่ ปีที่ 13 – 25 (ต่อ)

รายการ / ปีที่	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00
ต้นทุนในการเก็บ ครีด และการทำ แม่น													
ตະເກີຍແບດເຕອຮົ່ງ					15.00					12.00			
ມືດກີດຍາງ	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70
ຫິນລັບມືດ	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
ຄໍາຈ້າງລັບມືດ	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00
ຄໍາໄຟທີ່ຈ່າຍມືດ	196.80	196.80	196.80	196.80	196.80	196.80	196.80	196.80	196.80	196.80	196.80	196.80	196.80
ອຸປະກິດກີດຍາງ													
ຄໍ້າຂະອງນໍ້າຍາງ					337.50								
ໜ້ອນຍາງ	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
ຄັ້ງກິນນໍ້າຍາງ	1.30			1.30			1.30			1.30			1.30
ໄມ້ຕາກຍາງ	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
ອຸປະກິດໃນການທໍາຍາງ													
ຄັ້ງຮວມນໍ້າຍາງ	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
ຕະກອງຍາງ													
ຕະແກຮງຮອງຍາງ													
ລວດກອງນໍ້າຍາງ													
ຈັກວິດຍາງ													
ໂຮງເຈືອນ													
ນໍ້າກຽດ(90 ຄິຕຣ)													
ໄມ້ຕາກຍາງ													
ຄໍາແຮງງານທີ່ກີດ	3,960.00	3,960.00	3,960.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปเศษย่าง จังหวัดกระนี่ ปีที่ 13 – 25 (ต่อ)

รายการ / ปีที่	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00
ต้นทุนรวม	4,993.90	4,992.60	4,992.60	8,233.90	8,585.10	8,232.60	8,233.90	8,232.60	4,992.60	5,005.90	4,992.60	4,992.60	4,993.90
discount rate	0.45	0.42	0.40	0.37	0.35	0.33	0.31	0.29	0.27	0.26	0.24	0.23	0.21
ต้นทุนรวมหลังปรับค่าตามเวลา	2,234.91	2,100.33	1,974.36	3,060.88	3,000.03	2,704.31	2,542.53	2,389.67	1,362.28	1,283.99	1,203.78	1,131.58	1,064.00
ผลตอบแทน													
เงินอุดหนุนจากกองทุน สังเคราะห์													
เสียหาย	7,920.00	7,920.00	7,920.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00
ไม่เสียหายพารา													80,000.00
ผลตอบแทนรวม	7,920.00	7,920.00	7,920.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	87,920.00
discount rate	0.45	0.42	0.40	0.37	0.35	0.33	0.31	0.29	0.27	0.26	0.24	0.23	0.21
ผลตอบแทนรวมหลังปรับค่า ตามเวลา	3,544.42	3,331.85	3,132.03	5,353.07	5,032.02	4,730.24	4,446.55	4,179.87	2,161.05	2,031.45	1,909.61	1,795.09	18,732.17
ผลตอบแทนสุทธิเต็ลลี่	1,309.51	1,231.52	1,157.66	2,292.19	2,031.99	2,025.92	1,904.02	1,790.20	798.77	747.45	705.83	663.50	17,668.17

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปป้ายangแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีที่ 1 -12

รายการ / ปีที่	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
ภาษีบำรุงท้องที่	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ต้นทุน													
ต้นทุนช่วงยางไม้ไผ่ผลผลิต													
ค่าปรับเพิ่มที่ (ค่าໄໂຄ ເພາປັນ)	583.33												
วางแผน	176.73												
บุคลลุม	268.70												
ไส້ໜ່ອງກັນ	12.67												
ค่าพันธุ์ยาง	313.33												
ค่าแรงงานปลูก	105.79												
การปลูกซ้อม		353.19											
การตัดแต่ง		212.00	212.00	212.00									
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)	250.00	240.00	166.89	133.56	20.67	22.26							
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)		228.00	0.00	24.00	32.00	0.00	0.00						
ค่าปື້ນบำรุงดืนยาง (เคมี)	95.04	210.00	429.84	522.00	706.67	941.08							
ค่าปື້ນบำรุงดืนยาง (อินทรีย์)													
ค่าแรงงานไส້ໜ່າ		38.69	38.69	38.69	38.69	42.40	45.58						
ต้นทุนช่วงยางไม้ไผ่ผลผลิต													
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)								17.03	17.03	17.03	17.03	17.03	17.03
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)								70.00					
ค่าปື້ນบำรุงดืนยาง (เคมี)								1,723.33	1,723.33	1,723.33	1,723.33	1,723.33	1,723.33
ค่าปື້ນบำรุงดืนยาง (อินทรีย์)													
ค่าแรงงานไส້ໜ່າ								42.40	42.40	42.40	42.40	42.40	42.40

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปป้ายangแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีที่ 1 -12 (ต่อ)

รายการ / ปีที่	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
ต้นทุนในการเก็บ ครีด และการทำแม่น													
คงเทิบengแบบเดอร์รี่													
มีดกรีดยาง													
หินลับมีด													
ค่าเจ้างลับมีด													
ค่าไฟชาร์จหม้อแบบ													
อุปกรณ์การเก็บน้ำยาง													
ถ้วยรองน้ำยาง							385.00						
ช้อนยาง							29.20	29.20	29.20	29.20	29.20	29.20	
ถังเก็บน้ำยาง							1.30			1.30			
ไม้กวาดยาง													
อุปกรณ์ในการทำยาง													
ถังรวมน้ำยาง							54.13						
ตะกงยาง							76.00						
ตะแกรงรองยาง							3.88			3.88			
ลวดครอบน้ำยาง							1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	
ขักรีดยาง							310.95						
โรงเรือน							1,058.87						
น้ำกรด(90 ลิตร)							91.44	91.44	91.44	91.44	91.44	91.44	
ไม้ดักยาง							2.75		2.75		2.75		
ค่าแรงงานที่กรีด							2,010.68	2,010.68	3,793.74	3,793.74	4,262.63	4,262.63	

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปป้ายang แผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีที่ 1 -12 (ต่อ)

รายการ / ปีที่	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
ต้นทุนรวม	1,460.56	1,176.92	700.69	871.42	726.25	769.74	1,008.92	5,878.73	3,915.86	5,701.67	5,700.22	6,174.44	6,167.81
discount rate	1.00	0.94	0.88	0.83	0.78	0.73	0.69	0.65	0.61	0.57	0.54	0.51	0.48
ต้นทุนรวมหลังปรับค่าตามเวลา	1,460.56	1,106.33	619.16	723.85	567.08	564.99	696.14	3,812.98	2,387.52	3,267.85	3,071.09	3,127.07	2,936.37
ผลตอบแทน													
เงินอุดหนุนจากกองทุน สงเคราะห์	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00						
ยางแผ่นดิน								5,026.70	5,026.70	9,484.35	9,484.35	10,656.58	10,656.58
ไม้ย่างพารา													
ผลตอบแทนรวม	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	5,026.70	5,026.70	9,484.35	9,484.35	10,656.58	10,656.58
discount rate	1.00	0.94	0.88	0.83	0.78	0.73	0.69	0.65	0.61	0.57	0.54	0.51	0.48
ผลตอบแทนรวมหลังปรับค่าตาม เวลา	1,833.00	1,723.07	1,619.73	1,522.59	1,431.27	1,345.43	1,264.74	3,260.34	3,064.81	5,435.85	5,109.84	5,397.07	5,073.39
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยปี	372.44	616.74	1,000.57	798.74	864.19	780.44	568.60	-552.63	677.28	2,168.00	2,038.76	2,270.00	2,137.01

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปป้ายang แผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีที่ 13 - 25

รายการ / ปีที่	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00
ภาษีบำรุงท้องที่	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ต้นทุน													
ต้นทุนช่วงยางไม้ให้ผลผลิต													
ค่าปรับพื้นที่ (ค่าไถ่ เมาปวน)													
วางแผน													
บุคลลุม													
ไส้ปูยรองก้น													
ค่าพันธุ์ยาง													
ค่าแรงงานปลูก													
การปลูกซ้อม													
การตัดแต่ง													
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)													
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)													
ค่าปูยบำรุงดินยาง (เคมี)													
ค่าปูยบำรุงดินยาง (อินทรีย์)													
ค่าแรงงานไส้ปูย													
ต้นทุนช่วงยางให้ผลผลิต													
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)	17.03	17.03	17.03	17.03	17.03	17.03	17.03	17.03	17.03	17.03	17.03	17.03	17.03
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)													
ค่าปูยบำรุงดินยาง (เคมี)	1,723.33	1,723.33	1,723.33	1,723.33	1,723.33	1,723.33	1,723.33	1,723.33	1,723.33	1,723.33	1,723.33	1,723.33	1,723.33
ค่าปูยบำรุงดินยาง (อินทรีย์)													
ค่าแรงงานไส้ปูย	42.40	42.40	42.40	42.40	42.40	42.40	42.40	42.40	42.40	42.40	42.40	42.40	42.40

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปป้ายangแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีที่ 13 - 25 (ต่อ)

รายการ / ปีที่	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00
ต้นทุนในการเก็บ คธีด และการ ทำหนี้													
คงเหลือ													
มีคธีด													
หินลับมีด													
ค่าจ้างลับมีด													
ค่าไฟฟ้าร่องน้ำเบต													
อุปกรณ์การเก็บน้ำย่าง													
ถังรองน้ำย่าง					346.50								
ช้อนย่าง	29.20	29.20	29.20	29.20	29.20	29.20	29.20	29.20	29.20	29.20	29.20	29.20	29.20
ถังเก็บน้ำย่าง	1.30			1.30			1.30			1.30			1.30
ไม้คาดย่าง													
อุปกรณ์ในการทำย่าง													
ถังรวมน้ำย่าง			54.13							20.30			
ตะเกียงย่าง					68.40								
ตะแกรงรองย่าง			3.88				3.88				2.91		
ลวดครองน้ำย่าง	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78
ขักรีดย่าง										82.92			
ໄวงเรือน													
น้ำกรด(90 ลิตร)	91.44	91.44	91.44	91.44	91.44	91.44	91.44	91.44	91.44	91.44	91.44	91.44	91.44
ไม้ตากย่าง	2.75		2.75		2.75		2.75		2.75		2.75		2.75
ค่าแรงงานที่คธีด	4,262.63	4,262.63	4,262.63	8,563.32	8,563.32	8,563.32	8,563.32	8,563.32	4,262.63	4,262.63	4,262.63	4,262.63	4,262.63

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปป้ายang แผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีที่ 13 - 25 (ต่อ)

รายการ / ปีที่	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00
ด้วยทุนรวม	6,171.86	6,167.81	6,228.56	10,469.80	10,886.15	10,468.50	10,476.43	10,468.50	6,170.56	6,252.03	6,193.77	6,167.81	6,171.86
discount rate	0.45	0.42	0.40	0.37	0.35	0.33	0.31	0.29	0.27	0.26	0.24	0.23	0.21
ด้วยทุนรวมหลังปรับค่าตามเวลา	2,762.08	2,594.73	2,463.13	3,892.05	3,804.12	3,438.78	3,234.99	3,038.68	1,683.70	1,603.62	1,493.40	1,397.95	1,314.97
ผลตอบแทน													
เงินอุดหนุนจากกองทุน สงเคราะห์													
ขาดทุนเดือน	10,656.58	10,656.58	10,656.58	21,408.30	21,408.30	21,408.30	21,408.30	21,408.30	10,656.58	10,656.58	10,656.58	10,656.58	10,656.58
ไม่ข้างพารา													80,000.00
ผลตอบแทนรวม	10,656.58	10,656.58	10,656.58	21,408.30	21,408.30	21,408.30	21,408.30	21,408.30	10,656.58	10,656.58	10,656.58	10,656.58	90,656.58
discount rate	0.45	0.42	0.40	0.37	0.35	0.33	0.31	0.29	0.27	0.26	0.24	0.23	0.21
ผลตอบแทนรวมหลังปรับค่าตาม เวลา	4,769.12	4,483.09	4,214.23	7,958.34	7,481.05	7,032.38	6,610.62	6,214.16	2,907.76	2,733.37	2,569.44	2,415.34	19,315.22
ผลตอบแทนสุทธิโดยรวม	2,007.03	1,888.37	1,751.09	4,066.29	3,676.92	3,593.60	3,375.63	3,175.48	1,224.05	1,129.75	1,076.04	1,017.39	18,000.25

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปป้ายang แผ่นดิน จังหวัดตรัง ปีที่ 1 -12

รายการ /ปีที่	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ภาษีบำรุงท้องที่	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ทันทูน													
ต้นทุนช่วงยางไม้ไผ่ผลิต													
ค่าปรับเพิ่มที่ (ค่าໄใจ เพาปรน)	250.00												
วางแผน	64.80												
บุคลลุม	532.00												
ไส้ปุ๋ยรองกัน	0.00												
ค่าพันธุ์ยาง	1064.00												
ค่าแรงงานปลูก	90.90												
การปลูกซ่อม		144.56											
การตัดแต่ง		128.25	128.25	128.25									
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)		220.32	14.58	14.58	14.58	14.58	14.58						
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)													
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (เคมี)		727.20	909.00	927.18	927.18	927.18	927.18						
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (อินทรีย์)													
ค่าแรงงานไส้ปุ๋ย		29.16	29.16	29.16	29.16	29.16	29.16						
ต้นทุนช่วงยางไม้ไผ่ผลิต													
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)								14.58	14.58	14.58	14.58	14.58	14.58
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)													
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (เคมี)								927.18	927.18	927.18	927.18	927.18	927.18
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (อินทรีย์)													
ค่าแรงงานไส้ปุ๋ย								29.16	29.16	29.16	29.16	29.16	29.16

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปป้ายangแผ่นดิน จังหวัดตรัง ปีที่ 1 -12 (ต่อ)

รายการ / ปีที่	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ต้นทุนในการเก็บ กรีด และการทำ แม่น													
ตະເກີຍແບບເດອຮັ້ງ								44.40					44.40
ມືດກຣີດຍາງ								43.30	43.30	43.30	43.30	43.30	43.30
ທິນລັບມືດ								5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ຄ່າຈ້າງລັບມືດ								546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75
ຄ່າໄຟ່ຈຳນວນມືດ								97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
ອຸປະກົດການເກີບນໍ້າຍາງ													
ສ້າງຮອນນໍ້າຍາງ								22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50
ຂ້ອນຍາງ								30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
ຄັ້ງເກີບນໍ້າຍາງ								9.80			9.80		
ໄນ້ກວດຍາງ								4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
ອຸປະກົດໃນການທໍາຍາງ													
ຄັ້ງຮວມນໍ້າຍາງ								85.10					
ຕະກອງຍາງ								140.00					
ຕະແກຮງຮອງຍາງ								7.50				7.50	
ລວດກອງນໍ້າຍາງ								3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75
ຈັກກຣີດຍາງ								1,937.50					
ໄຮງເຮືອນ								1,482.00					
ນໍາກຽດ(90 ລິຕຣ)								140.63	140.63	140.63	140.63	140.63	140.63
ໄນ້ຕາກຍາງ								1.56		1.56		1.56	
ຄ່າແຮງງານທີ່ກຣີດ								1,783.06	1,783.06	3,793.74	3,793.74	4,262.63	4,262.63

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปป้ายangแผ่นดิน จังหวัดตั้ง ปีที่ 1 -12 (ต่อ)

รายการ /ปีที่	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ต้นทุนรวม	2001.70	1249.49	1080.99	1099.17	970.92	970.92	970.92	7354.96	3647.10	5659.35	5667.59	6135.74	6171.08
discount rate	1.00	0.94	0.88	0.83	0.78	0.73	0.69	0.65	0.61	0.57	0.54	0.51	0.48
ต้นทุนรวมหลังปรับค่า datum เวลา	2001.70	1174.55	955.22	913.03	758.13	712.66	669.92	4770.46	2223.66	3243.59	3053.50	3107.47	2937.93
ผลตอบแทน													
เงินอุดหนุนจากกองทุนสงเคราะห์	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00						
บางแห่งนดิบ								4,457.64	4,457.64	9,484.35	9,484.35	10,656.58	10,656.58
ไม้ยางพารา													
ผลตอบแทนรวม	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	4,457.64	4,457.64	9,484.35	9,484.35	10,656.58	10,656.58
discount rate	1.00	0.94	0.88	0.83	0.78	0.73	0.69	0.65	0.61	0.57	0.54	0.51	0.48
ผลตอบแทนรวมหลังปรับค่า datum เวลา	1833	1723.068	1619.73	1522.588	1431.273	1345.434	1264.744	2891.249	2717.85	5435.853	5109.845	5397.067	5073.385
ผลตอบแทนสุทธิเต็ลซี	-168.70	548.51	664.51	609.56	673.14	632.77	594.82	-1879.21	494.19	2192.26	2056.34	2289.60	2135.46

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปป้ายang แผ่นดิน จังหวัดตรัง ปีที่ 13 - 25

รายการ / ปีที่	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ภาษีบำรุงท้องที่	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ทันทูน													
ต้นทุนช่วงยางไม้ไผ่ผลิต													
ค่าปรับเพิ่มที่ (ค่าໄใจ เผาปรน)													
วางแผน													
บุคลลุน													
ไส้ปุ๋ยรองกัน													
ค่าพันธุ์ยาง													
ค่าแรงงานปลูก													
การปลูกซ้อม													
การตัดแต่ง													
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)													
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)													
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (เคมี)													
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (อินทรีย์)													
ค่าแรงงานไส้ปุ๋ย													
ต้นทุนช่วงยางไม้ไผ่ผลิต													
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)	14.58	14.58	14.58	14.58	14.58	14.58	14.58	14.58	14.58	14.58	14.58	14.58	14.58
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)													
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (เคมี)	927.18	927.18	927.18	927.18	927.18	927.18	927.18	927.18	927.18	927.18	927.18	927.18	927.18
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (อินทรีย์)													
ค่าแรงงานไส้ปุ๋ย	29.16	29.16	29.16	29.16	29.16	29.16	29.16	29.16	29.16	29.16	29.16	29.16	29.16

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปป้ายangแผ่นดิน จังหวัดตรัง ปีที่ 13 – 25 (ต่อ)

รายการ /ปีที่	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ต้นทุนในการเก็บ กรณี และการทำแผ่น													
恣ะเก็บแบบเดอร์รี่					44.40					35.52			
มีค่าเว็บไซด์	43.30	43.30	43.30	43.30	43.30	43.30	43.30	43.30	43.30	43.30	43.30	43.30	43.30
หินลับมีด	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ค่าเจ้างลับมีด	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75
ค่าไฟฟ้ารั้งหม้อแบบ	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
อุปกรณ์การเก็บน้ำขาง													
ถ้วยรองน้ำขาง	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50
ช้อนขาง	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
ถังเก็บน้ำขาง	9.80			9.80			9.80			9.80			9.80
ไม้คาดขาง	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
อุปกรณ์ในการทำขาง													
ถังรวมน้ำขาง			85.10							31.91			
ตะกงขาง					126.00								
ตะแกรงรองขาง				7.50			7.50				5.63		
ลวดกรองน้ำขาง	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75
จักรีดขาง										516.70			
ไริงเรือน													
น้ำกรด(90 ลิตร)	140.63	140.63	140.63	140.63	140.63	140.63	140.63	140.63	140.63	140.63	140.63	140.63	140.63
ไม้คาดขาง	1.56		1.56		1.56		1.56		1.56		1.56		1.56
ค่าแรงงานที่กรีด	4,262.63	4,262.63	4,262.63	4,795.46	4,795.46	4,795.46	4,795.46	4,795.46	4,795.46	4,262.63	4,262.63	4,262.63	4,262.63

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปป้ายang แผ่นดิน จังหวัดตรัง ปีที่ 13 - 25 (ต่อ)

รายการ /ปีที่	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ต้นทุนรวม	6138.04	6126.68	6220.84	6669.30	6831.46	6659.50	6678.36	6659.50	6128.24	6688.70	6165.78	6126.68	6138.04
discount rate	0.45	0.42	0.40	0.37	0.35	0.33	0.31	0.29	0.27	0.26	0.24	0.23	0.21
ต้นทุนรวมหลังปรับค่าตามเวลา	2746.94	2577.42	2460.08	2479.25	2387.23	2187.57	2062.20	1933.05	1672.15	1715.62	1486.65	1388.63	1307.77
ผลตอบแทน													
เงินอุดหนุนจากกองทุนสังเคราะห์													
บางแห่งนับ	10,656.58	10,656.58	10,656.58	11,988.65	11,988.65	11,988.65	11,988.65	11,988.65	10,656.58	10,656.58	10,656.58	10,656.58	10,656.58
ไม้ขางพารา													80,000.00
ผลตอบแทนรวม	10,656.58	10,656.58	10,656.58	11,988.65	11,988.65	11,988.65	11,988.65	11,988.65	10,656.58	10,656.58	10,656.58	10,656.58	90,656.58
discount rate	0.45	0.42	0.40	0.37	0.35	0.33	0.31	0.29	0.27	0.26	0.24	0.23	0.21
ผลตอบแทนรวมหลังปรับค่าตามเวลา	4769.116	4483.094	4214.227	4456.67	4189.387	3938.134	3701.949	3479.93	2907.756	2733.367	2569.437	2415.339	19315.22
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย	2022.17	1905.68	1754.15	1977.42	1802.16	1750.56	1639.75	1546.88	1235.60	1017.74	1082.79	1026.71	18007.46

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปน้ำยาง จังหวัดตรัง ปีที่ 1 – 12

รายการ /ปีที่	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
ภาษีบำรุงท้องที่	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ต้นทุน													
ต้นทุนช่วงยางไม้ไผ่ผลิต													
ค่าปรับเพิ่มที่ (ค่าໄโล เพาปรน)	2,540.00												
วางแผน	148.50												
บุคลลุม	442.26												
ไส้ปุ๋ยรองกัน	56.25												
ค่าพันธุ์ยาง	1,650.00												
ค่าแรงงานปลูก	199.26												
การปลูกซ่อม		173.75	125.56										
การตัดแต่ง		162.00	162.00	162.00	81.00	81.00							
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)		200.00	122.00	144.00	88.00	88.00	88.00						
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (เคมี)		569.06	775.39	676.17	443.20	443.20	533.28						
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (อินทรีย์)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
ค่าแรงงานไส้ปุ๋ย		192.78	192.78	716.78	268.92	268.92	268.92						
ต้นทุนช่วงยางไม้ไผ่ผลิต													
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)								364.50	364.50	364.50	364.50	364.50	364.50
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)								27.72					
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (เคมี)								808.20	808.20	808.20	808.20	808.20	808.20
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (อินทรีย์)								799.92					
ค่าแรงงานไส้ปุ๋ย								268.92	268.92	268.92	268.92	268.92	268.92

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปน้ำยาง จังหวัดตรัง ปีที่ 1 – 12

รายการ /ปีที่	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
ต้นทุนในการเก็บ คธีด และการทำ แม่น													
ตະเกີຍາງແບດເຕອຮົ່ງ								44.40					44.40
ມືດກົດຍາງ								43.30	43.30	43.30	43.30	43.30	43.30
ທິນລັບມືດ								5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ຄໍາໄຟຈຳລັບມືດ								546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75
ຄໍາໄຟທີ່ຈະມີແບດ								97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
ອຸປະກິດການເກີບນ້າຍາງ													
ຄ້ວຂະອນນ້າຍາງ								22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50
ຊ້ອນຍາງ								30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
ຄັງກິນນ້າຍາງ								9.80			9.80		
ໄມ້ກາດຍາງ								4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
ອຸປະກິດໃນການທໍາຍາງ													
ຄັງຮວມນ້າຍາງ								85.10					
ຕະກອງຍາງ													
ຕະແກຮງຮອງຍາງ													
ລວດກອງນ້າຍາງ													
ຈັກກົດຍາງ													
ໂຮງເວັນ													
ນໍ້າກຽດ(90 ຄິຕຣ)													
ໄມ້ຕາກຍາງ													
ຄໍາແຮງງານທີ່ກົດ								1,864.12	1,864.12	3,389.32	3,389.32	3,808.25	3,808.25

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปน้ำยาง จังหวัดตรัง ปีที่ 1 – 12 (ต่อ)

รายการ /ปีที่	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
ต้นทุนรวม	5,036.27	1,297.59	1,377.73	1,698.95	881.12	881.12	890.20	5,021.43	4,054.49	5,579.69	5,589.49	5,998.62	6,043.02
discount rate	1.00	0.94	0.88	0.83	0.78	0.73	0.69	0.65	0.61	0.57	0.54	0.51	0.48
ต้นทุนรวมหลังปรับค่าตามเวลา	5,036.27	1,219.77	1,217.43	1,411.24	688.01	646.75	614.23	3,256.92	2,472.04	3,197.94	3,011.43	3,038.03	2,876.96
ผลตอบแทน													
เงินอุดหนุนจากกองทุนสังเคราะห์	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00						
น้ำยาง								4,660.29	4,660.29	8,473.30	8,473.30	9,520.63	9,520.63
ไม้ยางพารา													
ผลตอบแทนรวม	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	4,660.29	4,660.29	8,473.30	8,473.30	9,520.63	9,520.63
discount rate	1.00	0.94	0.88	0.83	0.78	0.73	0.69	0.65	0.61	0.57	0.54	0.51	0.48
ผลตอบแทนรวมหลังปรับค่าตามเวลา	1,833.00	1,723.07	1,619.73	1,522.59	1,431.27	1,345.43	1,264.74	3,022.69	2,841.40	4,856.38	4,565.13	4,821.76	4,532.58
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยปี	-3,203.27	503.30	402.30	111.35	743.26	698.69	650.52	-234.23	369.36	1,658.44	1,553.70	1,783.74	1,655.62

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปน้ำยาง จังหวัดตรัง ปีที่ 13 - 25

รายการ / ปีที่	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00
ภาษีบำรุงท้องที่	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ทันทูน													
ต้นทุนช่วงยางไม้ไผ่ผลิต													
ค่าปรับเพิ่มที่ (ค่าໄใจ เพาปรน)													
วางแผน													
บุคลลุม													
ไส้ปุ๋ยรองกัน													
ค่าพันธุ์ยาง													
ค่าแรงงานปลูก													
การปลูกซ้อม													
การตัดแต่ง													
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)													
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)													
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (เคมี)													
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (อินทรีย์)													
ค่าแรงงานไส้ปุ๋ย													
ต้นทุนช่วงยางไม้ไผ่ผลิต													
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)	364.50	364.50	364.50	364.50	364.50	364.50	364.50	364.50	364.50	364.50	364.50	364.50	364.50
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)													
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (เคมี)	808.20	808.20	808.20	808.20	808.20	808.20	808.20	808.20	808.20	808.20	808.20	808.20	808.20
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (อินทรีย์)													
ค่าแรงงานไส้ปุ๋ย	268.92	268.92	268.92	268.92	268.92	268.92	268.92	268.92	268.92	268.92	268.92	268.92	268.92

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปแบบน้ำยาง จังหวัดตรัง ปีที่ 13 – 25 (ต่อ)

รายการ /ปีที่	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00
ต้นทุนในการเก็บ กรณี และการ ทำเพื่อน													
คงเหลือเบ็ดเตล็ดอื่นๆ					44.40					35.52			
มีดกรีดยาง	43.30	43.30	43.30	43.30	43.30	43.30	43.30	43.30	43.30	43.30	43.30	43.30	43.30
หินลับมีด	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ค่าซื้องลับมีด	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75
ค่าไฟฟ้าเร่งหม้อแปลง	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
อุปกรณ์การเก็บน้ำยาง													
ถัวบรรจุน้ำยาง	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50
ช้อนยาง	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
ถังเก็บน้ำยาง	9.80			9.80			9.80			9.80			9.80
ไม้คาดยาง	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
อุปกรณ์ในการทำยาง													
ถังรวมน้ำยาง			85.10								31.91		
ตะกงยาง													
ตะแครงรองยาง													
ลวดกรองน้ำยาง													
จักรวีดยาง													
โรงเรือน													
น้ำกรด(90 ลิตร)													
ไม้ตากยาง													
ค่าแรงงานที่กรีด	3,808.25	3,808.25	3,808.25	5,521.97	5,521.97	5,521.97	5,521.97	5,521.97	5,521.97	3,808.25	3,808.25	3,808.25	3,808.25

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนยังพารา ในรูปแบบที่ จังหวัดตั้ง ปีที่ 13 – 25 (ต่อ)

รายการ /ปีที่	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00
ต้นทุนรวม	6,008.42	5,998.62	6,083.72	7,722.14	7,756.74	7,712.34	7,722.14	7,712.34	5,998.62	6,043.94	6,030.53	5,998.62	6,008.42
discount rate	0.45	0.42	0.40	0.37	0.35	0.33	0.31	0.29	0.27	0.26	0.24	0.23	0.21
ต้นทุนรวมหลังปรับค่าความเวลา	2,688.94	2,523.55	2,405.86	2,870.63	2,710.56	2,533.41	2,384.50	2,238.65	1,636.79	1,550.25	1,454.04	1,359.60	1,280.15
ผลตอบแทน													
เงินอุดหนุนจากกองทุน สังเคราะห์													
นำเข้า	9,520.63	9,520.63	9,520.63	13,804.91	13,804.91	13,804.91	13,804.91	13,804.91	9,520.63	9,520.63	9,520.63	9,520.63	9,520.63
ไม่ยังพารา													80,000.00
ผลตอบแทนรวม	9,520.63	9,520.63	9,520.63	13,804.91	13,804.91	13,804.91	13,804.91	13,804.91	9,520.63	9,520.63	9,520.63	9,520.63	89,520.63
discount rate	0.45	0.42	0.40	0.37	0.35	0.33	0.31	0.29	0.27	0.26	0.24	0.23	0.21
ผลตอบแทนรวมหลังปรับค่าความ เวลา	4,260.75	4,005.22	3,765.01	5,131.85	4,824.07	4,534.76	4,262.79	4,007.14	2,597.80	2,442.00	2,295.55	2,157.87	19,073.20
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยปี	1,571.81	1,481.67	1,359.15	2,261.22	2,113.51	2,001.34	1,878.29	1,768.49	961.02	891.76	841.51	798.27	17,793.05

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปป้ายangแผ่นดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 1 – 12

รายการ / ปีที่	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
ภาษีบำรุงท้องที่	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ทันทูน													
ต้นทุนช่วงยางไม้ไผ่ผลผลิต													
ค่าปรับเพิ่มที่ (ค่าໄใจ เพาปรน)	1,850.00												
วางแผน	203.52												
บุคลลุม	362.50												
ไส้ปุ๋ยรองกัน	0.00												
ค่าพันธุ์ยาง	837.50												
ค่าแรงงานปลูก	493.19												
การปลูกซ่อม		469.56	94.75										
การตัดแต่ง		240.16	240.16	240.16									
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)		0.00	0.00	0.00	12.42	450.00	420.00						
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)		150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (เคมี)		918.16	918.16	918.16	772.51	450.00	1,657.60						
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (อินทรีย์)		308.59	308.59										
ค่าแรงงานไส้ปุ๋ย		215.45	215.45	215.45	181.26	312.60	147.08						
ต้นทุนช่วงยางไม้ไผ่ผลผลิต													
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)								39.75	39.75	39.75	39.75	39.75	39.75
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)								36.00					
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (เคมี)								1,751.30	1,751.30	1,751.30	1,751.30	1,751.30	1,751.30
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (อินทรีย์)													
ค่าแรงงานไส้ปุ๋ย								147.08	147.08	147.08	147.08	147.08	147.08

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปป้ายang แผ่นดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 1 – 12 (ต่อ)

รายการ / ปีที่	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
ต้นทุนในการเก็บ คธีด และการ ทำหนี้													
恣 เกี่ยงแบบเดอเร่								128.60					128.60
มีดคธีดยาง								42.85	42.85	42.85	42.85	42.85	42.85
หินลับมีด								12.86	12.86	12.86	12.86	12.86	12.86
ค่ารังลับมีด								142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00
ค่าไฟชาร์จหนื้มแบบ								128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00
อุปกรณ์การเก็บน้ำยาง													
ถัวรองน้ำยาง								467.50					
ช้อนยาง								28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00
ถังเก็บน้ำยาง								16.86			16.86		
ไม้คาดยาง								6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42
อุปกรณ์ในการทำยาง													
ถังรวมน้ำยาง								36.60					
ตะกงยาง								92.50					
ตะแกรงรองยาง								19.65				19.65	
ลวดกรองน้ำยาง								9.82	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82
จักรวีดยาง								2,041.67					
โรงเรือน								1,041.00					
น้ำกรด(90 ลิตร)								459.84					
ไม้ตากยาง								1.95		1.95		1.95	
ค่าแรงงานที่คธีด								3,757.93	3,757.93	7,090.43	7,090.43	2,835.41	2,835.41

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปป้ายang แผ่นดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 1 – 12 (ต่อ)

รายการ / ปีที่	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
ต้นทุนรวม	3,746.71	2,301.92	1,777.11	1,373.77	966.19	1,212.60	2,224.68	10,408.17	6,066.00	9,400.45	9,415.36	5,165.09	5,272.09
discount rate	1.00	0.94	0.88	0.83	0.78	0.73	0.69	0.65	0.61	0.57	0.54	0.51	0.48
ต้นทุนรวมหลังปรับค่าความเวลา	3,746.71	2,163.86	1,570.34	1,141.12	754.44	890.06	1,534.99	6,750.79	3,698.47	5,387.77	5,072.68	2,615.88	2,509.94
ผลตอบแทน													
เงินอุดหนุนจากกองทุนสงเคราะห์	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00						
บำนาญต้นดิน								9,394.82	9,394.82	17,726.07	17,726.07	7,088.53	7,088.53
ไม้ข้างพารา													
ผลตอบแทนรวม	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	9,394.82	9,394.82	17,726.07	17,726.07	7,088.53	7,088.53
discount rate	1.00	0.94	0.88	0.83	0.78	0.73	0.69	0.65	0.61	0.57	0.54	0.51	0.48
ผลตอบแทนรวมหลังปรับค่าความเวลา	1,833.00	1,723.07	1,619.73	1,522.59	1,431.27	1,345.43	1,264.74	6,093.52	5,728.07	10,159.51	9,550.20	3,590.01	3,374.71
ผลตอบแทนตากิจต่อปี	-1,913.71	-440.79	49.39	381.47	676.84	455.38	-270.25	-657.27	2,029.60	4,771.74	4,477.53	974.13	864.77

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปป้ายang แผ่นดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 13 - 25

รายการ / ปีที่	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00
ภาษีบำรุงท้องที่	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ทันทูน													
ต้นทูนช่วงยางไม้ไผ่ผลิต													
ค่าปรับพื้นที่ (ค่าໄโล เพาปรน)													
วางแผน													
บุคลลุน													
ไส้ปุ๋ยรองกัน													
ค่าพันธุ์ยาง													
ค่าแรงงานปลูก													
การปลูกซ่อม													
การตัดแต่ง													
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)													
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)													
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (เคมี)													
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (อินทรีย์)													
ค่าแรงงานไส้ปุ๋ย													
ต้นทูนช่วงยางไม้ไผ่ผลิต													
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)	39.75	39.75	39.75	39.75	39.75	39.75	39.75	39.75	39.75	39.75	39.75	39.75	39.75
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)													
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (เคมี)	1,751.30	1,751.30	1,751.30	1,751.30	1,751.30	1,751.30	1,751.30	1,751.30	1,751.30	1,751.30	1,751.30	1,751.30	1,751.30
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (อินทรีย์)													
ค่าแรงงานไส้ปุ๋ย	147.08	147.08	147.08	147.08	147.08	147.08	147.08	147.08	147.08	147.08	147.08	147.08	147.08

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปป้ายang แผ่นดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 13 – 25 (ต่อ)

รายการ / ปีที่	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00
ต้นทุนในการเก็บ คธีด และการ ทำหนี้													
ตະເກີຍແບຕເດອຣີ					128.60					102.88			
ມືດກົດຍາງ	42.85	42.85	42.85	42.85	42.85	42.85	42.85	42.85	42.85	42.85	42.85	42.85	42.85
ຫິນລັບມືດ	12.86	12.86	12.86	12.86	12.86	12.86	12.86	12.86	12.86	12.86	12.86	12.86	12.86
ຄ່າວ້າງລັບມືດ	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00
ຄ່າໄຟທ໌ຈ່າຍມືອບັດ	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00
ອຸປະກົດການເກີບນ້າຍາງ													
ຄ້ວຂຮອງນ້າຍາງ					420.75								
ໜ້ອນຍາງ	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00
ຄັງກົນນ້າຍາງ	16.86			16.86			16.86			16.86			16.86
ໄມ້ຕາດຍາງ	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42
ອຸປະກົດໃນການທໍາຍາງ													
ຄັງຮວມນ້າຍາງ			36.60							13.73			
ຕະກອງຍາງ					83.25								
ຕະແກຮງຮອງຍາງ			19.65				19.65				14.74		
ລວດກຮອງນ້າຍາງ	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82
ຈັກວິດຍາງ										510.41			
ໂຮງເວັນ													
ນໍ້າກຽດ(90 ຄິຕຣ)													
ໄມ້ຕາດຍາງ	1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95
ຄ່າແຮງງານທີ່ກົດ	2,835.41	2,835.41	2,835.41	4,111.35	4,111.35	4,111.35	4,111.35	4,111.35	4,111.35	2,835.41	2,835.41	2,835.41	2,835.41

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนยังพารา ในรูปป้ายang แผ่นดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 13 – 25 (ต่อ)

รายการ /ปีที่	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00
ต้นทุนรวม	5,162.30	5,143.49	5,201.69	6,436.28	7,053.97	6,419.42	6,457.88	6,419.42	5,145.44	5,773.64	5,173.91	5,143.49	5,162.30
discount rate	0.45	0.42	0.40	0.37	0.35	0.33	0.31	0.29	0.27	0.26	0.24	0.23	0.21
ต้นทุนรวมหลังปรับค่าความเวลา	2,310.27	2,163.80	2,057.05	2,392.63	2,464.98	2,108.71	1,994.12	1,863.36	1,403.98	1,480.91	1,247.49	1,165.78	1,099.87
ผลตอบแทน													
เงินอุดหนุนจากกองทุน สังเคราะห์													
ยางแผ่นดิน	7,088.53	7,088.53	7,088.53	10,278.36	10,278.36	10,278.36	10,278.36	10,278.36	7,088.53	7,088.53	7,088.53	7,088.53	7,088.53
ไม้ยางพารา													80,000.00
ผลตอบแทนรวม	7,088.53	7,088.53	7,088.53	10,278.36	10,278.36	10,278.36	10,278.36	10,278.36	7,088.53	7,088.53	7,088.53	7,088.53	87,088.53
discount rate	0.45	0.42	0.40	0.37	0.35	0.33	0.31	0.29	0.27	0.26	0.24	0.23	0.21
ผลตอบแทนรวมหลังปรับค่าความ เวลา	3,172.31	2,982.06	2,803.21	3,820.89	3,591.73	3,376.32	3,173.83	2,983.49	1,934.18	1,818.18	1,709.13	1,606.63	18,555.01
ผลตอบแทนสุทธิ剩余ปี	862.04	818.26	746.17	1,428.26	1,126.75	1,267.62	1,179.72	1,120.13	530.19	337.26	461.64	440.85	17,455.14

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปน้ำยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 1 – 12

รายการ / ปีที่	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
ภาษีบำรุงท้องที่	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ต้นทุน													
ต้นทุนช่วงยางไม้ไผ่ผลิต													
ค่าปรับเพิ่มที่ (ค่าໄโล เพาปรน)	795.00												
วางแผน	387.50												
บุคลลุม	213.74												
ไส้ปุ๋ยรองกัน	168.00												
ค่าพันธุ์ยาง	637.35												
ค่าแรงงานปลูก	201.54												
การปลูกซ่อม		510.00	174.40										
การตัดแต่ง		172.25	172.25										
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)		314.74	129.50	360.14	0.00	190.80	190.80						
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)		0.00	0.00	63.00	0.00	35.20	40.00						
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (เคมี)		200.30	200.30	328.31	32.63	22.63	32.63						
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (อินทรีย์)		184.50											
ค่าแรงงานไส้ปุ๋ย		58.04	58.04	58.04	63.60	63.60	63.60						
ต้นทุนช่วงยางไม้ไผ่ผลิต													
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)								190.80	190.80	190.80	190.80	190.80	190.80
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)								40.00					
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (เคมี)								32.63	32.63	32.63	32.63	32.63	32.63
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (อินทรีย์)													
ค่าแรงงานไส้ปุ๋ย								63.60	63.60	63.60	63.60	63.60	63.60

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปน้ำยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 1 – 12 (ต่อ)

รายการ /ปีที่	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
ต้นทุนในการเก็บ กรณี และการ ทำเพื่อน													
คงเหลือเบ็ดเตล็ด								162.50					
มีดกรณี								153.75	153.75	153.75	153.75	153.75	153.75
หินลับมีด								23.35	23.35	23.35	23.35	23.35	23.35
ค่าไฟฟ้าร่องน้ำเบ็ด								139.32	139.32	139.32	139.32	139.32	139.32
อุปกรณ์การเก็บน้ำยาง													
ถ้วยรองน้ำยาง								585.00					
ช้อนยาง								32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
ถังเก็บน้ำยาง								35.40			35.40		
ไม้กวาดยาง								7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10
อุปกรณ์ในการทำยาง													
ถังรวมน้ำยาง								69.38					
ตะกรงยาง													
ตะแกรงรองยาง													
ลวดกรองน้ำยาง													
ขักรีดยาง													
โรงเรือน													
น้ำกรด(90 ลิตร)													
ไม้ตากยาง													
ค่าแรงงานที่กรีด								3,257.28	2,841.65	4,177.21	4,177.21	4,636.70	4,636.70

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปน้ำยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 1 – 12 (ต่อ)

รายการ / ปีที่	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
ต้นทุนรวม	2,403.12	1,439.82	734.49	809.48	96.23	312.23	327.03	4,792.10	3,484.19	4,819.75	4,855.15	5,279.24	5,279.24
discount rate	1.00	0.94	0.88	0.83	0.78	0.73	0.69	0.65	0.61	0.57	0.54	0.51	0.48
ต้นทุนรวมหลังปรับค่าตามเวลา	2,403.12	1,353.47	649.03	672.40	75.14	229.18	225.64	3,108.18	2,124.33	2,762.39	2,615.79	2,673.69	2,513.34
ผลตอบแทน													
เงินอุดหนุนจากกองทุน ส่งเคราะห์	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00						
น้ำยาง								8,143.20	7,104.12	10,443.01	10,443.01	11,591.75	11,591.75
ไม้ย่างพารา													
ผลตอบแทนรวม	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	8,143.20	7,104.12	10,443.01	10,443.01	11,591.75	11,591.75
discount rate	1.00	0.94	0.88	0.83	0.78	0.73	0.69	0.65	0.61	0.57	0.54	0.51	0.48
ผลตอบแทนรวมหลังปรับค่า ตามเวลา	1,833.00	1,723.07	1,619.73	1,522.59	1,431.27	1,345.43	1,264.74	5,281.72	4,331.42	5,985.30	5,626.34	5,870.69	5,518.60
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยปี	-570.12	369.60	970.70	850.19	1,356.14	1,116.26	1,039.10	2,173.54	2,207.09	3,222.91	3,010.55	3,196.99	3,005.26

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปน้ำยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 13 – 25

รายการ / ปีที่	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00
ภาษีบำรุงท้องที่	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ทันทูน													
ต้นทุนช่วงยางไม้ไผ่ผลิต													
ค่าปรับเพิ่มที่ (ค่าໄใจ เพาปรน)													
วางแผน													
บุคลลุน													
ไส้ปุ๋ยรองกัน													
ค่าพันธุ์ยาง													
ค่าแรงงานปลูก													
การปลูกซ้อม													
การตัดแต่ง													
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)													
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)													
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (เคมี)													
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (อินทรีย์)													
ค่าแรงงานไส้ปุ๋ย													
ต้นทุนช่วงยางไม้ไผ่ผลิต													
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)	190.80	190.80	190.80	190.80	190.80	190.80	190.80	190.80	190.80	190.80	190.80	190.80	190.80
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)													
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (เคมี)	32.63	32.63	32.63	32.63	32.63	32.63	32.63	32.63	32.63	32.63	32.63	32.63	32.63
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (อินทรีย์)													
ค่าแรงงานไส้ปุ๋ย	63.60	63.60	63.60	63.60	63.60	63.60	63.60	63.60	63.60	63.60	63.60	63.60	63.60

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปน้ำยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 13 – 25 (ต่อ)

รายการ /ปีที่	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00
ต้นทุนในการเก็บ กรีด และการ ทำแผ่น													
ตะเกียงแบบเดอร์รี่					146.25								
มีดกรีดยาง	153.75	153.75	153.75	153.75	153.75	153.75	153.75	153.75	153.75	153.75	153.75	153.75	153.75
พินลับมีด	23.35	23.35	23.35	23.35	23.35	23.35	23.35	23.35	23.35	23.35	23.35	23.35	23.35
ค่าไฟชาร์จหม้อเบต	139.32	139.32	139.32	139.32	139.32	139.32	139.32	139.32	139.32	139.32	139.32	139.32	139.32
อุปกรณ์การเก็บน้ำยาง													
ถ้วยรองน้ำยาง					526.50								
ช้อนยาง	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
ถังเก็บน้ำยาง	35.40			35.40			35.40			35.40			35.40
ไม้คาดยาง	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10
อุปกรณ์ในการทำยาง													
ถังรวมน้ำยาง			69.38							26.02			
ตะกรงยาง													
ตะแครงรองน้ำยาง													
ลวดกรองน้ำยาง													
จักรวีดยาง													
โรงเรือน													
น้ำกรด(90 ลิตร)													
ไม้ตากยาง													
ค่าแรงงานที่กรีด	4,636.70	4,636.70	4,636.70	6,723.21	6,723.21	6,723.21	6,723.21	6,723.21	6,723.21	2,841.65	2,841.65	2,841.65	2,841.65

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปแบบที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 13 – 25 (ต่อ)

รายการ / ปีที่	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00
ต้นทุนรวม	5,314.64	5,279.24	5,348.62	7,401.16	8,038.51	7,365.76	7,401.16	7,365.76	3,484.19	3,519.59	3,510.21	3,484.19	3,519.59
discount rate	0.45	0.42	0.40	0.37	0.35	0.33	0.31	0.29	0.27	0.26	0.24	0.23	0.21
ต้นทุนรวมหลังปรับค่าความเวลา	2,378.45	2,220.91	2,115.15	2,751.31	2,809.03	2,419.57	2,285.39	2,138.05	950.70	902.76	846.36	789.70	749.88
ผลตอบแทน													
เงินอุดหนุนจากกองทุน สังเคราะห์													
น้ำชา	11,591.75	11,591.75	11,591.75	16,808.03	16,808.03	16,808.03	16,808.03	16,808.03	7,104.12	7,104.12	7,104.12	7,104.12	7,104.12
น้ำย่างพารา													80,000.00
ผลตอบแทนรวม	11,591.75	11,591.75	11,591.75	16,808.03	16,808.03	16,808.03	16,808.03	16,808.03	7,104.12	7,104.12	7,104.12	7,104.12	87,104.12
discount rate	0.45	0.42	0.40	0.37	0.35	0.33	0.31	0.29	0.27	0.26	0.24	0.23	0.21
ผลตอบแทนรวมหลังปรับค่าความ เวลา	5,187.63	4,876.51	4,584.05	6,248.23	5,873.50	5,521.25	5,190.12	4,878.85	1,938.43	1,822.18	1,712.90	1,610.17	18,558.34
ผลตอบแทนสุทธิโดยละเอียด	2,809.18	2,655.59	2,468.89	3,496.92	3,064.48	3,101.68	2,904.73	2,740.80	987.73	919.42	866.54	820.47	17,808.46

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปน้ำยาง จังหวัดชุมพร ปีที่ 1 – 12

ภาษีบำรุงท้องที่	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ต้นทุน												
ต้นทุนช่วงยางไม้ไผ่ผลผลิต												
ค่าปรับเพิ่มที่ (ค่าໄก พาปรน)	1,989.60											
วางแผน	150.00											
บุคลลุม	48.75											
ไส้ปุ๋ยรองกัน	0.00											
ค่าพันธุ์ยาง	712.50											
ค่าแรงงานปลูก	64.38											
การปลูกซ่อน		253.55	57.00									
การตัดแต่ง		88.00	88.00	88.00								
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)		62.50	43.30	45.30	45.30	45.30	9.60					
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)												
ค่าปุ๋ยบำรุงดืนยาง (เคมี)		110.50	177.59	98.44	197.68	293.84	453.45					
ค่าปุ๋ยบำรุงดืนยาง (อินทรีย์)		15.00										
ค่าแรงงานไส้ปุ๋ย		11.14	11.14	20.80	20.80	20.80	20.80					
ต้นทุนช่วงยางให้ผลผลิต								9.60	9.60	9.60	9.60	9.60
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)												
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)												
ค่าปุ๋ยบำรุงดืนยาง (เคมี)								820.57	820.57	820.57	820.57	820.57
ค่าปุ๋ยบำรุงดืนยาง (อินทรีย์)												
ค่าแรงงานไส้ปุ๋ย								20.80	20.80	20.80	20.80	20.80

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปน้ำยาง จังหวัดชุมพร ปีที่ 1 – 12 (ต่อ)

รายการ / ปีที่	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
ต้นทุนในการเก็บ คธีด และการทำ แผน													
ตະເກີຍແບຕເດອຣີ													
ມືດກົດຍາງ													
ຫິນລັບມືດ													
ຄໍາໄຟທ່າຮຈໜ້ອແບຕ													
ອຸປະກົດການເກີນນໍ້າຍາງ													
ສ້າງຮອງນໍ້າຍາງ							189.00						
ໜ້ອຍາງ							27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	
ຄັງເກີນນໍ້າຍາງ													
ໄມ້ກວາດຍາງ													
ອຸປະກົດໃນການທໍາຍາງ													
ຄັງຮວມນໍ້າຍາງ							42.86						
ຕະກົງຍາງ													
ຕະແກຮງຮອງຍາງ													
ລວດກຽມຮອງນໍ້າຍາງ													
ຈັກກົດຍາງ													
ໂຮງເວືອນ													
ນໍ້າກຽດ(90 ຄິຕຣ)													
ໄມ້ທາກຍາງ													
ຄ່າແຮງງານທີ່ກົດ							1,959.66	979.83	1,848.73	1,848.73	2,077.23	2,077.23	

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปแบบชั้นนำของ จังหวัดชุมพร ปีที่ 1 – 12 (ต่อ)

รายการ / ปีที่	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
ต้นทุนรวม	2,965.23	540.69	377.03	252.54	263.78	359.94	483.85	3,069.48	1,857.79	2,726.70	2,726.70	2,955.19	2,955.19
discount rate	1.00	0.94	0.88	0.83	0.78	0.73	0.69	0.65	0.61	0.57	0.54	0.51	0.48
ต้นทุนรวมหลังปรับค่าตามเวลา	2,965.23	508.26	333.16	209.77	205.97	264.19	333.85	1,990.88	1,132.71	1,562.78	1,469.05	1,496.67	1,406.91
ผลตอบแทน													
เงินอุดหนุนจากกองทุนสงเคราะห์	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00						
นำเข้า								4,899.14	2,449.57	4,621.83	4,621.83	5,193.07	5,193.07
ไม่เข้า													
ผลตอบแทนรวม	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	4,899.14	2,449.57	4,621.83	4,621.83	5,193.07	5,193.07
discount rate	1.00	0.94	0.88	0.83	0.78	0.73	0.69	0.65	0.61	0.57	0.54	0.51	0.48
ผลตอบแทนรวมหลังปรับค่าตามเวลา	1,833.00	1,723.07	1,619.73	1,522.59	1,431.27	1,345.43	1,264.74	3,177.61	1,493.52	2,648.95	2,490.09	2,630.05	2,472.32
ผลตอบแทนสุทธิเต็มปี	-1,132.23	1,214.81	1,286.57	1,312.82	1,225.30	1,081.24	930.90	1,186.73	360.81	1,086.18	1,021.03	1,133.38	1,065.41

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปน้ำยาง จังหวัดชุมพร ปีที่ 13 - 25

รายการ / ปีที่	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00
ภาษีบำรุงท้องที่	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ทันทูน													
ต้นทุนช่วงยางไม้ไผ่ผลิต													
ค่าปรับเพิ่มที่ (ค่าໄใจ เผาปรน)													
วางแผน													
บุคลลุน													
ไส้ปุ๋ยรองกัน													
ค่าพันธุ์ยาง													
ค่าแรงงานปลูก													
การปลูกซ้อม													
การตัดแต่ง													
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)													
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)													
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (เคมี)													
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (อินทรีย์)													
ค่าแรงงานไส้ปุ๋ย													
ต้นทุนช่วงยางไม้ไผ่ผลิต													
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)													
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (เคมี)	820.57	820.57	820.57	820.57	820.57	820.57	820.57	820.57	820.57	820.57	820.57	820.57	820.57
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (อินทรีย์)													
ค่าแรงงานไส้ปุ๋ย	20.80	20.80	20.80	20.80	20.80	20.80	20.80	20.80	20.80	20.80	20.80	20.80	20.80

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปน้ำยาง จังหวัดชุมพร ปีที่ 13 – 25 (ต่อ)

รายการ /ปีที่	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00
ต้นทุนในการเก็บ กรณี และการ ทำผ่อน													
คงเก็บแบบเดือนร้อย													
มีดกู้ดยาง													
หินลับมีด													
ค่าไฟชาร์จหม้อเบนต													
อุปกรณ์การเก็บน้ำยาง													
ถังรองน้ำยาง					170.10								
ช้อนยาง	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
ถังเก็บน้ำยาง													
ไม้ก้าดยาง													
อุปกรณ์ในการทำยาง													
ถังรวมน้ำยาง			42.86							16.07			
ตะกรงยาง													
ตะแกรงรองยาง													
คาดกรองน้ำยาง													
จักรีดยาง													
โรงเรือน													
น้ำกรด(90 ลิตร)													
ไม้ตากยาง													
ค่าแรงงานที่กู้ด	2,077.23	2,077.23	2,077.23	2,250.33	2,250.33	2,250.33	2,250.33	2,250.33	2,077.23	2,077.23	2,077.23	2,077.23	2,077.23

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปน้ำยาง จังหวัดชุมพร ปีที่ 13 – 25 (ต่อ)

รายการ / ปีที่	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00
ต้นทุนรวม	2,955.19	2,955.19	2,998.05	3,128.30	3,298.40	3,128.30	3,128.30	3,128.30	2,955.19	2,955.19	2,971.26	2,955.19	2,955.19
discount rate	0.45	0.42	0.40	0.37	0.35	0.33	0.31	0.29	0.27	0.26	0.24	0.23	0.21
ต้นทุนรวมหลังปรับค่าตามเวลา													
	1,322.53	1,243.21	1,185.60	1,162.92	1,152.61	1,027.61	965.98	908.05	806.35	757.99	716.41	669.80	629.63
ผลตอบแทน													
เงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมฯ													
น้ำยาง	5,193.07	5,193.07	5,193.07	5,625.83	5,625.83	5,625.83	5,625.83	5,625.83	5,193.07	5,193.07	5,193.07	5,193.07	5,193.07
ไม้ขางพารา													80,000.00
ผลตอบแทนรวม	5,193.07	5,193.07	5,193.07	5,625.83	5,625.83	5,625.83	5,625.83	5,625.83	5,193.07	5,193.07	5,193.07	5,193.07	85,193.07
discount rate	0.45	0.42	0.40	0.37	0.35	0.33	0.31	0.29	0.27	0.26	0.24	0.23	0.21
ผลตอบแทนรวมหลังปรับค่าตามเวลา													
	2,324.04	2,184.66	2,053.64	2,091.35	1,965.92	1,848.02	1,737.19	1,633.00	1,416.98	1,332.00	1,252.12	1,177.02	18,151.17
ผลตอบแทนสุทธิเบ็ดเตล็ดปี	1,001.51	941.45	868.04	928.43	813.31	820.41	771.21	724.96	610.63	574.01	535.71	507.22	17,521.54

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปน้ำยาง จังหวัดสงขลา ปีที่ 1 – 12

รายการ / ปีที่	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ภาษีบำรุงท้องที่	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ต้นทุน													
ต้นทุนช่วงยางไม้ให้ผลผลิต													
ค่าปรับพื้นที่ (ค่าไถ่ เพาปรน)	608.00												
วางแผน	220.50												
ขาดทุน	327.50												
ไส้ปูย่างกัน	70.00												
ค่าพันธุ์ยาง	853.75												
ค่าแรงงานปลูก	230.43												
การปลูกซ้อม		77.95	65.25										
การตัดแต่ง		206.78	206.78	125.78									
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)		126.73	154.25	108.50	200.00	200.00	200.00						
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)		0.00	102.00	69.00									
ค่าปูยำรุ่งด้านยาง (เคมี)		588.42	573.72	795.36	1066.56	1333.44	1333.44						
ค่าปูยำรุ่งด้านยาง (อินทรีย์)													
ค่าแรงงานไส้ปูย		120.20	120.20	120.20	212.25	212.25	212.25						
ต้นทุนช่วงยางไม้ผลผลิต													
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)		126.73	154.25	108.50	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)		0.00	102.00	69.00									
ค่าปูยำรุ่งด้านยาง (เคมี)		588.42	573.72	795.36	1066.56	1333.44	1333.44	1333.44	1333.44	1333.44	1333.44	1333.44	1333.44
ค่าปูยำรุ่งด้านยาง (อินทรีย์)													
ค่าแรงงานไส้ปูย		120.20	120.20	120.20	212.25	212.25	212.25	212.25	212.25	212.25	212.25	212.25	212.25

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปน้ำยาง จังหวัดสงขลา ปีที่ 1 – 12 (ต่อ)

รายการ / ปีที่	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ต้นทุนในการเก็บ คธีด และการทำ แม่น													
ตะเกียงแบบเดอร์วี่							180.00						180.00
มีดกรีดยาง							250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
หินลับมีด							26.70	26.70	26.70	26.70	26.70	26.70	26.70
ค่าไฟฟาร์จหม้อแปลง							246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00
อุปกรณ์การเก็บน้ำยาง													
ถ้วยรองน้ำยาง							490.00						
ช้อนยาง							28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00
ถังเก็บน้ำยาง							25.00			25.00			
ไม้คาดยาง							26.70	26.70	26.70	26.70	26.70	26.70	26.70
อุปกรณ์ในการทำยาง													
ถังรวมน้ำยาง							53.30						
ตะกรงยาง													
ตะแกรงรองยาง													
ลวดกรองน้ำยาง													
จักรีดยาง													
โรงเรือน													
น้ำกรด(90 ลิตร)													
ไม้ตากยาง													
ค่าแรงงานที่คธีด							3175.37	3175.37	5991.27	5991.27	6731.76	6731.76	

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนยังพารา ในรูปแบบที่น้ำยาง จังหวัดสงขลา ปีที่ 1 – 12 (ต่อ)

รายการ / ปีที่	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ต้นทุนรวม	2310.18	1955.42	2172.36	2311.89	2957.62	3491.38	3491.38	6246.76	5498.46	8314.36	8339.36	9054.85	9234.85
discount rate	1.000	0.940	0.884	0.831	0.781	0.734	0.690	0.649	0.610	0.573	0.539	0.506	0.476
ต้นทุนรวมหลังปรับค่าความเวลา	2310.18	1838.15	1919.60	1920.38	2309.42	2562.70	2409.00	4051.68	3352.44	4765.28	4492.96	4585.87	4396.53
ผลตอบแทน													
เงินอุดหนุนจากกองทุน สังเคราะห์	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00						
น้ำยาง								7938.43	7938.43	14978.17	14978.17	16829.40	16829.40
ไม้ย่างพารา													
ผลตอบแทนรวม	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	7938.426	7938.426	14978.17	14978.17	16829.4	16829.4
discount rate	1.000	0.940	0.884	0.831	0.781	0.734	0.690	0.649	0.610	0.573	0.539	0.506	0.476
ผลตอบแทนรวมหลังปรับค่าความ เวลา	1833	1723.068	1619.73	1522.588	1431.273	1345.434	1264.744	5148.9	4840.102	8584.574	8069.726	8523.32	8012.145
ผลตอบแทนสุทธิเต็มปี	-477.18	-115.08	-299.88	-397.79	-878.14	-1217.26	-1144.26	1097.22	1487.66	3819.29	3576.76	3937.45	3615.62

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปน้ำยาง จังหวัดสงขลา ปีที่ 13 - 25

รายการ / ปีที่	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ภาษีบำรุงท้องที่	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ทันทูน													
ต้นทุนช่วงยางไม้ไผ่ผลิต													
ค่าปรับเพิ่มที่ (ค่าໄใจ เพาปรน)													
วางแผน													
บุคลลุม													
ไส้ปุ๋ยรองกัน													
ค่าพันธุ์ยาง													
ค่าแรงงานปลูก													
การปลูกซ้อม													
การตัดแต่ง													
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)													
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)													
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (เคมี)													
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (อินทรีย์)													
ค่าแรงงานไส้ปุ๋ย													
ต้นทุนช่วงยางไม้ไผ่ผลิต													
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)													
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (เคมี)	1333.44	1333.44	1333.44	1333.44	1333.44	1333.44	1333.44	1333.44	1333.44	1333.44	1333.44	1333.44	1333.44
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (อินทรีย์)													
ค่าแรงงานไส้ปุ๋ย	212.25	212.25	212.25	212.25	212.25	212.25	212.25	212.25	212.25	212.25	212.25	212.25	212.25

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปแบบน้ำยาง จังหวัดสงขลา ปีที่ 13 – 25 (ต่อ)

รายการ /ปีที่	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ต้นทุนในการเก็บ คธีด และการทำ แผน													
ตะเกียงแบบเดอร์รี่					180.00					144.00			
มีดกีดยาง	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
หินลับมีด	26.70	26.70	26.70	26.70	26.70	26.70	26.70	26.70	26.70	26.70	26.70	26.70	26.70
ค่าไฟฟาร์เจนเน็ตแบบ	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00
อุปกรณ์การเก็บน้ำยาง													
ถ้วยรองน้ำยาง					441.00								
ช้อนยาง	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00
ถังเก็บน้ำยาง	25.00			25.00			25.00			25.00			25.00
ไม้วัวดยาง	26.70	26.70	26.70	26.70	26.70	26.70	26.70	26.70	26.70	26.70	26.70	26.70	26.70
อุปกรณ์ในการทำยาง													
ถังรวมน้ำยาง			53.30								19.99		
ตะกอยยาง													
ตะแกรงรองยาง													
漉ดกรองน้ำยาง													
ขักร์ดยาง													
ใบเรือน													
น้ำกรด(90 ลิตร)													
ไม้ตากยาง													
ค่าแรงงานที่คธีด	6731.76	6731.76	6731.76	9761.05	9761.05	9761.05	9761.05	9761.05	6731.76	6731.76	6731.76	6731.76	6731.76

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปน้ำยาง จังหวัดสงขลา ปีที่ 13 – 25 (ต่อ)

รายการ / ปีที่	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ต้นทุนรวม	9079.85	9054.85	9108.15	12109.14	12705.14	12084.14	12109.14	12084.14	9054.85	9223.85	9074.84	9054.85	9079.85
discount rate	0.448	0.421	0.395	0.372	0.349	0.328	0.309	0.290	0.273	0.256	0.241	0.227	0.213
ต้นทุนรวมหลังปรับค่าความเวลา	4063.49	3809.27	3601.89	4501.46	4439.76	3969.50	3739.16	3507.65	2470.71	2365.88	2188.06	2052.30	1934.55
ผลตอบแทน													
เงินอุดหนุนจากกองทุน สังเคราะห์													
น้ำยาง	16829.40	16829.40	16829.40	24402.63	24402.63	24402.63	24402.63	24402.63	16829.40	16829.40	16829.40	16829.40	16829.40
ไม้ย่างพารา													14,425.20
ผลตอบแทนรวม	16829.4	16829.4	16829.4	24402.63	24402.63	24402.63	24402.63	24402.63	16829.4	16829.4	16829.4	16829.4	31254.6
discount rate	0.448	0.421	0.395	0.372	0.349	0.328	0.309	0.290	0.273	0.256	0.241	0.227	0.213
ผลตอบแทนรวมหลังปรับค่าความ เวลา	7531.627	7079.928	6655.318	9071.453	8527.405	8015.985	7535.237	7083.321	4592.075	4316.671	4057.784	3814.424	6659.081
ผลตอบแทนสุทธิเต็มปี	3468.14	3270.66	3053.43	4569.99	4087.64	4046.48	3796.08	3575.67	2121.37	1950.79	1869.72	1762.12	4724.54

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปน้ำยาง จังหวัดสตูล ปีที่ 1 - 12

รายการ / ปีที่	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
ภาษีบำรุงท้องที่	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
หันทุน													
ต้นทุนช่วงยางไม้ให้ผลผลิต													
ค่าปรับพื้นที่ (ค่าໄໂຄ ເພາປັນ)	450.00												
วางแผน	159.00												
บุคลุม	381.60												
ໄດ້ຢູ່ຮອງກັນ	245.00												
ค่าพันธุ์ยาง	560.00												
ค่าแรงงานปลูก	381.60												
การปลูกซ่อม		510.80	169.00										
การตัดแต่ง		159.00	159.00	159.00									
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)		159.00	12.72	12.72	12.72	12.73	0.00						
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)													
ค่าปື້ນบำรุงดูแล (ເຄມີ)		240.00	350.00	500.00	0.00	0.00	0.00						
ค่าปື້ນบำรุงดูแล (ອິນທຣີ)													
ค่าแรงงานใส่ปື້ນ		127.20	127.20	127.30	0.00	0.00	0.00						
ต้นทุนช่วงยางให้ผลผลิต									59.62	59.62	59.62	59.62	59.62
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)													
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)													
ค่าปື້ນบำรุงดูแล (ເຄມີ)								800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
ค่าปື້ນบำรุงดูแล (ອິນທຣີ)													
ค่าแรงงานใส่ปື້ນ								25.44	25.44	25.44	25.44	25.44	25.44

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปน้ำยาง จังหวัดสตูล ปีที่ 1 - 12 (ต่อ)

รายการ / ปีที่	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
ต้นทุนในการเก็บ กรณี และการ ทำผ่อน													
คงค้างแบดเดอร์รี่													
มีดกีดยาง													
หินลับมีด													
ค่าไฟฟาร์จหน้อแบต													
อุปกรณ์การเก็บน้ำยาง													
ถ้วยรองน้ำยาง							210.00						
ช้อนยาง							28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	
ถังเก็บน้ำยาง													
ไม้คาดยาง													
อุปกรณ์ในการทำยาง													
ถังรวมน้ำยาง							60.00						
ตะกรงยาง													
ตะแกรงรองยาง													
漉ัดกรองน้ำยาง													
ขักรีดยาง													
โรงเรือน													
น้ำกรด(90 ลิตร)													
ไม้ตากยาง													
ค่าแรงงานที่กรีด							1,197.57	1,197.57	2,259.56	2,259.56	2,538.84	2,538.84	

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปน้ำยาง จังหวัดสตูล ปีที่ 1 - 12 (ต่อ)

รายการ /ปีที่	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
ต้นทุนในการเก็บ คredit และการทำ แม่น													
ต้นทุนรวม	2,177.20	1,196.00	817.92	799.02	12.72	12.73	0.00	2,380.63	2,110.63	3,172.62	3,172.62	3,451.90	3,451.90
discount rate	1.00	0.94	0.88	0.83	0.78	0.73	0.69	0.65	0.61	0.57	0.54	0.51	0.48
ต้นทุนรวมหลังปรับค่าความเวลา	2,177.20	1,124.27	722.75	663.71	9.93	9.34	0.00	1,544.09	1,286.86	1,818.35	1,709.30	1,748.23	1,643.38
ผลตอบแทน													
เงินอุดหนุนจากกองทุน ส่งคระห์	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00						
น้ำยาง								2,993.92	2,993.92	5,648.91	5,648.91	6,347.09	6,347.09
ไม้ย่างพารา													
ผลตอบแทนรวม	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	2,993.92	2,993.92	5,648.91	5,648.91	6,347.09	6,347.09
discount rate	1.00	0.94	0.88	0.83	0.78	0.73	0.69	0.65	0.61	0.57	0.54	0.51	0.48
ผลตอบแทนรวมหลังปรับค่าความ เวลา	1,833.00	1,723.07	1,619.73	1,522.59	1,431.27	1,345.43	1,264.74	1,941.87	1,825.41	3,237.61	3,043.44	3,214.51	3,021.72
ผลตอบแทนสุทธิเบ็ดเตล็ดปี	-344.20	598.80	896.97	858.88	1,421.34	1,336.09	1,264.74	397.78	538.55	1,419.26	1,334.14	1,466.28	1,378.34

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปน้ำยาง จังหวัดสตูล ปีที่ 13 – 25

รายการ / ปีที่	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00
ภาษีบำรุงท้องที่	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ทันทูน													
ต้นทุนช่วงยางไม้ไผ่ผลิต													
ค่าปรับเพิ่มที่ (ค่าໄใจ เพาปรน)													
วางแผน													
บุคลลุม													
ไส้ปุ๋ยรองกัน													
ค่าพันธุ์ยาง													
ค่าแรงงานปลูก													
การปลูกซ่อม													
การตัดแต่ง													
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)													
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)													
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (เคมี)													
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (อินทรีย์)													
ค่าแรงงานไส้ปุ๋ย													
ต้นทุนช่วงยางไม้ไผ่ผลิต													
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)	59.62	59.62	59.62	59.62	59.62	59.62	59.62	59.62	59.62	59.62	59.62	59.62	59.62
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)													
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (เคมี)	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (อินทรีย์)													
ค่าแรงงานไส้ปุ๋ย	25.44	25.44	25.44	25.44	25.44	25.44	25.44	25.44	25.44	25.44	25.44	25.44	25.44

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปน้ำยาง จังหวัดสตูล ปีที่ 13 – 25 (ต่อ)

รายการ /ปีที่	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00
ต้นทุนในการเก็บ คธีด และการ ทำเพื่อน													
คงเก็บแบบเดอร์รี่													
มีคธีดยาง													
หินลับมีด													
ก้าไฟชาร์จมือแบบ													
อุปกรณ์การเก็บน้ำยาง													
ถัวรองน้ำยาง					189.00								
ช้อนยาง	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00
ถังเก็บน้ำยาง													
ไม้คาดยาง													
อุปกรณ์ในการทำยาง													
ถังรวมน้ำยาง			60.00							22.50			
ตะกรายาง													
ตะแครงรองยาง													
ลวดครองน้ำยาง													
จักรวีดยาง													
โรงเรือน													
น้ำกรด(90 ลิตร)													
ไม้ตากยาง													
ค่าแรงงานที่คธีด	2,538.84	2,538.84	2,538.84	4,616.06	4,616.06	4,616.06	4,616.06	4,616.06	4,616.06	2,538.84	2,538.84	2,538.84	2,538.84

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปน้ำยาง จังหวัดสตูล ปีที่ 13 – 25 (ต่อ)

รายการ / ปีที่	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00
ต้นทุนรวม	3,451.90	3,451.90	3,511.90	5,529.12	5,718.12	5,529.12	5,529.12	5,529.12	3,451.90	3,451.90	3,474.40	3,451.90	3,451.90
discount rate	0.45	0.42	0.40	0.37	0.35	0.33	0.31	0.29	0.27	0.26	0.24	0.23	0.21
ต้นทุนรวมหลังปรับน้ำค่าdamเวลา	1,544.82	1,452.17	1,388.81	2,055.40	1,998.18	1,816.25	1,707.33	1,604.93	941.89	885.40	837.72	782.38	735.46
ผลตอบแทน													
เงินอุดหนุนจากกองทุน สงเคราะห์													
น้ำยาง	6,347.09	6,347.09	6,347.09	11,540.16	11,540.16	11,540.16	11,540.16	11,540.16	6,347.09	6,347.09	6,347.09	6,347.09	6,347.09
ไม้ย่างพารา													14,425.20
ผลตอบแทนรวม	6,347.09	6,347.09	6,347.09	11,540.16	11,540.16	11,540.16	11,540.16	11,540.16	6,347.09	6,347.09	6,347.09	6,347.09	20,772.29
discount rate	0.45	0.42	0.40	0.37	0.35	0.33	0.31	0.29	0.27	0.26	0.24	0.23	0.21
ผลตอบแทนรวมหลังปรับน้ำค่าdam เวลา	2,840.50	2,670.14	2,510.01	4,289.95	4,032.66	3,790.81	3,563.46	3,349.75	1,731.87	1,628.00	1,530.36	1,438.58	4,425.73
ผลตอบแทนสุทธิเต็มปี	1,295.68	1,217.97	1,121.20	2,234.55	2,034.49	1,974.56	1,856.14	1,744.82	789.98	742.60	692.64	656.20	3,690.27

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปป้ายang แผ่นดิน จังหวัดระนอง ปีที่ 1 – 12

รายการ / ปีที่	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
ภาษีบำรุงท้องที่	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ทันทูน													
ต้นทุนช่วงยางไม้ไผ่ผลิต													
ค่าปรับเพิ่มที่ (ค่าໄไอ ເພາປັນ)	842.22												
วางแผน	56.51												
บุคลลุม	1,191.33												
ไส້ຢູ່ຮອງກັນ	19.50												
ค่าพันธູຍາງ	833.99												
ค่าแรงงานปลูก	207.88												
การปลูกซ่อม		266.85	415.00										
การตัดแต่ง		96.30	94.47	94.47									
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)		82.86	88.60	78.10	74.37	45.90	0.00						
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)		0.00	28.00	28.00	28.00								
ค่าปື້ນບໍາຮຸງຕິ່ນຍາງ (เຄມີ)		363.63	418.63	473.63	501.13	758.33	742.50						
ค่าปື້ນບໍາຮຸງຕິ່ນຍາງ (ອິນທຣີ່)		795.00	795.00	795.00	795.00	1,584.00							
ค่าแรงงานໄສ້ຢູ່		148.51	153.70	148.51	148.51	121.52	62.95						
ต้นทุนช่วงยางไม้ไผ่ผลิต													
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)								59.62	59.62	59.62	59.62	59.62	59.62
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)													
ค่าปື້ນບໍາຮຸງຕິ່ນຍາງ (ເຄມີ)								1,125.00	473.63	473.63	473.63	473.63	473.63
ค่าปື້ນບໍາຮຸງຕິ່ນຍາງ (ອິນທຣີ່)													
ค่าแรงงานໄສ້ຢູ່								62.95	62.95	62.95	62.95	62.95	62.95

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปป้ายang แผ่นดิน จังหวัดระนอง ปีที่ 1 – 12 (ต่อ)

รายการ / ปีที่	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
ต้นทุนในการเก็บ กรณี และการทำ แผน													
คงเก็บแบบเดือนร ๆ								90.00					90.00
มีค่าเดือนร ๆ								30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
หินลับมีด								9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
ค่าไฟฟาร์เจมือแบบ								151.20	151.20	151.20	151.20	151.20	151.20
อุปกรณ์การเก็บน้ำย่าง													
ถ้วยรองน้ำย่าง								357.00					
ช้อนย่าง								35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20
ถังเก็บน้ำย่าง								30.00			30.00		
ไม้กวาดย่าง								2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
อุปกรณ์ในการทำย่าง													
ถังรวมน้ำย่าง								40.50					
ตะกรงย่าง								130.00					
ตะแกรงรองย่าง								6.40			6.40		
ลวดกรองน้ำย่าง								2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88
หักวีดย่าง								916.65					
โรงเรือน								1,820.82					
น้ำกรด(90 ลิตร)								379.05	379.05	379.05	379.05	379.05	379.05
ไม้ตากย่าง								1.13		1.13		1.13	
ค่าแรงงานที่กีด								2,971.71	2,971.71	5,607.00	5,607.00	6,300.00	6,300.00

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปป้ายang แผ่นดิน จังหวัดระนอง ปีที่ 1 – 12 (ต่อ)

รายการ/ปี*	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
ต้นทุนในการเก็บ คธ. และการทําผ่อน													
ต้นทุนรวม	3,151.44	1,753.15	1,993.40	1,617.71	1,547.01	2,509.75	805.45	8,221.10	4,177.24	6,813.65	6,842.53	7,513.05	7,595.53
discount rate	1.00	0.94	0.88	0.83	0.78	0.73	0.69	0.65	0.61	0.57	0.54	0.51	0.48
ต้นทุนรวมหลังปรับค่าความเวลา	3,151.44	1,648.00	1,761.47	1,343.75	1,207.96	1,842.18	555.75	5,332.24	2,546.89	3,905.17	3,686.52	3,805.02	3,616.08
ผลตอบแทน													
เงินอุดหนุนจากการทุนสังเคราะห์	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00						
ขาดมูลค่าดิน								5,943.42	5,943.42	11,214.00	11,214.00	12,600.00	12,600.00
ไม้ย่างพารา													
ผลตอบแทนรวม	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	5,943.42	5,943.42	11,214.00	11,214.00	12,600.00	12,600.00
discount rate	1.00	0.94	0.88	0.83	0.78	0.73	0.69	0.65	0.61	0.57	0.54	0.51	0.48
ผลตอบแทนรวมหลังปรับค่าความเวลา	1,833.00	1,723.07	1,619.73	1,522.59	1,431.27	1,345.43	1,264.74	3,854.93	3,623.74	6,427.18	6,041.72	6,381.32	5,998.61
ผลตอบแทนสุทธิต่อปี	-1,318.44	75.06	-141.74	178.83	223.31	-496.74	708.99	-1,477.31	1,076.85	2,522.01	2,355.20	2,576.31	2,382.53

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปป้ายang แผ่นดิน จังหวัดระนอง ปีที่ 13 - 25

รายการ / ปีที่	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00
ภาษีบำรุงท้องที่	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ทันทูน													
ต้นทูนช่วงยางไม้ไผ่ผลิต													
ค่าปรับพื้นที่ (ค่าໄไอ เผาปรน)													
วางแผน													
บุคลลุน													
ไส้ปุ๋ยรองกัน													
ค่าพันธุ์ยาง													
ค่าแรงงานปลูก													
การปลูกซ้อม													
การตัดแต่ง													
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)													
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)													
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (เคมี)													
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (อินทรีย์)													
ค่าแรงงานไส้ปุ๋ย													
ต้นทูนช่วงยางไม้ไผ่ผลิต													
ค่ากำจัดวัชพืช (สารเคมี)	59.62	59.62	59.62	59.62	59.62	59.62	59.62	59.62	59.62	59.62	59.62	59.62	59.62
ค่ากำจัดวัชพืช (ตัดหญ้า)													
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (เคมี)	473.63	473.63	473.63	473.63	473.63	473.63	473.63	473.63	473.63	473.63	473.63	473.63	473.63
ค่าปุ๋ยบำรุงดินยาง (อินทรีย์)													
ค่าแรงงานไส้ปุ๋ย	62.95	62.95	62.95	62.95	62.95	62.95	62.95	62.95	62.95	62.95	62.95	62.95	62.95

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปป้ายangแผ่นดิน จังหวัดระนอง ปีที่ 13 – 25 (ต่อ)

รายการ / ปีที่	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00
ต้นทุนในการเก็บ คธีด และการ ทำแผ่น													
ตะเกียงแบบเดอร์รี่					90.00					72.00			
มีดกีดยาง	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
หินลับมีด	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
ค่าไฟชาร์จหม้อเบปต	151.20	151.20	151.20	151.20	151.20	151.20	151.20	151.20	151.20	151.20	151.20	151.20	151.20
อุปกรณ์การเก็บน้ำยาง													
ถ้าขรองน้ำยาง					321.30								
ช้อนยาง	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20
ถังเก็บน้ำยาง	30.00			30.00			30.00			30.00			30.00
ไม้กวาดยาง	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
อุปกรณ์ในการทำยาง													
ถังรวมน้ำยาง			40.50								15.19		
ตะกรงยาง					117.00								
ตะแกรงรองยาง			6.40				6.40				4.80		
ลวดครองน้ำยาง	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88
ขักธีดยาง										244.44			
โรงเรือน													
น้ำกรด(90 ลิตร)	379.05	379.05	379.05	379.05	379.05	379.05	379.05	379.05	379.05	379.05	379.05	379.05	379.05
ไม้ตากยาง	1.13		1.13		1.13		1.13		1.13		1.13		1.13
ค่าแรงงานที่คธีด	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,567.75	6,567.75	6,567.75	6,567.75	6,567.75	6,567.75	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00

ภาคผนวก ข : อัตราผลตอบแทนทางการเงินส่วนย่างพารา ในรูปป้ายang แผ่นดิน จังหวัดระนอง ปีที่ 13 – 25 (ต่อ)

รายการ / ปีที่	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00
ต้นทุนรวม	7,536.65	7,505.53	7,553.55	7,803.28	8,302.70	7,773.28	7,810.80	7,773.28	7,506.65	7,851.97	7,526.64	7,505.53	7,536.65
discount rate	0.45	0.42	0.40	0.37	0.35	0.33	0.31	0.29	0.27	0.26	0.24	0.23	0.21
ต้นทุนรวมหลังปรับค่าตามเวลา	3,372.86	3,157.49	2,987.11	2,900.80	2,901.35	2,553.43	2,411.88	2,256.34	2,048.27	2,014.00	1,814.77	1,701.15	1,605.75
ผลตอบแทน													
เงินอุดหนุนจากกองทุน สังเคราะห์													
ข้างเพื่อนดิน	12,600.00	12,600.00	12,600.00	13,135.50	13,135.50	13,135.50	13,135.50	13,135.50	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00
ไม้ข้างพารา													14,425.20
ผลตอบแทนรวม	12,600.00	12,600.00	12,600.00	13,135.50	13,135.50	13,135.50	13,135.50	13,135.50	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	27,025.20
discount rate	0.45	0.42	0.40	0.37	0.35	0.33	0.31	0.29	0.27	0.26	0.24	0.23	0.21
ผลตอบแทนรวมหลังปรับค่าตาม เวลา	5,638.85	5,300.67	4,982.77	4,883.00	4,590.15	4,314.86	4,056.08	3,812.83	3,438.04	3,231.85	3,038.02	2,855.82	5,757.97
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยปี	2,265.99	2,143.18	1,995.66	1,982.20	1,688.80	1,761.43	1,644.20	1,556.49	1,389.77	1,217.85	1,223.25	1,154.67	4,152.21